

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté

A RETENIR

- **Stades Fruits** : Récolte réalisée sur l'ensemble du réseau. Induction florale en cours.
- **Ravageurs** : Sésie – Fin du vol des adultes
Cécidomyie : Dernière génération de larve passée.
- **Maladies** : Anthracnose - faible mais présent jusqu'en haut des buissons
Oïdium - pression devenue faible. Fin de la période de contamination.
Rouille - Premiers symptômes visibles. Pression faible.

METEO

Les températures restent chaudes, même si moins importantes que sur les dernières semaines de juillet. Le fort ensoleillement et le manque d'eau a un impact visible sur les vergers (coup de soleil, dessèchement précoce des feuilles, ...), que ce soit de fruits ou de bourgeons.

Météo	Merceuil	Bonnencontre	Concoeur	Chaume	Annoire
7 jours					
T moy	25.2 °C	23.8 °C	25.6 °C	22.9 °C	23.7 °C
Min – Max	11 à 38	11 à 37	17 à 37	10 à 36	11 à 37
Pluvio	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm

Températures et pluviométrie des 7 derniers jours, données SENCROP, en date du 09/07/2026

Une vague de chaud est attendue dans les prochains jours. Aucune pluie significative n'est annoncée pour le moment.

	jeu. 9	ven. 10	sam. 11	dim. 12	lun. 13	mar. 14	mer. 15
							
	0	0	0	0	0	0	1.7
	15/62	13/57	17/88	12/91	10/57	12/47	7/76
	19/36	19/38	17/38	17/38	18/40	21/40	21/44

Températures et pluviométrie prévue dans les 7 prochains jours, données SENCROP – modèle METEOBLUE - Merceuil, au jour du 09/07/2026

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre régionale de Bourgogne Franche-Comté.

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.



Stades

La récolte a été réalisée sur l'entièreté du réseau. Elles ont commencé au 16 juin pour se terminer au 26 juin. La véraison s'est accélérée en fin de maturité, avançant la récolte à 15 jour des dates historiques (5 jours d'avance par rapport à 2025). Les vergers ont bien tenu face aux chaleurs jusqu'au 21 - 22 juin, par la suite, les baies ont perdues beaucoup d'eau entraînant une perte de rendement significative.

La chaleur et le manque d'eau est visible sur les vergers : défoliations précoces, feuilles brûlées, ... en sont les symptômes immédiats. L'induction florale en sera aussi impactée. Se déroulant de juin à septembre, elle détermine le nombre de fleur présent dans chaque bourgeon pour l'année prochaine. Il est possible que la prochaine floraison en soit diminuée avec moins de fleurs par inflorescence.

Si les vergers en sol superficiels sont touchés plus durement qu'en plaine, les coups de chaleurs sont présents sur l'ensemble des parcelles du réseau. Le développement de certains jeunes vergers sont particulièrement impactés avec des pertes importantes à prévoir.



Coup de soleil, feuille grillée et état de jeunes vergers de cassis, juillet 2026

Ravageurs

Sésie



Fin du vol. Les derniers adultes ont été piégés la semaine dernière sur les parcelles.

Préconisations : Les insecticides sont **déconseillés à ce stade de la saison**, leur utilisation impactera fortement les populations de tiphlodromes, ce qui favoriserait le développement des acariens jaunes.

Plus d'informations : [Fiche de reconnaissance « Sésie » par la CA21](#)

Des essais de piégeage massif sont en cours (Projet EVOL'CASSIS – DEPHY EXPE 2025 - 2030). Les premiers pièges sont bien remplis !



Pièges par phéromones et Sésie sur feuille de cassissier, Mai 2026

Cécidomyie



La 3^{ème} génération a eu lieu après le 11 juin 2026 (bulletin précédent). Des feuilles en partie nécrosées sont encore visibles mais l'intensité de l'attaque reste moyenne (et plus faible qu'en 2025). C'était la dernière génération de larve pour cette année !

Plus d'informations :

- [Fiche de reconnaissance « Cécidomyie » par la CA21](#)

Maladies

Rouille



Des symptômes de rouille ont été observés en parcelle de bourgeons (Villy-Le-Moutier, début de symptômes sur Viévine) et sur fruits (Taizé, Villy-Le-Moutier). La fréquence d'observation et l'intensité des dégâts reste faible. Les contaminations ont sûrement eu lieu lors des dernières pluies orageuses mais le temps sec a ralenti son développement.

Les temps chauds et humides favorisent son développement. Tant que des pluies ne sont pas prévues, son développement devrait rester ralenti.

Plus d'informations : [Fiche « Rouille »](#) par la CA21



Symptômes frais et anciens de rouille

Oïdium



Les pressions d'oïdium ont diminué grâce au temps sec. Quelques parcelles ont encore des symptômes visibles, mais à bien plus faible fréquence qu'en juin. Nous arrivons en fin de période de vulnérabilité pour cette maladie. Aucune intervention n'est justifiée.

Plus d'informations : [Fiche de reconnaissance « Oïdium »](#) par la CA21



Méthodes alternatives, des produits de biocontrôle existent : produits à base de bicarbonates de soude ou compétitions par micro-organismes.

Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#)

Anthracnose



Des symptômes sont visibles jusqu'en haut des buissons mais leur fréquence et intensité reste faible (1 à 25% des rameaux touchés). La fréquence de contamination des feuilles est bien plus faible que sur les années 2024 et 2025. Des contaminations estivales sont toujours possibles, mais uniquement en cas de pluies régulières.

Plus d'informations :

- [Fiche de reconnaissance « Anthracnose »](#) par la CA21



Méthodes alternatives, des produits de biocontrôle existent : produits à base de cuivre.

Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#)

L'importance des variétés

L'impact des maladies du cassis est différent sur chaque variété. Votre stratégie estivale doit être adaptée selon vos observations, la météo mais aussi la variété considérée.

	Anthraxnose	Oïdium	Rouille
Andega	Résistant	Très résistant	Résistant
Blackdown	Très sensible	Très sensible	Résistant
Noir de Bourgogne	Sensible	Très sensible	Sensible
Royal	Très sensible	Très sensible	Sensible
Bigrou	Résistant	Résistant	Très sensible

Tableau des résistances et sensibilités des variétés aux maladies du cassis, établi par une lecture croisée entre « Le cassis » - CTIFL 2000 et « Produire des petits-fruits biologiques » - ITAB 2023.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et rédigé par la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON, à partir des observations réalisées par la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et la FREDON BFC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Dispositif supervisé par le Service Régional de l'Alimentation dans le cadre du dispositif de Surveillance Biologique du Territoire du plan régional Ecophyto.