



RÉSEAU NATIONAL DE
SURVEILLANCE JEVI

Bulletin de Santé du Végétal des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures (JEVI)

LA SANTE DES JARDINS ET ESPACES VEGETALISES

N°7 – 11 septembre 2025




MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Retrouvez gratuitement les
BSV sur le site de [DRAAF CVL](#)



FREDON
CENTRE-VAL DE LOIRE

Retrouvez gratuitement tous
les bulletins

La Santé des Jardins
sur le site de [FREDON CVL](#)

Pour vous abonner,
[cliquer ICI](#)

A RETENIR :

ACTUALITES :

- Fredonnons la Nature, le podcast
- Sécheresse
- Enquête SNHF
- Surveillance du pollen d'ambrosie à feuille d'armoïse

A SURVEILLER ...

- Chou : attention aux chenilles défoliatrices
- Vigne : vigilance vis-à-vis de la flavescence dorée
- Buis : la situation est saine vis-à-vis de la pyrale du buis

ZOOM SUR ... *Popillia japonica* (scarabée japonais)

DOSSIER TECHNIQUE :

- Les fourmis invasives

Prochain et dernier bulletin : jeudi 02 octobre

REJOIGNEZ LE RESEAU D'OBSERVATEURS DES JARDINS ET ESPACES VEGETALISES

Le contenu du bulletin JEVI « La Santé des Jardins et Espaces Végétalisés » est basé sur les informations issues d'un réseau d'observateurs bénévoles amateurs et professionnels. La fiabilité du bulletin est d'autant plus grande que le nombre d'observations est important.

Rejoignez vite notre réseau et participez à l'enrichissement de notre bulletin en apprenant à mieux observer vos végétaux !

Plus d'infos - [Contactez-nous](#)



Identifiez les cibles de produits de biocontrôles grâce à ce logo



Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de biocontrôle en cliquant sur ce [lien](#)

Bulletin JEVI « La Santé des Jardins et Espaces Végétalisés » –
Région Centre Val de Loire
Bulletin n°7 du 11/09/2025


PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL
DE LOIRE
*Liberté
Égalité
Fraternité*
Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

SOMMAIRE

ACTUS.....	3
Fredonnons la nature	3
Sécheresse	3
Enquête SNHF : vos pratiques culturelles nous intéressent !	3
Vigilance sur le pollen d'ambrosie à feuille d'armoise.....	4
ZOOM SUR	4
Le Scarabée japonais – <i>Popillia japonica</i>	4
POTAGERS.....	5
Chou	5
Poireau	6
Salade.....	8
VERGERS	9
Tous fruitiers	9
Fruitiers à pépins	10
Vigne.....	13
Noyer.....	14
Aperçus sur vos fruitiers et vignes	14
ARBRES ET ARBUSTES	15
Buis.....	15
Rosier	16
AUXILIAIRES et PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE	16
DOSSIER TECHNIQUE	17
Les fourmis invasives : un défi pour les jardins.....	17



Fredonnons la nature

Le réseau Fredon France vous propose de partager son podcast de vulgarisation scientifique sur certains bioagresseurs d'importance. Flavescence dorée, Chenille processionnaire du pin, Moustique tigre, Berce du Caucase ... Bref, autant de problématiques qui peuvent nous concerner !

Retrouvez le lien : [FREDONNONS LA NATURE](#)

Sécheresse

Malgré les récentes pluies, la sécheresse de surface est toujours bien installée dans notre région. Des mises en place de restrictions sur l'usage de l'eau sont en cours dans certains départements.

Pour plus de renseignements, consultez les sites des Services de l'Etat :
<https://vigieau.gouv.fr/>

Pour pallier aux effets néfastes de la sécheresse, il convient de bien arroser et de pailler vos végétaux. Vous trouverez ci-après 3 liens pour optimiser vos pratiques sur le site Jardiner Autrement.

[Arroser efficacement pour économiser l'eau au jardin](#)

[Les effets du paillage sur le sol](#)

[Les effets du paillage au jardin](#)

Enquête SNHF : vos pratiques culturelles nous intéressent !

Jardiner Autrement et la **SNHF** lancent une grande enquête auprès des jardiniers amateurs de France !

Aujourd'hui, certaines pratiques comme la fabrication de compost maison ou le paillage sont devenues des habitudes bien ancrées chez de nombreux jardiniers. Cette enquête cherche à explorer plus en détail les solutions que vous avez mise en œuvre pour faire face aux défis actuels : climat instable, ravageurs, plantes envahissantes...

Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes. Pour y accéder, cliquer sur l'affiche ci-contre.



Vigilance sur le pollen d'ambroisie à feuille d'armoise

L'ambroisie à feuille d'armoise est une plante exotique envahissante extrêmement allergisante pour les personnes sensibles. En région Centre-Val de Loire, la période de pollinisation débute en général au mois de septembre. Actuellement dans notre région, la période de floraison et de pollen est en cours : soyez prudent !

[Plus d'info sur l'ambroisie, cliquez ici](#)

[Plus d'info sur le risque pollen, cliquez ici](#)

ZOOM SUR ...

Le Scarabée japonais – *Popillia japonica*



Votre SRAL Centre-Val de Loire souhaite vous informer sur la potentielle dangerosité d'un coléoptère, le [scarabée japonais](#). Il s'agit d'un organisme réglementé non présent dans notre région mais qu'il convient de surveiller rigoureusement. Savoir le reconnaître et anticiper son arrivée est indispensable pour la préservation de nos filières végétales et nos jardins.

Plus d'infos en cliquant sur la photo



Il est arrivé en Alsace : <https://fredon.fr/actualites-france/le-scarabee-japonais-detecte-en-alsace-une-premiere-en-france>

Vous pouvez également consulter les document et site suivants : [fiche de reconnaissance](#), [note nationale](#) et popillia.eu.



POTAGERS

Chou

Chenilles défoliatrices diverses.

Le début de l'automne approchant, il conviendra de surveiller la présence de chenilles défoliatrices dans vos carrés de chou. Actuellement, des vols de piérides et des chenilles sont observés en Touraine chez les maraîchers professionnels.

Plusieurs espèces sont susceptibles de s'attaquer aux crucifères. Vous trouverez, ci-après, quelques éléments de reconnaissance de ces papillons :

Piéride du chou (*Pieris brassicae*)



Piéride de la rave (*Pieris rapae*)



Mamestre du chou (*Mamestra brassicae*)



Noctuelle gamma (*Autographa gamma*)



Photos: FREDON CVL. Photos de papillons et de chenilles défoliatrices du chou.

Poireau

Teigne du poireau (*Acrolepiopsis assectella*)

D'après le BSV en maraîchage professionnel, le vol de ce papillon a lieu sur certains secteurs de la région. Dans nos jardins amateurs, aucun dégât de chenille n'a été constaté pour l'instant.

Éléments de reconnaissance de la teigne et de ses dégâts :

Les feuilles sont grignotées. On observe alors une sorte de « sciure végétale » avec parfois quelques déjections verdâtres près des galeries creusées dans le feuillage. La chenille se réfugie souvent vers le cœur du poireau à l'abri des prédateurs.

La teigne du poireau est un petit papillon qui mesure de 10 à 15mm et qui pond sur le poireau. La chenille (communément appelée « le ver du poireau ») se nourrit du feuillage sur lequel elle a éclos avant de se transformer en chrysalide.



Photos : - FREDON CVL. De gauche à droite : dégâts de teigne sur poireau. A droite, observation de la chenille

Méthodes de lutte et biocontrôle

- Le piégeage. Possibilité de placer un piège à phéromone pour capturer les papillons (nocturnes) et ainsi détecter l'arrivée des futures chenilles.
- L'installation d'un filet anti-insecte permet de protéger les poireaux de la ponte des papillons.
- L'installation de nichoirs à oiseaux et à chauve-souris contribuera à diminuer la pression de ce ravageur.
- En cas de détection de petites chenilles, une lutte à base d'un produit de biocontrôle type *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* peut être envisagée. 
- Sur des chenilles plus âgées, la coupe totale du feuillage au-dessous de la chenille (avec évacuation du feuillage hors de la parcelle) peut être préconisée. Rappel: en cas de coupe au niveau du fût, le feuillage repoussera mais cela retardera la croissance de la plante. Cette pratique n'est pas conseillée sur des poireaux juste installés.

Mouche mineuse du poireau (*Phytomyza gymnostoma*)

D'après le BSV en maraîchage professionnel, le vol de 2^{ème} génération n'a toujours pas franchement débuté. Mais une 1^{ère} piqûre a été observée sur une parcelle de poireau dans le Loiret ...

Comment surveiller le vol de la mouche mineuse du poireau ?

Un peu de biologie

Le suivi de la mouche mineuse du poireau est réalisé sur une plante indicatrice (ciboulette) et consiste à détecter les piqûres de nutrition de cette mouche.

Avant de pondre leurs œufs, les mouches vont rapidement s'alimenter sur les alliées et notamment sur la ciboulette qui est très attractive. Des pots de ciboulettes sont disposés sur plusieurs sites de la région. Les observations consistent à rechercher plusieurs fois par semaine, les piqûres de nutrition sur les nouveaux brins de ciboulette.

Ces piqûres sont très caractéristiques : **il s'agit de petits points blancs alignés verticalement**. Ainsi, dès que les premières piqûres sont observées sur les feuilles de ciboulette, on en déduit que le vol est en cours et que la ponte est imminente.

N'hésitez donc pas à planter des ciboulettes à proximité de votre potager et à observer plusieurs fois par semaine, la présence ou non de piqûres.



Photos: Cyril Kruckowski - FREDON CVL. Mouche mineuse adulte et piqûres sur ciboulette

Rouille (*Puccinia porri*)

Pas de signalement dans les jardins mais les conditions d'humidité actuelles et à venir seront favorables à l'apparition de la maladie.

Éléments de reconnaissance et de ses dégâts :

La rouille est due à un champignon dont les symptômes sont très facilement reconnaissables : pustules de couleurs marron-jaune qui donnent un aspect rouillé au feuillage. En cas de fortes attaques, la plante finit par se dessécher.

Ce champignon se développe à des températures proches de 20°C. Il apparaît souvent en fin d'été. Les contaminations se produisent en cas d'humidité prolongée (pluie, arrosage, rosée matinale...). Il se conserve dans les débris végétaux.



Photos: Cyril Kruckowski - FREDON CVL. Dégâts de rouille sur feuille de poireau

Méthodes de lutte et biocontrôle

- Privilégier des variétés résistantes.
- Pratiquer la rotation des cultures (veillez à ne pas replanter du poireau au même endroit chaque année).
- Ne planter pas trop serré.
- En cours de cultures, arroser de préférence au matin.
- En cas de fortes contaminations, retirer les plantes atteintes et les éloigner de la culture.

Salade

Ravageurs et maladies

Aucun problème sanitaire. Les conditions plus fraîches et humides seront favorables au bon développement de la culture. Pour vos jeunes plantations ou semis, il faudra surveiller le retour des limaces.



Tous fruitiers

Les punaises phytophages

Les punaises phytophages sont également présentes dans les fruitiers. Elles sont responsables des profondes déformations et des nécroses sous l'épiderme que vous observez sur les fruits.

Symptômes et éléments de reconnaissance ...



Punaise phytophage : Piqûre en cuvette sur poire avec un méplat au fond de la cuvette



Photos : FREDON CVL
Gradient de dégâts précoces de punaises sur pommes

Plus d'informations sur les punaises phytophages sur le site EcophytoPic : [ici](#)

Retrouvez également un [dossier complet sur les punaises phytophages](#) rédigé par FREDON Nouvelle-Aquitaine et FREDON 47 dans le cadre des BSV Arboriculture et notre [dossier technique spécial punaises en maraîchage](#) sur le site de FREDON CVL

Le point sur la punaise diabolique

Plus d'informations sur [Agiir-Punaise-diabolique](#) et [punaisesdiaboliques.com](#)

La punaise diabolique (*Halyomorpha halys*) est une punaise invasive polyphage. Depuis plus d'un mois, le nombre d'adultes et de larves est en forte recrudescence dans les vergers professionnels : augmentation du nombre d'individus signalés dans les pièges et dans les fruitiers. De nombreuses larves de punaises nous sont également signalés dans les jardins.



Photos : INRAE – JC Streito - Adulte et larve âgée



Photos : FREDON CVL – Eclosion et jeunes larves
B.Fidalgo – Larves de *Halyomorpha halys* sur nectarines

Pas surprenant que de nombreuses poires et pommes présentent des déformations !

Fruitiers à pépins

Le feu bactérien

La cueillette est une période à risque quant à l'arrivée de maladies : les blessures de cueille au niveau des rameaux constituent un point d'entrée idéal et rendent les fruitiers plus sensibles.

Les variations de températures accompagnées des pluies de ces dernières semaines offrent un climat propice au développement de la bactérie responsable du feu bactérien (*Erwinia amylovora*). Le feu bactérien provoque des dépérissements dits en crosse sur les pousses de pommiers et de poiriers.

Vigilance accrue !



Symptômes et éléments de reconnaissance...



Photos INRAE (B. Petit)

Symptôme en crosse sur pousse de pommier, présence de gouttelettes d'exsudat sur le pétiole et nécrose des nervures centrales des feuilles.



Retrouver plus d'infos sur le site de FREDON CVL, dans la rubrique "Organismes Réglementés"

Le carpocapse du pommier

Le vol du carpocapse se termine. De nombreux dégâts sont observés sur fruits dans les jardins. Les jeunes chenilles sont toujours présentes dans les fruits créant des galeries remplies de « vermoulures ». Par contre, il ne pourra plus y avoir de nouvelles infestations.



Photos : FREDON CVL. A gauche, papillon de carpocapse. Au centre et à droite, dégât sur fruit avec présence de « vermoulure » et galerie se dirigeant vers les pépins

Méthodes de lutte et biocontrôle

- Poser des bandes cartonnées autour des troncs (30 cm du sol) afin de **piéger les larves hivernantes**. Elles devront être retirées au **mois de novembre**. Cette préconisation s'applique également aux pruniers.
- **Des produits de biocontrôle appliqués sur les jeunes chenilles** peuvent aider à lutter contre le carpocapse.
- **Favoriser la présence des prédateurs naturels, oiseaux et forficules (perce-oreilles)** qui consommeront, par la suite, les larves de carpocapses.
- **La pose de filet spécifique**, au tout début du 1^{er} vol, sur des arbres de faible taille, peut s'avérer très efficace.
- Un peu d'informations complémentaires avec en plus un tuto vidéo sur <https://www.jardiner-autrement.fr/lutter-contre-le-carpocapse-a-laide-du-biocontrôle>



Photo : FREDON CVL -
Bande piège cartonnée pour
piégeage de chenilles de
carpocapses



ZOOM sur le Black Rot du pommier



Le **Black Rot** des pommiers est une maladie provoquée par *Diplodia seriata*. Autrefois considérée comme secondaire, cette maladie est actuellement en recrudescence en France depuis une quinzaine d'année. Elle est répertoriée sur plus de 35 espèces ligneuses ou horticoles dont la vigne (maladie du bois).

Sur pommier, elle affecte le bois (chancre) et les feuilles (taches ocellées). Sur fruit, les symptômes apparaissent en été sous forme de taches noires qui évoluent en pourriture. La pourriture reste ferme, généralement de couleur foncée. Le fruit totalement atteint se transforme ensuite en momie.



Photo : M. GIRAUD – CTIFL
Pourriture sur Chanteclerc

Les infections du tronc, en particulier chez les jeunes arbres, finissent par encercler l'arbre et causer sa mort prématurée.

Sur le feuillage des pommiers, cette maladie se caractérise par de petites taches violacées, circulaires devenant brun clair, entouré d'un liseré violet.



Photos : M. GIRAUD – CTIFL
Taches ocellées de Black Rot sur feuille de pommier

D'après les données de l'INRAE, la recrudescence de cette maladie est liée aux changements climatiques. Certaines variétés peuvent se montrer plus sensibles que d'autres telles que Chanteclerc, Fuji, Breaburn, Elstar, Pink Lady ...

Des événements pluvieux accompagnés de températures douces (temp. max. >20°C) au moment de la floraison sont favorables aux premières infections par ce champignon. Les conditions climatiques du printemps dernier devraient permettre une situation saine dans les vergers.

Méthodes de luttés et biocontrôle

- ☒ **Éliminer les fruits atteints, tombés au sol**, ainsi que les feuilles
- ☒ Lors de la taille, **couper les chancres** de toutes sortes.
- ☒ Au printemps, ôter les fruits momifiés.

Pour plus d'information, rendez-vous sur : <http://ephytia.inra.fr/Pomme-Diplodia-seriata>

Vigne

La Flavescence dorée

La Flavescence dorée est une **maladie de quarantaine** (Directive Européenne 2000/29/CE) particulièrement contagieuse chez la vigne. Présente dans la plupart des zones de production viticole du sud de l'Europe, elle peut être à l'origine de fortes pertes de récolte et compromettre la pérennité des vignobles.

Cette maladie est causée par le phytoplasme de la Flavescence dorée : une petite bactérie sans paroi de la classe des Mollicutes. Elle provoque une obstruction des vaisseaux conducteur de sève. Elle est transmise par un insecte vecteur, la cicadelle *Scaphoideus titanus* ainsi que par le greffage.



Photo FREDON CVL et INRAE – D. Blanchard – Enroulement et décoloration du feuillage sur cépage rouge (gauche) et blanc (droite) dus à la flavescence dorée.

En tant que maladie de quarantaine, la Flavescence dorée fait l'objet d'une lutte réglementée et obligatoire.

Les symptômes sont **maintenant** visibles :

- **durcissement** du limbe des feuilles,
- **enroulement** des feuilles,
- **absence d'aoûtement** (lignification) du bois,
- **rougissement** (cépage rouge) ou **jaunissement** (cépage blanc) d'une partie du feuillage.
- **dépérissement** et/ou **flétrissement** des grappes

Plus d'informations en cliquant le dossier Flavescence Dorée sur le site de FREDON CVL :

[FREDON CVL - la flavescence-doree](http://fregoncvl.fr/la-flavescence-doree)

ou sur le site ephytia de l'INRAE

<http://ephytia.inra.fr/fr/C/6070/Vigne-Phytoplasme-de-la-flavescence-doree>



Noyer

Mouche du brou de la noix (*Rhagoletis completa*)

La mouche du brou du noyer est un ravageur particulièrement néfaste pour la production et la conservation des noix. L'adulte vole de début juillet à septembre. Les femelles déposent leurs œufs sous la surface de la brou durant cette période.

Le vol est fini.



Photo FREDON Nouvelle Aquitaine
Mouche du brou de la noix (*Rhagoletis completa*)



Photo J. Chabault
Brou noirci et larves de mouche du brou de la noix



Les signes d'infestation peuvent être confondus avec ceux de la bactériose. Cette maladie s'attaque en premier lieu **au feuillage qui présente des taches jaunâtres diffuses dans un premier temps**. Elle provoque également des taches noires sur le brou.

Méthodes de lutte et biocontrôle

- En **fin de développement**, les larves sortent du brou, **se laissent tomber au sol pour finir leur cycle**. Le ramassage des brous et leur éloignement par rapport aux noyers permettent de limiter les populations de mouches l'année suivante.

Aperçus sur vos fruitiers et vignes ...

Vous êtes plusieurs jardiniers à nous avoir signalé de la **rouille grillagée** (1) sur poirier.

Vous nous avez également signalé des **tigres du poirier** (2) et de la **moniliose** (3) sur pommier et cognassier.



Photos 1 et 3: FREDON CVL. – photo 2 : M. Friot



ARBRES ET ARBUSTES

Buis

Pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*) - Chenille

Les jardiniers n'ont pas constaté la présence de chenilles dans leur buis.

En l'absence de chenilles et de captures de papillon, le risque est faible.

Symptômes, biologie ...




[Retrouvez plus d'infos dans notre rubrique "Espèces Exotiques Envahissantes"](#)

Pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*) - Papillon

Dans notre région, un groupe de jardiniers bénévoles surveille les papillons de la pyrale du buis à l'aide de pièges à phéromones. 1 ou plusieurs pièges à phéromones sont disposés dans les jardins à proximité des buis et un comptage hebdomadaire est assuré afin de vérifier la présence (ou l'absence) et le nombre de papillons piégés. Ces données permettent de cibler d'éventuels pics de vol et donc de mieux cibler vos interventions sur les chenilles.

Actuellement, 5 sites de piégeage sont en place en région Centre-Val de Loire.



Sur ces 3 dernières semaines, 1 seule capture de papillons a eu lieu sur le site de Fondettes (37).

Le vol des papillons est quasiment nul en région Centre-Val de Loire. Les conditions météo agitées de ces prochains jours ne seront pas favorables au vol de la pyrale.

Méthodes de lutte et biocontrôle

- Chenille : maintenir la surveillance de vos buis.

Rosier

Maladies cryptogamiques (maladies des taches noires)

Dans certains jardins comme à Fondettes (37), on observe toujours de nouvelles contaminations de taches noires sur des variétés dites sensibles. Les prochains passages pluvieux accentueront la pression de cette maladie cryptogamique.



Photos : Fredon CVL – maladie des taches noires sur feuillage

Méthodes de lutte et biocontrôle

- Il n'existe pas de moyens de biocontrôle, la lutte passe surtout par la prévention.
- Privilégiez des variétés résistantes.
- Pratiquez des tailles sanitaires afin d'aérer le port du rosier.
- Gérez l'enherbement à proximité de la culture.
- Maîtrisez votre arrosage, en fonction des précipitations et évitez de mouiller le feuillage.
- En cas de symptômes, éliminez les organes touchés afin de ralentir la propagation de la maladie.



AUXILIAIRES ET PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur les images ci-dessous :





Les fourmis invasives : un défi pour les jardins



Les fourmis jouent un rôle essentiel dans l'écosystème, contribuant à l'aération des sols et au contrôle de certains ravageurs. Cependant, certaines espèces invasives posent problème en raison de leur forte prolifération et de leur impact sur la biodiversité et les activités humaines. Dans le cadre du projet FIVALO (Fourmis Invasives du VAL de LOire), plusieurs espèces sont surveillées, et notamment *Tapinoma magnum* et des espèces proches (*T. darioi* et *T. ibericum*) et *Lasius neglectus*.

Tapinoma magnum

Originnaire du bassin méditerranéen, *Tapinoma magnum* s'est progressivement étendu plus au nord de la France. Cette espèce est particulièrement agressive envers les autres espèces locales.

Caractéristiques :

- Corps noir de 2 à 4 mm, les ouvrières peuvent être de taille différente.
- Une odeur de beurre rance s'en dégage lorsqu'elle est écrasée entre deux doigts.
- Colonies polygynes (plusieurs reines), favorisant une expansion rapide.



Lasius neglectus

La fourmi aztèque, *Lasius neglectus*, est une espèce originaire d'Asie mineure qui s'est répandue en Europe ces dernières décennies.

Caractéristiques :

- Corps brun de 3 à 5 mm, homogène en apparence.
- Pas d'odeur particulière lorsqu'elle est écrasée.

Quels sont leurs impacts ?

Favorisées par les activités humaines, ces fourmis invasives envahissent les habitats perturbés ou les milieux urbains. Elles concurrencent les espèces locales et diminuent à terme la biodiversité dans les milieux qu'elles colonisent.

Bien que sans danger pour la santé humaine, *Lasius neglectus* et *Tapinoma magnum* sont très populeuses, entraînant ainsi des nuisances dans les jardins et les habitations dans lesquelles elles peuvent pénétrer massivement (voir photos ci-après). Elles peuvent provoquer des dégâts sur les végétaux et notamment dans le domaine maraîcher.



Quels sont les indices de la présence de ces fourmis invasives ?


- Des colonies très denses (elles peuvent s'étendre sur plusieurs milliers de m²).
- Des invasions prolongées (au-delà de 5 semaines au printemps).
- Une odeur de beurre rance lorsque la fourmi est écrasée (uniquement pour les fourmis du genre *Tapinoma*).

Que faire face à ces fourmis invasives ?

- Surveiller la présence de ces espèces et **signaler toute observation suspecte à FREDON CVL**.
- Limiter leur installation en évitant les sources de nourriture accessibles (restes sucrés, aliments exposés).
- Préserver et restaurer l'environnement local pour favoriser le retour des fourmis indigènes.
- Privilégier les espèces végétales locales.

L'identification précoce de ces fourmis invasives est essentielle pour préserver l'équilibre de nos jardins. La vigilance de chacun permettra de limiter leur propagation et de protéger la biodiversité locale.

Photos : FREDON CVL



Ce bulletin est publié à partir d'observations ponctuelles réalisées par un réseau d'épidémiosurveillance en espaces verts. S'il donne une tendance de la situation phytosanitaire régionale la plus représentative et objective possible, il reste nécessaire pour chaque gestionnaire de JEVI de considérer également le résultat de ses propres observations. Les informations contenues dans ce bulletin ne peuvent être transposées telles quelles à d'autres situations. FREDON CVL dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les gestionnaires d'espaces vert, jardiniers amateurs ou tout autres détenteurs de végétaux sur la base des informations communiquées dans ce bulletin.

Observations : Ce bulletin est rédigé grâce aux observations des jardiniers amateurs issus de toute la région Centre-Val de Loire, des associations d'horticulture (Sociétés d'Horticulture 37-41-45-18-36-28), de jardins familiaux (AOJOF), de villes (Tours, Orléans), de châteaux (château de la Bourdaisière), du Centre des Monuments Nationaux.

Rédaction et animation : Cyril KRUCZKOWSKI et Marie-Pierre DUFRESNE - FREDON Centre-Val de Loire

Directeur de la publication : Sophie PIERON – Directrice de FREDON CVL

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du Bulletin JEVI « La Santé des Jardins et Espaces Végétalisés »

Coordination et renseignements : Cyril KRUCZKOWSKI - cyril.kruczowski@fredon-centrevaldeloire.fr - 06-51-72-13-94