

Bulletin de Santé du Végétal des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures (JEVI)

LA SANTE DES JARDINS ET ESPACES VERTS

N°8 – 24 septembre 2026

A RETENIR :

ACTUALITES ...

- 15^{ème} assises de la Biodiversité
- Enquête pour le Plan Régional Santé Environnement
- Restriction d'usage de l'eau encore d'actualité

A SURVEILLER ...

- Noctuelles ! Elles grignotent tout ...
- Surveiller vos pélargonium : le Brun attaque
- En automne et hiver, prenons soin de nos fruitiers
- Pyrale du buis : pas de signalement mais restez vigilant !
- Attention aux cochenilles

DOSSIER DU JOUR ...

- L'augmentorium contre le carpocapse

VIGILANCE SUR ...

- Le Datura stramoine et le Scarabée japonais

Dernier bulletin de la saison

Merci aux jardiniers observateurs et à nos lecteurs
pour leur implication et leur fidélité.

Bulletin bilan prévu en décembre 2026

REJOIGNEZ LE RESEAU D'OBSERVATEURS BSV JEVI

Le contenu des Bulletins de santé du végétal (BSV) est basé sur les informations biologiques et épidémiologiques issues d'un réseau d'observateurs formés et accompagnés par un animateur régional, rédacteur du BSV.

Rejoignez le réseau de votre région et participez à l'enrichissement des BSV tout en renforçant vos connaissances en santé et protection des végétaux.

Pour plus d'information, contactez nous !

Financé par



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Retrouvez gratuitement les
BSV sur le site
de la **DRAAF CVL**



FREDON
CENTRE-VAL DE LOIRE

Retrouvez gratuitement le
BSV JEVI sur le site de
**FREDON Centre Val de
Loire**



RÉSEAU NATIONAL DE
SURVEILLANCE JEVI

Identifiez les cibles de produits de biocontrôles grâce à ce logo



Identifiez les résistances de bioagresseurs à des produits phytopharmaceutiques (PPP)



SOMMAIRE

ACTUALITES	3
15 ^{ème} Assises Nationales de la Biodiversité.....	3
Plan régional Santé Environnement (PRSE 4)	3
Restrictions d’usage de l’eau encore d’actualité	4
JARDINS ET HABITATS.....	4
Punaises des champs	4
TOUS VEGETAUX.....	5
Noctuelles	5
POTAGERS.....	5
Poivron - aubergine	5
Haricot vert	6
Poireau – ail - oignon.....	6
Tomate.....	6
Courgette	7
Bette - épinard	7
VERGERS	8
Tous fruitiers.....	8
Vigne.....	8
Noyer.....	10
ZOOM SUR La rouille grillagée du poirier	11
ARBRES, ARBUSTES ET PLANTES d’ORNEMENT	12
Arbres et arbustes d’ornement	12
Buis.....	12
Pélargonium	14
Pin et Cèdre.....	15
Rosier – Hortensia - Agrumes	15
DOSSIER TECHNIQUE - L’augmentorium	16
VIGILANCE SUR	17
Le Datura stramoine.....	17
Le Scarabée japonais – <i>Popillia japonica</i>	17
L’Ambroisie – <i>Un enjeu de santé publique</i>	18
AUXILIAIRES	19



ACTUALITES

Inscription gratuite au bulletin

Si vous souhaitez recevoir directement dans votre messagerie, dès sa parution, le bulletin régional « La Santé des Jardins et Espaces Végétalisés », vous pouvez vous inscrire sur notre site internet FREDON Centre Val de Loire. L'inscription est gratuite et nous ne transmettons que les bulletins.

Ci-joint le lien pour vous inscrire : [inscription au bulletin](#)

15^{ème} Assises Nationales de la Biodiversité – du 29/09 au 1^{er}/10 – Palais des Congrès de Tours

Evènement national autour de l'environnement, les Assises de la Biodiversité rassemblent toutes celles et ceux qui s'engagent pour la préservation du vivant dans nos territoires : élues et élus, directions générales, cadres techniques, expertes et experts de la faune et de la flore, actrices et acteurs associatifs ou responsables de la transition écologique. Découvrez le programme sur <https://www.assises-biodiversite.com/>



Plan régional Santé Environnement (PRSE 4)

Il est encore temps de répondre à l'**enquête** consacrée à la **perception des enjeux de la santé environnementale** en région Centre-Val de Loire. Son objectif : identifier vos attentes pour que les acteurs des enjeux environnementaux puissent vous proposer des actions en adéquation avec vos préoccupations dans le cadre du PRSE 4. **Qualité de l'air et de l'eau, alimentation, bruit, habitat, changement climatique ou encore exposition aux substances chimiques** : chacun est invité à s'exprimer sur les sujets qui le préoccupent.

Le questionnaire est ouvert jusqu'au **30 octobre 2026** à toute personne âgée de 18 ans ou plus résidant en Centre-Val de Loire. Il est accessible en ligne :

- sur le site de l'ARS Centre-Val de Loire [Enquête santé environnement : donnez votre avis pour mieux orienter les actions en Centre-Val de Loire | Agence régionale de santé Centre-Val de Loire](#)
- sur le site de l'ORS : [Enquête santé environnement en Centre-Val de Loire](#).

Financé par

Restrictions d'usage de l'eau encore d'actualité

Toutes les ressources en eau de notre région sont concernées par la sécheresse : eau potable, eau superficielle et eau souterraine. Aussi, les mesures de restriction de l'usage de l'eau sont encore en cours, les niveaux d'alerte étant très élevés dans certains secteurs.

Vous pouvez suivre facilement l'évolution de ces restrictions pour votre commune en consultant la plateforme mise en place par Météo France : <https://vigieau.gouv.fr/> . Ce site vous informera sur les restrictions d'eau tout au long de la période de sécheresse.



JARDINS ET HABITATS

Punaises des champs

On les appelle aussi **Punaises des céréales ou punaises du colza**

Toujours des pullulations d'importance exceptionnelle de la punaise des champs en ce mois de septembre avec de nombreux signalements sur l'ensemble de la région. Des agrégations d'insectes sont observés dans les propriétés à proximité de champs.

Les parcelles de colza fraîchement levées sont aussi victimes de cette punaise, **certaines champs étant totalement détruits.**

Ces punaises **ne constituent pas un danger** pour la **santé humaine** ni pour la santé des plantes de jardin. **Les agrégations sont provisoires et vont disparaître naturellement avec les prochaines pluies prévues la semaine prochaine... alors patience !**

Symptômes et éléments de reconnaissance...



Photo GDA Loire Beauce
*Agrégations de punaises du genre
Nysius sur un rebord de muret*



Photos Chapelin-Viscardi et al. 2017
Nysius cymoides
3- Larve 4- adulte

Méthodes de régulation

En raison de la sécheresse et de la pénurie d'eau, aucune méthode de gestion n'est envisageable.

Financé par



TOUS VEGETAUX

Noctuelles

Elles sont présentes sur de nombreuses plantes

Des attaques de noctuelles ont été observées sur un grand nombre de plantes saisonnières dans quelques sites de la région.

Soyez vigilant : Avec les températures actuelles de la journée, les chenilles de noctuelles peuvent encore faire beaucoup de dégâts



Photos O. Guerin
Dégâts de noctuelle
Heliothis armigera sur
tomate

Méthodes de lutte et biocontrôle

Elimination des dernières chenilles à la main



POTAGERS

Poivron - aubergine

Maladies et ravageurs

Récolte souvent record pour les poivrons mais surtout pour les aubergines.

Attention sur aubergines : les **doryphores** ont été très présents cette année et le sont encore à l'heure actuelle.

Méthodes de lutte et biocontrôle

- La méthode manuelle est la plus efficace : récupérez les adultes et les larves et écrasez-les. La lutte ne marche bien que si tout le monde fait le travail de ramassage des doryphores.
- Le voile est aussi possible mais il ne doit pas toucher les plantes. Il doit être mis en place avant l'arrivée des punaises.

Financé par

Haricot vert

Maladies et ravageurs

Les haricots ont été particulièrement **difficiles à réussir avec la canicule**. De nombreux semis ont échoué, des levées très irrégulières, une production très limitée malgré plusieurs essais de semis réalisés dans la saison. Sur certains sites, les semis d'après le 14 juillet ont réussi à aboutir à une récolte intéressante.

Poireau – ail – oignon

Maladies

Poireau, **culture saine** mais ralentie, qui reprend un **développement plus normal avec le rafraîchissement**.

Mineuse du poireau (*Phytomyza gymnostoma*)

Des piqûres de mineuses des alliums ont été observées fin août-début septembre dans le 37, 41 et 45 chez quelques producteurs en agriculture biologique.

Vigilance pour vos cultures d'allium !!



Photos FREDON CVL :
piqûres de mineuses des
alliums sur ciboulette

Méthodes de lutte et biocontrôle

- **La pose d'un filet anti-insecte est un bon moyen d'empêcher la mouche mineuse** de venir pondre sur vos poireaux mais également sur ail et oignon.
- Si vous avez tardé à poser les filets, supprimer les feuilles où la présence des piqûres est observée dans les quelques jours qui suivent leur apparition (le plus tôt est le mieux).

Tomate

Punaises

Des **dégâts de punaises** sont encore signalés sur plusieurs sites de la région. Les larves et adultes sont toujours présents. On observe essentiellement la punaise verte : la punaise du soja (*Nezara viridula*). L'arrêt des grandes chaleurs ne fait pas fuir les punaises. Elles sont là, elles y restent et continuent de s'alimenter sur les fruits.

Leurs dégâts (piqûres) sont aussi visibles sur les fruits et les tiges des autres légumes (courgettes, poivrons, aubergines, haricots)



Retrouver plus d'info sur les punaises dans nos dossiers techniques [Punaises en maraîchage](#) et la [punaise verte du soja](#)

Et sur le site ephytia de l'INRAe : [La punaise du soja etc](#)



Photos FREDON CVL :
Sur tomate, larves et piqûres de punaises (à gauche).
Larves et adulte de punaises du soja (à droite).

Méthodes de lutte et biocontrôle

- La méthode manuelle est la plus efficace : récupérez les adultes et les larves et écrasez-les.
- Le voile est aussi possible mais il ne doit pas toucher les plantes. Il doit être mis en place avant l'arrivée des punaises.

Courgette

Oïdium

L'oïdium est toujours plus ou moins présent sur feuilles de courgette (moins présent sur plants issus de semis tardifs).

Méthodes de lutte et biocontrôle

- L'aération des plantes permet de limiter la présence d'humidité
- L'irrigation au goutte à goutte ou par tuyaux poreux et le paillage peuvent contribuer à diminuer le développement de la maladie.



Photo FREDON CVL :
Oïdium sur courgette

Arrêt végétatif

Les plants issus de semis d'avril – mai ont souvent arrêtés de produire courant août parfois définitivement. Les températures « plus fraîches » de ces dernières semaines ont pu permettre une reprise de la culture.

Bette - épinard

Bonne adaptation à la canicule

A priori, un bon comportement à la canicule a pu être observé pour ces deux espèces de légumes feuille.



VERGERS

Tous fruitiers

Les cueillettes tendent à se terminer ... il faudra bientôt penser à prendre soin de nos arbres pour préparer l'année 2027

L'automne constitue une période propice pour mettre en place des mesures de prévention simples qui, **en favorisant la réduction des populations de ravageurs et l'inoculum des maladies**, aideront nos fruitiers pour le redémarrage de la saison suivante. C'est aussi la bonne période pour **améliorer et fertiliser son sol** afin de favoriser la vigueur des arbres, pour **repenser les futures plantations** dans un contexte à venir de contraintes en eau et d'épisodes de fortes chaleurs.

Toutes les informations dans notre dossier technique



Vigne

La Flavescence dorée

La **Flavescence dorée** est une **maladie de quarantaine** (Directive Européenne 2000/29/CE) particulièrement contagieuse chez la vigne. Présente dans la plupart des zones de production viticole du sud de l'Europe, elle peut être à l'origine de fortes pertes de récolte et compromettre la pérennité des vignobles.

Cette maladie est causée par le phytoplasme de la Flavescence dorée : une petite bactérie sans paroi. Elle provoque une obstruction des vaisseaux conducteur de sève. Elle est transmise par un insecte vecteur, la cicadelle *Scaphoideus titanus* ainsi que par le greffage.

En tant que maladie de quarantaine, la Flavescence dorée fait l'objet d'une lutte réglementée et obligatoire.

Les symptômes sont **maintenant** visibles :

- **durcissement** du limbe des feuilles,
- **enroulement** des feuilles,
- **absence d'aoûtement** (lignification) du bois,
- **rougissement** (cépage rouge) ou **jaunissement** (cépage blanc) d'une partie du feuillage.
- **dépérissement** et/ou **flétrissement** des grappes

Financé par



Photo FREDON CVL et INRAE – D. Blancard – Symptômes dus à la flavescence dorée : Enroulement et décoloration du feuillage sur cépage rouge (gauche) et blanc (centre), flétrissement et dessèchement des baies (à droite).

Plus d'informations en cliquant le dossier Flavescence Dorée sur le site de FREDON CVL :

[FREDON CVL - la flavescence-doree](http://www.fredoncvl.fr/la-flavescence-doree)

ou sur le site ephytia de l'INRAE

<http://ephytia.inra.fr/fr/C/6070/Vigne-Phytoplasme-de-la-flavescence-doree>



Mildiou (*Plasmopora viticola*) et Oïdium (*Erysiphe necator*)

Mildiou : situation très saine.

Quelques grappes de cépages très sensibles peuvent présenter des symptômes d'**Oïdium**, mais globalement, la situation est très saine.



Photos site [e-phytia](http://ephytia.inra.fr)

Mildiou sur grappe.

Les baies infectées tardivement présentent des taches violacées, déprimées. On parle dans ce cas de « Rot brun »



Oïdium sur grappe. Les baies prennent une teinte gris-vert, la pellicule devient plus épaisse et liégeuse. Des éclatements peuvent se manifester, laissant apparaître les pépins.

Financé par

Méthodes de lutte et biocontrôle

- ✓ **Lutte contre le mildiou** : L'ébourgeonnage et l'épamprage (élimination des rameaux non fructifères ou proches du sol) favorisent l'aération du feuillage. Laisser également un enherbement, tondu régulièrement, au pied des ceps : il permet de diminuer la vigueur de la vigne et réduit sa sensibilité au mildiou. Attention, une tonte régulière est nécessaire pour limiter l'humidité au sol.
- ✓ **Lutte contre l'oïdium** : Il est important d'éviter les risques de projection des spores à partir du sol et de favoriser l'aération du feuillage pour réduire sa durée d'humectation après les pluies ou les rosées. Il faut donc supprimer les rameaux proches du sol (les plus sensibles car les plus proches du sol !) et éviter les entassements de végétation. Réduire l'humidité au pied des vignes (maîtriser l'enherbement ...).

Noyer

Mouche du brou de la noix (*Rhagoletis completa*)

La mouche du brou du noyer est un ravageur particulièrement néfaste pour la production et la conservation des noix. L'adulte vole de début juillet à septembre. Les femelles déposent leurs œufs sous la surface du brou durant cette période.

Le vol est fini mais les symptômes sont toujours observables. **Veiller à ramasser les brous pour limiter les populations de mouches l'année suivante.**



Les signes d'infestation peuvent être confondus avec ceux de la bactériose. Cette maladie s'attaque en premier lieu **au feuillage qui présente des taches jaunâtres diffuses dans un premier temps. Elle provoque également des taches noires sur le brou.**

Méthodes de lutte et biocontrôle

- ✓ En **fin de développement**, les larves sortent du brou, **se laissent tomber au sol pour finir leur cycle**. Le ramassage des brous et leur éloignement par rapport aux noyers permettent de limiter les populations de mouches l'année suivante.

ZOOM SUR ...

La rouille grillagée du poirier

Gymnosporangium sabinae

Des symptômes de rouille grillagée ont été signalés depuis fin juin – début juillet par plusieurs jardiniers de la région.

La rouille grillagée est une maladie cryptogamique causée par un champignon. Ce champignon nécessite la présence de **deux hôtes** pour réaliser son cycle : **Le genévrier** comme hôte principal (en hiver) et **le poirier** comme hôte secondaire (à partir du printemps). Les spores du champignon sont transportées entre les deux hôtes par le vent, la pluie et les insectes butineurs.



Photo M. Friot
Rouille grillagée sur poirier



Cornicules sur rameaux de *Juniperus*
Photo Y. Deneyer – Revue du cercle de mycologie de Bruxelles n°2 (2002)

Sur genévrier, le champignon développe sur les rameaux des **petits cônes brunâtres** (cornicules) qui se transforment ensuite en galles gélatineuses orange-brunes. L'hiver, le champignon hiberne sous forme de chancres protubérants, de galles ou d'excroissances noires sur les branches.

Les symptômes **sur poirier** sont la présence de minuscules **cercles de couleur allant du jaune vif à l'orange foncé** ou rouge sur la face supérieure des feuilles.

Ces taches vont grandir dans le temps, en nombre et en taille. **En cours d'été** apparaissent sur la face inférieure des feuilles du poirier des **tumeurs verruqueuses**, prenant finalement un aspect conique grillagé (filaments) et poudreux : Ces excroissances contiennent des spores qui pourront infecter un genévrier environnant.

Le poirier redevient sain dès la chute des feuilles, jusqu'à une nouvelle contamination par un genévrier.

Méthodes prophylactiques

- ✓ Eviter de cultiver côte à côte des poiriers et des genévriers.
- ✓ Prévoir un écart suffisant entre les arbres pour favoriser l'aération de végétation. Ne pas mouiller le feuillage des jeunes plants.
- ✓ Ramasser les feuilles malades ou mortes tombées au sol.

ARBRES, ARBUSTES ET PLANTES D'ORNEMENT

Arbres et arbustes d'ornement

Reprises de certains arbres ou arbustes après la canicule

Depuis fin août, certains arbres et arbustes d'ornement sont en reprise de végétation. Les jardiniers signalent la présence de nouvelles fleurs ou feuilles sur une partie ou la totalité des branches. De nombreuses espèces sont concernées.

Pour ces plantes en reprise, ne pas les tailler avant le repos végétatif en fin d'automne-hiver.

Quelques exemples en image



Photos FREDON CVL. : Erable ornamental avec nouvelles feuilles en cours



Photos FREDON CVL. : Cornouiller qui refleurit en septembre



Photos FREDON CVL. : Groseiller fleur avec repousses de feuilles

Buis

Pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*) - Chenille

Pas de signalement de chenilles de pyrale du buis cette semaine sur la région.

Restez vigilant, des vols de pyrales peuvent avoir lieu jusqu'en septembre-octobre avec des dégâts de chenilles dans ces périodes.

Financé par

Symptômes, biologie ...



[Retrouvez plus d'infos dans notre rubrique "Espèces Exotiques Envahissantes"](#)



Photo : FREDON CVL – présence d'une chenille de pyrale en train de consommer une feuille de buis.

Méthodes de lutte et biocontrôle

- Elimination des dernières chenilles à la main pour de petites surfaces de buis et des arbustes isolés.
- En cas d'infestation importante, un traitement à base de produits de biocontrôle type BT (*Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*) peut être envisagé. Eviter de traiter en période humide mais également sous forte chaleur. Se référer à la notice d'utilisation du produit.



Photo : FREDON CVL – présence d'une chenille de pyrale morte d'aspect desséché suite à une pulvérisation de Bacille de Thuringe.



Pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*) -Papillon

Dans notre région, un groupe de jardiniers bénévoles surveille les papillons de la pyrale du buis à l'aide de pièges à phéromones. 1 ou plusieurs pièges à phéromones sont disposés dans les jardins à proximité des buis et un comptage hebdomadaire est assuré afin de vérifier la présence (ou l'absence) et le nombre de papillons piégés. Ces données permettent de cibler d'éventuels pics de vol et donc de mieux positionner vos interventions sur les chenilles.

Sites d'observation	
Indre et Loire	Rochecorbon
	Fondettes x2
Indre	Buzançais
Loir et Cher	Mazangé
Eure et Loir	Chartres
Cher	Méreau


Photo FREDON CVL : – Papillons mâles de pyrale du buis capturés dans un piège à phéromone.



Actuellement, 6 sites de piégeage sont en place en région Centre-Val de Loire.

Aucune capture dans les pièges remontée en région Centre Val de Loire.

Toutefois méfiance : la surveillance est encore de mise avec cette année particulière.



Méthodes de lutte et biocontrôle

Les lâchers de trichogrammes (hyménoptères parasitoïdes oophages) ont donné de bons résultats. Leur mobilité est assez faible à partir des points de lâcher (environ 40 cm) donc cette méthode est plutôt adaptée à la protection des buis isolés ou topiaires.

À effectuer **dès la capture des premiers papillons** mâles en piège phéromonal.

Pélargonium

Ravageurs : Brun du pélargonium (*Cacyreus marshalli*)

Des dégâts de chenilles de brun du pélargonium sont actuellement observés dans le sud de la région. Les attaques de ce ravageur sont encore en cours à cette période.

Symptômes, biologie ...



Retrouvez plus d'infos dans notre rubrique "Espèces non réglementées"



Photos EPPO Global database. :

A gauche de haut en bas :
papillon de Brun face
supérieure puis papillon de
brun face inférieure



Photo ci-dessus Maryse Friot : -dégâts de
chenilles de brun sur pélargonium.

Méthodes de lutte et biocontrôle

- Traitement insecticide à éviter car peu efficace. Les chenilles cachées à l'intérieur des plantes ne peuvent pas être atteintes.
- Elimination des zones attaquées sur les plantes. Couper en dessous des zones attaquées et vérifier l'absence de galeries dans la partie de plante à garder.
- Pour prévenir l'attaque, une inspection minutieuse des plantes avant hivernage doit être réalisée pour repérer et éliminer les plantes touchées par ces chenilles.

Financé par

Pin et Cèdre

Chenille processionnaire du pin (*Thaumetopoea pityocampa*) - chenille

A partir **de fin novembre**, vous pourrez commencer à installer des écopièges autour des troncs afin de vous protéger des chenilles urticantes.



[Retrouvez toutes les infos utiles sur le site internet de FREDON CVL en cliquant ICI](#)

Rosier

Maladies et ravageurs

Certains rosiers sont en arrêt végétatif voire en légère pousse, d'autres ont réussi à faire d'assez belles branches pour assurer la prochaine saison.

Hortensia - Agrumes

Cochenilles

Les températures importantes ont été favorables au développement des populations de cochenilles sur les hortensias et sur les agrumes. La production de miellat par les cochenilles et la présence de fumagine détériore la qualité esthétique des plantes touchées.

Pour les citrus, plusieurs espèces de cochenilles peuvent se développer sur les pieds.

Symptômes, biologie ...



[Retrouvez plus d'infos sur la cochenille pulvinaire ici](#)

[Retrouvez plus d'infos sur la cochenille du citronnier *Planococcus citri* ici](#)

Méthodes de lutte et biocontrôle

- Elimination des cochenilles manuellement en les écrasant et en recherchant minutieusement tous les individus.
- **Utiliser des produits de biocontrôle** pour lutter contre les cochenilles.



Photo DGAI – J. Jullien :
Cochenilles pulvinaires



Photo Adans - USA :
Cochenilles planococcus
citri sur Kalanchoe



DOSSIER TECHNIQUE




L'augmentorium contre le carpocapse



L'**Augmentorium** concilie à la fois **prophylaxie** et **lutte biologique**. Il permet de lutter contre les ravageurs des fruits et légumes en aidant les auxiliaires à se développer.

Créé initialement pour l'expérimentation, cette technique a été développée dans les années 2010 pour la lutte contre différentes mouches des fruits dans les pays tropicaux.

Découvrez comment l'**Augmentorium** peut nous aider à préserver les auxiliaires tout en maintenant des mesures de prophylaxies non sélectives contre les carpocapses !



Pour en savoir plus, cliquer sur l'image pour consulter le dossier technique

Financé par

VIGILANCE SUR ...



Le Datura stramoine

Datura stramonium



Une note nationale a été publiée en février 2025 ayant pour sujet le **Datura Stramoine** (*Datura stramonium*).

Les *Datura* se développent dans les zones perturbées (les bords de routes, les fossés, les bords de rivières, les friches et les cultures). Toutes les espèces sont **extrêmement toxiques** car elles contiennent des alcaloïdes très puissants qui peuvent provoquer des intoxications très graves, même en très petites quantités. En agriculture, *D.stramonium* est une adventice qui peut être problématique, surtout dans les cultures estivales, ainsi que dans les cultures destinées aux conserves en raison de sa toxicité.

Vous pourrez retrouver la note nationale en cliquant sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF](#).

Pour plus d'informations sur les différentes espèces de Datura, cliquez sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF vers le dossier des fiches espèces Datura](#)


VIGILANCE SUR ...

Le Scarabée japonais – *Popillia japonica*

Votre SRAL Centre-Val de Loire souhaite vous informer sur la potentielle dangerosité d'un coléoptère, le scarabée japonais. Il s'agit d'un organisme réglementé non présent dans notre région mais qu'il convient de surveiller rigoureusement.

Savoir le reconnaître et anticiper son arrivée est indispensable pour la préservation de nos filières végétales et nos jardins.

Plus d'infos en cliquant sur la photo



VIGILANCE SUR ...

L'Ambroisie – *Un enjeu de santé publique*

L'ambroisie est une plante invasive dont le pollen est fortement allergisant, provoquant rhinites, conjonctivites, asthme... La lutte contre son expansion est l'affaire de tous. Chacun peut agir à son niveau :




- *Sur ma propriété : je l'arrache !*
- *Hors de ma propriété, sur un terrain public, s'il n'y a que quelques plants : je l'arrache !*
- *Hors de ma propriété, si la zone est fortement infestée : je la signale !*

Que faire en cas de découverte ?

Signalez la présence d'ambroisie [sur la plateforme nationale signalement Ambroisie](#) ou directement par le biais de l'application mobile « Signalement-Ambroisie »

Chaque signalement nous aide à être plus efficace.

Plus d'infos en cliquant sur la photo





AUXILIAIRES

Pour aller plus loin : 3 nouvelles Notes Nationales Biodiversité à consulter



Et toujours



Ce bulletin est publié à partir d'observations ponctuelles ou régulières, réalisées par un réseau d'épidémiosurveillance en jardins, espaces végétalisés et infrastructures (JEVI). S'il donne une tendance de la situation phytosanitaire régionale la plus représentative et objective possible, il reste nécessaire pour chaque gestionnaire de JEVI de considérer également le résultat de ses propres observations. Les informations contenues dans ce bulletin ne peuvent être transposées telles quelles à d'autres situations. Elles permettent de donner des tendances d'évolutions phytosanitaires à l'échelle de petites régions. FREDON Centre Val de Loire dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les gestionnaires d'espaces vert, jardiniers amateurs ou détenteurs de végétaux sur la base des informations communiquées dans ce bulletin.

Observations : Ce bulletin est rédigé grâce aux observations des jardiniers, issues de toute la région Centre-Val de Loire, des associations d'horticulture (Sociétés d'Horticulture 37-41-45-18-36-28), de l'APJRC (Association des Parcs et Jardins de la région Centre-Val de Loire, de jardins familiaux (AOJOF), de villes (Tours, Orléans), de châteaux, du Centre des Monuments Nationaux.

Animation : Cyril KRUCZKOWSKI - FREDON Centre Val de Loire

Rédaction : Monique CHARLOT – Marie-Pierre DUFRESNE - FREDON Centre Val de Loire

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du BSV JEVI « La Santé des jardins et Espaces Végétalisés - région CVL»

Renseignements : bulletinjevi@fredon-centrevaldeloire.fr

Financé par