

Information sanitaire : PULLULATION DE PUNAISES DES CHAMPS

Mise à jour : 31 août 2026

Depuis plusieurs jours, de **nombreux administrés** habitant à **proximité de champs récoltés** (du colza dans la majorité des cas) ont constaté un **phénomène de pullulation** et d'agrégation d'insectes dans les environs immédiats de ces champs. Les **insectes incommodes** les habitants en **se regroupant dans les jardins, sur les façades et toitures des maisons** et parfois en **rentrant dans les habitations**, contraignant les personnes à maintenir fermées portes et fenêtres, et à calfeutrer les autres voies d'entrée possibles.

Il s'agit en fait des **punaises de la famille des Lygaeidae**, appelées communément Punaises des champs, Punaises des céréales ou encore Punaises du colza, qui éclosent dans les chaumes de colza (le plus souvent) avant de se disséminer. A ce jour, elles **n'ont pas pu être identifiées** plus précisément, car les **pullulations sont le fait d'individus juvéniles** (c'est-à-dire au stade larvaire), or **une identification spécifique** nécessiterait **des individus adultes**. Dans la famille des Lygaeidae, plusieurs genres sont susceptibles de causer des pullulations (comme *Nysius cymoides*).



Pullulation de punaises des champs autour d'une piscine.
Commune d'Esvres sur Indre
Crédit photo : CK FREDON CVL

1. Description



Stade juvénile de punaises des champs
Crédit photo : FREDON AURA

Taille comprise entre **1 et 4.5 mm** selon son stade de développement. Les larves présentent un avant-corps à dominante gris/brun et un abdomen de couleur marron/rougeâtre. Sur les individus de stades larvaires les plus avancés, on distingue les ébauches ailes.

2. Observation du phénomène

Plusieurs communes de la région Centre-Val de Loire semblent impactées par ce phénomène actuellement. Ce **phénomène de pullulation exceptionnelle** avait été signalé à la DRAAF Centre-Val de Loire et la Chambre Régionale d'Agriculture de la région Centre-Val de Loire pour la première fois en 2019.

3. Nuisibilité

Les **pullulations de punaises des champs** peuvent être importantes. Elles peuvent alors occasionner une gêne pour les personnes qui y sont confrontées. Cette gêne dépend notamment du nombre d'insectes présents.

À ce jour, aucun cas de piqûre ou d'allergie lié à ces punaises n'a été rapporté. **Les punaises des champs ne présentent donc pas de danger connu pour la santé publique.**

Dans la région, aucune dégradation des bâtiments ou des végétaux n'a été constatée à ce jour. Les jardins, potagers et arbres fruitiers ne semblent notamment pas subir de dégâts.



Pullulation de punaises des champs au pied d'une porte
Credit photo : FREDON Bretagne

4. Méthodes de contrôle

À ce jour, **aucune méthode de lutte efficace n'a été testée et validée** contre les pullulations de punaises des champs.

Les particuliers peuvent faire appel à une entreprise de désinsectisation, mais en dehors de toute considération sur les risques sanitaires de ces pratiques, il convient de préciser que ces traitements agissent uniquement sur les insectes présents au moment de l'intervention et n'empêchent pas l'arrivée de nouvelles punaises.

En attendant la fin du phénomène de pullulation, privilégier des solutions mécaniques. **L'aspiration des insectes**, avec un sac permettant ensuite leur élimination, peut notamment être envisagée. L'utilisation d'eau constitue également une possibilité.

L'invasion dure généralement de 10 à 15 jours et le phénomène de pullulation devrait progressivement diminuer avec l'arrivée de **températures plus fraîches ou de périodes pluvieuses**. La mortalité naturelle des insectes peut également contribuer à réduire leur présence.

Source d'informations techniques : réseau FREDON