



Canne à Sucre

N°3- 1er Mai
au 30 Juin

2026

Animateur inter-filières : Teddy OVARBURY
(FREDON).

Jacques-Edouard EUGENIE
(FREDON).

Animatrice filière :
Marion TAILLIEZ (CTCS)

Crédit photo : Centre Technique de la canne à sucre

A retenir

La récolte récente des parcelles suivies ainsi que la pluviométrie largement déficitaire en juin en Martinique, a permis de limiter l'enherbement des parcelles. Néanmoins, le risque n'en demeure pas moins important, notamment sur les parcelles ayant fait l'impasse sur les opérations de désherbage en début de cycle. Une parcelle présente d'ailleurs un enherbement particulièrement important à 3 mois post-récolte.

Aucune attaque de rat n'a été recensée en mai et juin 2026 sur les parcelles observées, mais le risque reste très important sur les parcelles restées sur pied (jeunes plantées et/ou récoltées en fin de campagne).



28,7°C

sur 28°C attendus



+27h35

en Juin 2026



62,2 mm

sur 175,9 mm attendus



22,7 km/h

sur 17,6 km/h habituellement

Source : Météo France - Juin 2026 (données de Mai 2026 indisponibles auprès de Météo France à la date de publication du BSV)

LE RESEAU DE SURVEILLANCE


Réseau de surveillance : 5 parcelles

- Lamentin,
- Sainte-Luce,
- Basse-Pointe,
- Sainte-Marie
- Saint-Pierre.

Méthode :

- Suivi des principales espèces d'adventices et de leur développement,
- Observations visuelles des symptômes de maladies et des dégâts de ravageurs.

Fréquence : 2 observations par mois et par site tous les 15 jours.



● Localisation des parcelles du réseau de surveillance

SITUATION GLOBALE

Suivi	Mai-2026				Juin-2026			
	Niveau de présence	Parcelles touchées* / observées	Evolution	Risque	Niveau de présence	Parcelles touchées* / observées	Evolution	Risque
Enherbement	Jaune	1/5	→	Orange	Jaune	1/5	→	Orange
Rongeurs (rats)	Vert	0/5	→	Jaune	Vert	0/5	→	Jaune

Niveau de présence et de risque :

Absence
 Faible : A surveiller, risque possible
 Moyen : possibilité d'impact sur la canne
 Fort : impact certain sur la canne

* Parcelle ayant un niveau de présence moyen et fort en note globale de recouvrement

Bilan par parcelle observée

PARCELLE CAS01 - LAMENTIN

 **Date de plantation :** 09/2023  **Dernière récolte / Âge de la canne :** 1 mois  **Variété :** B 69.566

L'enherbement de la parcelle se maintient autour de 30% au Lamentin en mai 2026. Les canaux sont particulièrement enherbés par les lianes (*Vigna unguiculata*, *Momordica charantia* et *Meremia aegyptia*). La parcelle a été récoltée le 01/06/2026 avec un rendement de 98 T/ha, très bon rendement pour la zone du Lamentin. L'enherbement a été plutôt bien maîtrisé et les rongeurs ont peu attaqué la canne malgré leur présence. Il convient d'être vigilant sur la gestion de l'enherbement en début de cycle afin de minimiser les impacts sur le rendement en 2027. L'enherbement de la parcelle en juin se situe entre 0 et 7%.

 ***Paspalum fasciculatum* (canne d'eau) et *Rottboellia cochinchinensis* (herbe à riz) en bordure, *Vigna unguiculata* (+++) *Meremia aegyptia*, *Momordica charantia***

PARCELLE CAS02 - SAINTE LUCE

 **Date de plantation :** 11/2025  **Dernière récolte / Âge de la canne :** 7,5 mois  **Variété :** B 69.566

Avec une pluviométrie faible, l'enherbement de cette parcelle s'est peu développé sur le rang et se stabilise autour de 15% en mai 2026. L'inter-rang est particulièrement investie par de la petite herbe à riz (*Echinochloa colona*) et le rang par quelques lianes (*Meremia aegyptia*, Ipomées) et d'autres dycotylédones (*Macroptilum lathyroides*, *Cleome viscosa*). La parcelle n'a malheureusement pas pu être suivie en juin faute de temps disponible pour les observations.

 **Vigilance sur *Echinochloa colona* (petite herbe à riz) et lianes sur le rang**

PARCELLE CAS03 - SAINTE MARIE

 **Date de plantation :** fin 06/2024  **Dernière récolte / Âge de la canne :** 12 mois  **Variété :** B 69.566

La parcelle est considérée comme propre, avec un enherbement de 15% en mai et juin 2026. Les tâches d'adventices sont majoritairement des lianes (*Vigna unguiculata*, *Meremia aegyptia*, *Vigna luteola*). Les abords sont entretenus mais on observe néanmoins une concentration d'herbe à riz (*Rottboellia cochinchinensis*) dans les canaux, et de canne d'eau (*Paspalum fasciculatum*) en bordure. Ces monocotylédones ne semblent pour l'instant pas envahir la parcelle. La parcelle devrait bientôt être récoltée.

 ***Vigna unguiculata*, *Vigna luteola*, *Meremia aegyptia*, *Phenax sonneratii*
Vigilance sur *Rottboellia cochinchinensis* et *Paspalum fasciculatum* en bordure**

PARCELLE CAS04 - BASSE POINTE

 **Date de plantation :** 18/03/2026  **Dernière récolte / Âge de la canne :** 3,5 mois  **Variété :** B69.566

La parcelle suivie à Basse Pointe a été replantée à la mi-mars 2026. Elle a été plantée en BPG (Boutures Pré-Germées) et en double rang. L'enherbement de la parcelle est donc faible en mai et juin 2026. On observe néanmoins quelques tâches de lianes en mai sur le rang et du chiendent (*Cynodon dactylon*) dans l'inter-rang en juin. Un traitement chimique anti-liane ainsi qu'un sarclage mécanique de l'inter-rang en juin ont permis de stabiliser l'enherbement de la parcelle autour de 7%.

 ***Vigna unguiculata*, *Momordica charantia*, *Meremia aegyptia*, *Cynodon dactylon***

PARCELLE CAS05 - SAINT PIERRE

 **Date de plantation :** 30/03/2026  **Dernière récolte / Âge de la canne :** 3 mois  **Variété :** B 69.566

L'enherbement de la parcelle est particulièrement important en mai et juin 2026, avec principalement de l'herbe de guinée (*Panicum maximum*) et des lianes (*Momordica charantia*, *Mucuna puriens*, *Meremia aegyptia*) recouvrant 30 à 50% de la parcelle. Mi-juin, plusieurs opérations de désherbage (chimique en post-lévée, mécanique en inter-rang et manuel pour l'herbe de guinée) ont permis de faire descendre le recouvrement des adventices autour de 30%. On émet néanmoins des inquiétudes sur l'impact de ces adventices en début de cycle sur le prochain rendement.

 **Grande vigilance sur le *Panicum maximum* + *Vigna unguiculata* + *Momordica charantia* + *Merremia aegyptia***
Attention la B69.566 est particulièrement sensible aux attaques de rongeurs (écorce tendre). A surveiller.



Parcelle récoltée
10/06/2026




Inter-rang
07/05/2026



Canal
22/06/2026



Momordica charantia sur le rang
04/05/2026



Tapis de lianes
20/05/2026

Focus sur les principaux bioagresseurs identifiés

ADVENTICES

Pression: **Nulle** à **Forte** (0 à 50 %)



Conditions optimales de développement du nuisible : Chaleur, précipitations



Principales espèces identifiées en mai et juin 2026 :

- Dicotylédones : *Merremia aegyptia*, *Vigna unguiculata*, *Vigna luteola*, *Momordica charantia*, Euphorbes, *Cleome ruditosperma*, *Emilia fosbergii*
- Monocotylédones : *Panicum maximum*, *Paspalum fasciculatum*, *Rottboellia cochinchinensis*, *Echinochloa colona*, *Phenax sonneratii*



Situation terrain et évaluation du risque : L'enherbement des parcelles est variable selon le stade de la canne sur le terrain. Les parcelles récemment récoltées ont un enherbement nul à faible, tandis que d'autres parcelles, ayant fait l'impasse sur certaines opérations de désherbage sont davantage enherbées. Néanmoins, l'enherbement moyen reste faible en mai et juin 2026.

METHODES DE MAÎTRISE EN COURS DE CULTURE

- Désherbage mécanique et manuel (voir [Pratiques agroécologique en culture de canne à sucre](#))
- Entretien des bordures et des canaux

RONGEURS : RATS

Pression : **Nulle**

Espèce exotique envahissante, selon l'arrêté du 7 juillet 2020



Conditions optimales de développement du nuisible : Chaleur, précipitations, cannes mûres, post-récolte



Principales espèces identifiées : *Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*

Situation terrain et évaluation du risque :


Aucune parcelle suivie n'est impactée par les rats.




En revanche, le risque d'attaques de rats est élevé sur les parcelles restées sur pied et ayant des variétés sensibles.

METHODES PROPHYLACTIQUES

- Choix de variétés moins sensibles aux attaques de rats
- Entretien des abords des chemins et parcelles
- Stockage des denrées alimentaires dans des locaux adaptés et contenant hermétiques
- Piégeage



SUIVI DE L'ENHERBEMENT



SUIVI DES RONGEURS

CARTES DE PRESENCE ET RISQUES DES BIOAGRESSEURS DE LA CANNE - MAI/JUIN 2026

Niveau de présence et de risque :

■ Absence ■ Faible : A surveiller, risque possible ■ Moyen : possibilité d'impact sur la canne ■ Fort : impact certain sur la canne

Compléments d'informations

- [Pratiques agroécologique en culture de canne à sucre](#)



Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale.

La Chambre d'Agriculture de la Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles.

Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.

Action du plan ECOPHYTO piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité.

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**

