

Martinique

Bulletin de Santé du Végétal

Banane

N° 8 - 1er au 31 Août
2026

Animateurs inter-filières :

Teddy OVARBURY (FREDON Martinique)
Jacques-Edouard EUGENIE (FREDON Martinique)

Animateurs filières :

Jacques-Edouard EUGENIE (FREDON Martinique)
Grégory COLDOLD (SICA Cercoban)

Avec les données d'observations de :

SICA Cercoban, UGPBAN et Presta' SCIC

Crédit photos (sauf mentions contraires) : FREDON
Martinique.

PRÉVISIONS SAISONNIÈRES AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE

En Martinique, le trimestre à venir devrait être moins humide que la normale, tandis que les températures devraient rester légèrement supérieures aux valeurs habituelles.

En août, les précipitations ont été très déficitaires. La température moyenne est demeurée supérieure à la normale et la vitesse moyenne des vents s'est révélée légèrement plus élevée.

Par ailleurs, certaines stations ont enregistré, pour un mois d'août, leur température minimale mensuelle la plus élevée. Elles ont également atteint une température moyenne mensuelle équivalente au précédent record.

SYNTHÈSE À LA STATION DE RÉFÉRENCE DU LAMENTIN

29,3°C 
pour un attendu
de 28,1°C


+12 h 18



131,6 mm **18,7 km/h**

257,3 mm
attendus

pour une norme
de 13,3 km/h

CERCOSPORIOSE NOIRE



PRESSION MODÉRÉE

AUGMENTATION

- Niveau moyen des EE en légère augmentation (au dessus des 250)
- Des évaporations hautes pour un mois d'août
- Pression localisée entre le Lorrain et Ajoupa-Bouillon

MALADIES DE CONSERVATION



PRESSION FAIBLE

STABILITÉ

- Le taux de MDC du mois d'août 2026 (0,56%)
- Sous le seuil des 1%.

CHARANÇON DU BANAÑIER




PRESSION MOYENNE

AUGMENTATION

- Captures en augmentation sur ce mois d'août
- Tendance haussière sur cette fin d'année

CERCOSPORIOSE NOIRE

OBSERVATIONS ET ANALYSE DE RISQUE




La carte ci-contre présente, à la fin du mois de août, l'état de la pression de la cercosporiose noire en Martinique.

Comme en juillet, les relevés du mois d'août effectués dans **le nord atlantique et sur la dorsale** présentent une forte pression de la maladie avec **des niveaux d'EE pouvant dépasser les 750 le foyer étant localisé entre le Lorrain et Ajoupa Bouillon**.

Néanmoins, sur **la plaine de Basse-Pointe / Macouba le sud, la zone Caraïbe et sur la plaine du Lamentin**, les chiffres restent **bas** avec **des relevés de niveau faible à modéré**.

Nous pouvons donc statuer sur un **risque de contamination modéré**.

Moyenne hebdomadaire des états d'évolution
(60 postes d'observation)



Le graphique ci-contre montre qu'en août, **la situation de pression est modérée** donnant des moyennes **au dessus de 250** sur les deux dernières semaines.

Cette remontée de la moyenne des états d'évolution est due à une pression plus importante sur les zones traditionnelles de forte pression (Morne- Rouge, Ajoupa, hauts du Lorrain, Gros Morne, Saint Joseph).

La vigilance est de mise sur l'élimination des nécroses.


Evaluation du risque: Le risque de contamination est **modéré**

CERCOSPORIOSE NOIRE

Facteurs explicatifs

Le graphique ci-dessous illustre le niveau d'évaporation durant le mois d'août, couvrant les semaines 32 à 35. Bien qu'elles demeurent élevées en cette période de l'année, globalement, les évaporations se tassent permettant ainsi le redémarrage progressif de la maladie.

Évaluation du risque : modéré



Les évaporations PICHE correspondent à la quantité d'eau évaporée à la surface de la feuille. Elles sont un facteur explicatif de la pression de la maladie.

Évaporations > 30 mm/semaine : développement des cercosporioses faible

Évaporations < 22 mm/semaine : conditions idéales pour les cercosporioses

GESTION DU RISQUE

Les nécroses présentes sur les feuilles de bananier émettent des spores contaminantes qui se déposent sur les feuilles adjacentes et les parcelles avoisinantes.

Leur élimination ciblée et hebdomadaire permet de diviser par trois le potentiel infectieux de l'inoculum.

Cette prophylaxie est essentielle dans la réussite du contrôle de la cercosporiose noire. Elle s'applique à tous les bananiers tant d'exportation, plantains ou figues sucrées.



A savoir qu'il existe un risque de résistance avéré pour les produits à base **difénocanazole** et de **trifloxystrobine**. Leur utilisation doit donc être alternée avec celle de produits composés d'autres substances actives.


Des produits de biocontrôle existent. Par ailleurs, la mise en œuvre du coupe-feuille ou effeuillage sanitaire est une mesure prophylactique cruciale dans la gestion de la maladie.




MALADIES DE CONSERVATION

Les maladies de conservation qui apparaissent sur les bananes vertes à leur arrivée en Europe sont constituées d'un certain nombre de **champignons** qui vont se développer sur différentes parties du fruit comme la couronne, l'épiderme et les pédoncules. Les chancres apparaissent sur un **défaut d'origine** (pliore, meurtrissure, couteau, apex...). La pourriture des couronnes survient par **un mauvais traitement, peu de temps de lavage, une mauvaise qualité de l'eau...**

OBSERVATIONS ET ANALYSE DE RISQUE




Répartition des Maladies de conservation- Août 2026



Une situation bien meilleure que les années précédentes au niveau des maladies de conservation surtout moins de pourritures de couronnes. On note surtout des pliures chancrées (les pédoncules sont longs)

Risque faible

Source : UGPBAN



Ci-contre quelques photos illustrant les MDC transmises par l'UGPGAN. De gauche à droite, nous avons :

- 1 pourriture de couronne
- 2 pourriture de pédoncule
- 3 pourriture d'épiderme

GESTION DU RISQUE

Afin de compenser les conditions climatiques favorables aux maladies de conservation qui continuent à prévaloir, les mesures prophylactiques doivent être renforcées :

- Gainage des régimes au stade dernière main horizontale, avec mise en place du lien au-dessus de la cicatrice de la première bractée
- Epistillage au champ
- Retrait des bractées et de la cravate
- Retournement, écartement ou découpe de la dernière feuille sortie avant le régime
- Nettoyage régulier de la station de conditionnement (en particulier élimination des déchets végétaux)
- Bonne gestion du point de coupe
- Adaptation du nombre de mains supprimées à la surface foliaire saine du bananier
- Récolte des régimes sur trays adaptés
- Transport des régimes en position verticale
- Réfection des traces pour limiter les chocs

Retrouvez plus d'informations sur les fiches [Soins aux régimes](#) et [Maladies de Conservation \(MDC\)](#) et du Manuel du planteur (IT²).



©UGPBAN



Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale.

Action du plan ECOPHYTO piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité.