

Martinique



Bulletin de Santé du Végétal

Cultures maraîchères

N° 8 - 1er au 31 Août
2026

Animateurs inter-filière et filière diversification :

Teddy OVARBURY (FREDON Martinique)

Jacques-Edouard EUGENIE (FREDON Martinique)

Crédit photos :

FREDON Martinique

PRÉVISION SAISONNIÈRE

septembre à novembre 2026

“En Martinique, le prochain trimestre devrait être, comme le trimestre précédent, moins arrosé et les températures un peu supérieures aux normes.”

SEC ET CHAUD

SYNTHÈSE À LA STATION DE RÉFÉRENCE DU LAMENTIN



29,3°C

Sur 28,1°C attendus



235 h 43 min

Sur 223 h 25 min attendues



131,6 mm

Sur 257,3 mm attendus



18,7 km/h

Sur 13,3 km/h habituellement

FAITS MARQUANTS

Ce mois-ci, certaines stations ont enregistré une température minimale mensuelle la plus élevée pour un mois d'août.

ASTÉRACÉES



- **Pression globale nulle,**
- Faible infestation des mouches mineuses
- Risque moyen d'infestation d'aleurodes et de mouches mineuses pour le mois à venir.

CUCURBITACÉES



- **Pression globale nulle,**
- Risque moyen d'infestation de thrips, d'aleurodes, de pucerons et de mouches mineuses pour le mois à venir.

SOLANACÉES




- **Pression globale nulle**
- Risque moyen d'infestation d'aleurodes et de virus pour le mois à venir.

BRASSICACÉES



- Aucune parcelle cultivée dans notre réseau.



Astéracées

LAITUE

RÉPARTITION SPATIALE DES PARCELLES D'OBSERVATION ET DES CULTURES

Variété de laitue	Nombre observations	Stade végétatif
Batavia	3	Développement végétatif - Récolte
Feuille de chêne rouge	1	Récolte
Feuille de chêne verte	2	Développement végétatif
Total	6	



PRESSIION BIOTIQUE

ÉVOLUTION DES ORGANISMES NUISIBLES SUR LAITUE

		janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26
Cercosporiose	Fréquence												
	Intensité												
Mouches mineuses serpentine	Fréquence												
	Intensité												
Mouches mineuses en plaque	Fréquence												
	Intensité												
Mollusques (Escargots, limaces)	Fréquence												
	Intensité												
Légende :		Pas de données	Nul / Quasi nul	Faible	Moyen	Fort							

L'état sanitaire de la culture de laitue a évolué sur les parcelles suivies. La pression exercée par la cercosporiose est désormais nulle, tandis que celle des mouches mineuses, précédemment absente, passe à un niveau faible.



Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque

Faible

Conditions favorables pour le nuisible : • Pluies fréquentes • Températures proches des 25°C

Situation terrain : La pression de la cercosporiose est passée à un niveau nul sur les parcelles suivies. Aucun nouveau symptôme n'a été observé au cours des dernières observations,

Évaluation du risque : les prévisions météorologiques présagent un trimestre plus chaud et sec, défavorable au développement de la cercosporiose ; **annonçant un risque faible pour le mois à venir.**

Mesures prophylactiques spécifiques :

- Privilégier des zones avec une bonne exposition au soleil et au vent
- Respecter les distances de plantation pour une bonne circulation du vent
- Entretenir les abords des parcelles
- Sarcler régulièrement les parcelles
- Favoriser un bon drainage pour l'évacuation de l'eau
- Préférer l'irrigation au goutte-à-goutte
- Effectuer l'association et la rotation de cultures



Fréquence :
Faible

Intensité :
Faible

Évaluation du risque

MOYEN

Conditions favorables pour le nuisible : • Températures entre 20°C et 30°C

Situation terrain : une présence de mouches mineuses a été observée sur les parcelles suivies, avec une faible pression. Les dégâts constatés sont restés limités et se sont principalement concentrés sur les feuilles inférieures des plants.

Évaluation du risque : les prévisions météorologiques présagent un trimestre favorable au développement des mouches mineuses, **annonçant un risque moyen d'infestation pour le mois à venir. Restez vigilant.**

Fréquence :
Faible

Intensité :
Faible

Évaluation du risque

MOYEN

Mesures prophylactiques

- Contrôler régulièrement l'état sanitaire des plants
- Éliminer les plants infestés et les déchets de cultures
- Réaliser une rotation des cultures
- Sarcler les parcelles et entretenir régulièrement leurs abords
- Effectuer l'association et la rotation de cultures



Cucurbitacées

RÉPARTITION SPATIALE DES PARCELLES D'OBSERVATIONS ET DES CULTURES

Culture	Nombre observations	Stade végétatif
Concombre	4	Nouaison-Récolte
Total	4	



PRESSIION BIOTIQUE ÉVOLUTION DU NIVEAU D'ATTAQUE DES ORGANISMES NUISIBLES SUR CUCURBITACÉES

		janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26
Aleurodes (<i>Bemisia tabaci</i>)	Infestation												
	Dégâts												
Mouches mineuses	Infestation												
	Dégâts												
Thrips (<i>Thrips palmi</i>)	Infestation												
	Dégâts												
Pucerons	Infestation												
	Dégâts												

Légende : Pas de données Nul / Quasi nul Faible Moyen Fort

Une amélioration globale de l'état sanitaire a été observée sur l'ensemble des parcelles de concombre suivies. Les dernières observations n'ont révélé aucune présence de ces bioagresseurs, témoignant d'une situation sanitaire globalement saine.



Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque

MOYEN

Conditions favorables : • Temps sec

Situation terrain et évaluation du risque :

Le climat sec du mois a été favorable au développement des aleurodes. Toutefois, leur gestion, basée sur les principes de l'agriculture intégrée, a permis de neutraliser les populations du bioagresseur. Les mesures prophylactiques appliquées ont contribué à cette maîtrise. **Le risque de contamination pour le mois à venir est néanmoins estimé moyen** ; compte tenu des prévisions climatiques annonçant un trimestre plus sec et plus chaud. **Restez vigilant.**

Mesures prophylactiques spécifiques :

- Utiliser des plants sains (plants de pépinières insect-proof)
- Favoriser les auxiliaires
- Gérer l'enherbement
- Utiliser des produits de biocontrôle :
- [Liste des produits de biocontrôle 2025](#)



Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque

MOYEN

Conditions favorables : • Températures entre 20°C et 30°C

Situation terrain et évaluation du risque :

Aucune présence significative de mouches mineuses n'a été observée sur les parcelles suivies. Le mois, marqué par un climat sec favorable à leur développement, n'a toutefois pas entraîné de pression notable du ravageur. Dans ce contexte et au regard des conditions climatiques annoncées, **la pression pour le mois à venir est toutefois estimée moyenne. La vigilance est de rigueur.**

Mesures prophylactiques spécifiques :

- Utiliser des plants sains (plants de pépinières insect-proof)
- Favoriser les auxiliaires
- Gérer l'enherbement
- Utiliser des produits de biocontrôle :
- [Liste des produits de biocontrôle 2025](#)





Thrips (Thrips palmi)

Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque

MOYEN

Conditions favorables : • Températures entre 10°C et 35°C

Situation terrain et évaluation du risque :

Leur gestion a permis de ramener les populations à un niveau nul. Les mesures prophylactiques ont contribué à cette maîtrise. **Le risque de contamination pour le mois à venir est néanmoins estimé moyen**, au regard des prévisions d'un trimestre plus sec et plus chaud. **Soyez très vigilant.**

Mesures prophylactiques :

- Utiliser des plants sains (plants de pépinières insect-proof)
- Favoriser les auxiliaires
- Gérer l'enherbement
- Utiliser des produits de biocontrôle :
- [Liste des produits de biocontrôle 2025](#)
- Effectuer l'association et la rotation de cultures



PUCERONS

Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque

MOYEN

Conditions favorables : • Présence de jeunes pousses • Températures élevées

Situation terrain et évaluation du risque :

Aucune présence significative de pucerons n'a été relevée sur les parcelles suivies. Le mois, caractérisé par un climat sec favorable à leur développement, n'a cependant pas engendré de pression notable du ravageur. **Le risque pour le mois à venir est estimé moyen**, compte tenu des prévisions climatiques annonçant un climat sec et chaud, favorable au développement de l'insecte. **Restez vigilant.**

Mesures prophylactiques :

- Utiliser des plants sains (plants de pépinières insect-proof)
- Favoriser les auxiliaires
- Gérer l'enherbement
- Utiliser des produits de biocontrôle :
- [Liste des produits de biocontrôle 2025](#)



Solanacées

TOMATE

RÉPARTITION SPATIALE DES PARCELLES D'OBSERVATIONS ET DES CULTURES

Culture	Nombre observations	Stade végétatif
Tomate	2	Floraison-Nouaison
Total	2	



PRESSIION BIOTIQUE

ÉVOLUTION DU NIVEAU D'ATTAQUE DES ORGANISMES NUISIBLES SUR TOMATES

		janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26
Aleurodes (<i>Bemisia tabaci</i>)	Fréquence												
	Intensité												
Noctuelles de la tomate (<i>Helicoverpa zea</i>)	Fréquence												
	Intensité												
Viroses (PYMV, TYLCV)	Fréquence												
	Intensité												
Flétrissement bactérien (<i>Ralstonia solanacearum</i>)	Fréquence												
	Intensité												
Acariose bronzeé (<i>Aculops lycopersici</i>)	Fréquence												
	Intensité												

Légende : Pas de données Nul / Quasi nul Faible Moyen Fort

L'état sanitaire de la tomate est resté globalement satisfaisant. Les dernières observations n'ont mis en évidence aucune présence des bioagresseurs.



Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque

MOYEN

Conditions favorables : • Temps sec

Situation terrain et évaluation du risque :

Les conditions climatiques sèches du mois ont été favorables au développement des aleurodes. Néanmoins, les stratégies de gestion mises en œuvre selon les principes de l'agriculture intégrée ont permis de maîtriser les populations de ce bioagresseur. **Le risque de contamination pour le mois à venir est néanmoins estimé moyen** ; compte tenu des prévisions climatiques annonçant un trimestre plus sec et plus chaud. **Restez vigilant.**

Mesures prophylactiques spécifiques :

- Utiliser des plants sains (plants de pépinières insect-proof)
- Favoriser les auxiliaires
- Gérer l'enherbement
- Utiliser des produits de biocontrôle :
- Liste des produits de biocontrôle 2025



Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque

MOYEN

Conditions favorables : • Présence de jeunes pousses • Températures élevées

Situation terrain et évaluation du risque :

Aucune présence de noctuelle n'a été détectée sur les parcelles suivies. **Le risque pour le mois à venir est estimé moyen**, compte tenu des prévisions climatiques annonçant un climat aux températures plus élevées, favorable au développement de l'insecte. **Restez vigilant.**

Mesures prophylactiques :

- Utiliser des plants sains (plants de pépinières insect-proof)
- Favoriser les auxiliaires
- Gérer l'enherbement
- Utiliser des produits de biocontrôle :
- Liste des produits de biocontrôle 2025





Fréquence :

Nulle

Intensité :

Nulle

Évaluation du risque

MOYEN

Conditions favorables : • Temps sec • Présence de vecteurs • Températures élevées

Situation terrain et évaluation du risque :

Aucune présence significative de virus n'a été relevée. **Le risque pour le mois à venir est estimé moyen**, compte tenu des prévisions climatiques annonçant un climat sec et chaud, favorable au développement des insectes vecteurs. **Restez vigilant.**

Mesures prophylactiques :

- Lutter contre le vecteur du virus (aleurodes)
- Éliminer et détruire les systèmes racinaires et les tiges en fin de culture
- Désinfecter le matériel (engins, outils, bottes et chaussures, ...)



Fréquence :

Nulle

Intensité :

Nulle

Évaluation du risque

FAIBLE

Conditions favorables : • Températures élevées

Situation terrain et évaluation du risque :

Aucune présence de flétrissement bactérien lors des observations. Les prévisions climatiques présageant un climat plus sec et chaud, peu favorable au développement de la bactérie, présente un **risque faible pour le mois à venir**. **Restez vigilant.**

Mesures prophylactiques :

- Éliminer et détruire les systèmes racinaires et les tiges en fin de culture
- Les parcelles affectées sont à travailler en dernier
- Désinfecter le matériel (engins, outils, bottes et chaussures, ...)
- Privilégier la rotation de culture avec des cultures insensibles au flétrissement bactérien
- Associer la culture de tomate avec de l'oignon pays



Fréquence :

Nulle

Intensité :

Nulle

Évaluation du risque

MOYEN

Conditions favorables : • Présence de jeunes pousses • Températures élevées

Situation terrain et évaluation du risque :

Aucune présence significative d'acariens n'a été relevée sur les parcelles suivies. Le mois, caractérisé par un climat sec favorable à leur développement, n'a cependant pas engendré de pression notable du ravageur. **Le risque pour le mois à venir est estimé moyen**, compte tenu des prévisions climatiques annonçant un climat sec et chaud, favorable au développement de l'insecte. **Restez vigilant.**

Mesures prophylactiques :

- Utiliser des plants sains (plants de pépinières insect-proof)
- Gérer l'enherbement
- Utiliser des produits de biocontrôle :
- [Liste des produits de biocontrôle 2025](#)



Les abeilles butinent, protégeons les !

Respectez les bonnes pratiques phytosanitaires

1

Les traitements insecticides et/ou acaricides sont interdits, sur toutes les cultures visitées par les abeilles et autres insectes pollinisateurs, pendant les périodes de floraison et de production d'exsudats.

2

Par dérogation, certains insecticides et acaricides peuvent être utilisés, en dehors de la présence des abeilles, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation adaptée ayant conclu à un risque acceptable. Leur autorisation comporte alors une mention spécifique "emploi autorisé durant la floraison et/ou au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles".

3

Il ne faut appliquer un traitement sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les conditions d'emploi associées à l'usage du produit, mentionnées sur la brochure technique (ou l'étiquette) livrée avec l'emballage de la spécialité commerciale autorisée.

4

Afin d'assurer la pollinisation des cultures, de nombreuses ruches sont en place dans ou à proximité des parcelles en fleurs. Il faut veiller à informer le voisinage de la présence de ruches. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur ces parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines, peuvent avoir un effet toxique pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Il faut éviter toute dérive lors des traitements phytosanitaires.

Retrouvez plus d'information dans la [note nationale Abeilles & Pollinisateurs](#) qui propose une synthèse d'informations actualisées pour la protection des insectes pollinisateurs et relative à la réglementation sur les produits phytopharmaceutiques.



Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale.

FREDON Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles. Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.

Action de la stratégie Ecophyto 2030 piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité.