

Martinique



Bulletin de Santé du Végétal

Cultures maraîchères

N° 9 - 1er au 30 Septembre
2026

Animateurs inter-filière et filière diversification :

Teddy OVARBURY (FREDON Martinique)

Jacques-Edouard EUGENIE (FREDON Martinique)

Crédit photos :

FREDON Martinique

PRÉVISION SAISONNIÈRE

Octobre à Décembre

“En Martinique, le prochain trimestre devrait être, comme le trimestre précédent, moins arrosé et les températures supérieures aux normes.”

SEC ET CHAUD

SYNTHÈSE À LA STATION DE RÉFÉRENCE DU LAMENTIN



29,4 °C



226h 40min



99,1 mm



15,5 km/h

SOURCE : MÉTÉO FRANCE

ASTÉRACÉES



- **Pression globale nulle,**
- Aucun nuisible suivi détecté,
- Risque moyen d'infestation d'aleurodes et de mouches mineuses pour le mois à venir.

CUCURBITACÉES



- **Pression globale nulle,**
- Faible présence d'aleurodes,
- Risque moyen d'infestation de thrips, d'aleurodes, de pucerons et de mouches mineuses pour le mois à venir.

SOLANACÉES



- **Manque de données**

BRASSICACÉES



- **Aucune parcelle cultivée dans notre réseau.**

Pour plus d'informations sur les données météo :

Prévision
saisonnière



Bulletin
météo



Astéracées

LAITUE

RÉPARTITION SPATIALE DES PARCELLES D'OBSERVATION ET DES CULTURES

Variété de laitue	Nombre observations	Stade végétatif
Batavia	6	Développement végétatif - Récolte
Feuille de chêne rouge	0	-
Feuille de chêne verte	1	Développement végétatif
Total	7	



PRESSIION BIOTIQUE

ÉVOLUTION DES ORGANISMES NUISIBLES SUR LAITUE

		janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26
Cercosporiose	Fréquence												
	Intensité												
Mouches mineuses serpentine	Fréquence												
	Intensité												
Mouches mineuses en plaque	Fréquence												
	Intensité												
Mollusques (Escargots, limaces)	Fréquence												
	Intensité												

Légende : Pas de données Nul / Quasi nul Faible Moyen Fort

L'état sanitaire de la culture de laitue s'est amélioré sur les parcelles observées, avec une pression globale nulle des nuisibles.



Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque

Faible

Conditions favorables pour le nuisible : • Pluies fréquentes • Températures proches des 25°C

Situation terrain : similairement au mois précédent, la pression de la cercosporiose reste nulle sur les parcelles suivies. Aucun nouveau symptôme n'a été observé au cours des dernières observations.

Évaluation du risque : les prévisions météorologiques présagent de nouveau un trimestre plus chaud et sec, défavorable au développement de la cercosporiose ; **annonçant un risque faible pour le mois à venir.**

Mesures prophylactiques spécifiques :

- Privilégier des zones avec une bonne exposition au soleil et au vent
- Respecter les distances de plantation pour une bonne circulation du vent
- Entretenir les abords des parcelles
- Sarcler régulièrement les parcelles
- Favoriser un bon drainage pour l'évacuation de l'eau
- Préférer l'irrigation au goutte-à-goutte
- Effectuer l'association et la rotation de cultures



Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque

MOYEN

Conditions favorables pour le nuisible : • Températures entre 20°C et 30°C

Situation terrain : la pression, déjà faible en août, a été nulle pour le mois de septembre. Aucune présence d'individu ou de dégât n'a été détectée.

Évaluation du risque : les prévisions météorologiques présagent un trimestre plus chaud et sec, favorable au développement des mouches mineuses, annonçant **un risque moyen d'infestation pour le mois à venir. Restez vigilant.**

Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque

MOYEN

Mesures prophylactiques

- Contrôler régulièrement l'état sanitaire des plants
- Éliminer les plants infestés et les déchets de cultures
- Réaliser une rotation des cultures
- Sarcler les parcelles et entretenir régulièrement leurs abords
- Effectuer l'association et la rotation de cultures



Cucurbitacées

RÉPARTITION SPATIALE DES PARCELLES D'OBSERVATIONS ET DES CULTURES

Culture	Nombre observations	Stade végétatif
Concombre	4	Floraison-Nouaison
Total	4	



PRESSION BIOTIQUE ÉVOLUTION DU NIVEAU D'ATTAQUE DES ORGANISMES NUISIBLES SUR CUCURBITACÉES

		janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26
Aleurodes (<i>Bemisia tabaci</i>)	Infestation												
	Dégâts												
Mouches mineuses	Infestation												
	Dégâts												
Thrips (<i>Thrips palmi</i>)	Infestation												
	Dégâts												
Pucerons	Infestation												
	Dégâts												
Légende :		Pas de données	Nul / Quasi nul	Faible	Moyen	Fort							

L'état sanitaire des parcelles de concombre suivies se stabilise globalement, avec une pression nulle des bioagresseurs. Une faible présence d'aleurodes a toutefois été observée au cours de ce mois.



Fréquence :
Faible

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque
MOYEN

Conditions favorables : • Temps sec

Situation terrain et évaluation du risque :

Le climat sec du mois a été favorable au développement des aleurodes. Quelques individus ont été détectés sur de jeunes parcelles, voisines de parcelles plus âgées et contaminées, propice à une augmentation de leur population.

Le risque de contamination pour le mois à venir est estimé moyen ; compte tenu des prévisions climatiques annonçant un trimestre plus sec et plus chaud. **Restez vigilant.**

Mesures prophylactiques spécifiques :

- Utiliser des plants sains (plants de pépinières insect-proof)
- Favoriser les auxiliaires
- Gérer l'enherbement
- Utiliser des produits de biocontrôle :
- [Liste des produits de biocontrôle 2025](#) 



Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque
MOYEN

Conditions favorables : • Températures entre 20°C et 30°C

Situation terrain et évaluation du risque :

Aucune présence significative de mouches mineuses n'a été observée sur les parcelles suivies. Le mois, marqué par un climat sec favorable à leur développement, n'a toutefois pas entraîné de pression notable du ravageur. Dans ce contexte et au regard des conditions climatiques annoncées, **la pression pour le mois à venir est toutefois estimée moyenne. La vigilance est de rigueur.**

Mesures prophylactiques spécifiques :

- Utiliser des plants sains (plants de pépinières insect-proof)
- Favoriser les auxiliaires
- Gérer l'enherbement
- Utiliser des produits de biocontrôle :
- [Liste des produits de biocontrôle 2025](#) 



Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque

MOYEN

Conditions favorables : • Températures entre 10°C et 35°C

Situation terrain et évaluation du risque :

Leur gestion a permis de stabiliser les populations à un niveau nul. Les mesures prophylactiques ont contribué à cette maîtrise. **Le risque de contamination pour le mois à venir est néanmoins estimé moyen**, au regard des prévisions d'un trimestre plus sec et plus chaud. **Soyez très vigilant.**

Mesures prophylactiques :

- Utiliser des plants sains (plants de pépinières insect-proof)
- Favoriser les auxiliaires
- Gérer l'enherbement
- Utiliser des produits de biocontrôle :
- [Liste des produits de biocontrôle 2025](#) 
- Effectuer l'association et la rotation de cultures



Fréquence :
Nulle

Intensité :
Nulle

Évaluation du risque

MOYEN

Conditions favorables : • Présence de jeunes pousses • Températures élevées

Situation terrain et évaluation du risque :

Aucune présence significative de pucerons n'a été relevée sur les parcelles suivies. Le mois, caractérisé par un climat sec favorable à leur développement, n'a cependant pas engendré de pression notable du ravageur. **Le risque pour le mois à venir est estimé moyen**, compte tenu des prévisions climatiques annonçant un climat sec et chaud, favorable au développement de l'insecte. **Restez vigilant.**

Mesures prophylactiques :

- Utiliser des plants sains (plants de pépinières insect-proof)
- Favoriser les auxiliaires
- Gérer l'enherbement
- Utiliser des produits de biocontrôle :
- [Liste des produits de biocontrôle 2025](#) 

Les abeilles butinent, protégeons les !

Respectez les bonnes pratiques phytosanitaires

1

Les traitements insecticides et/ou acaricides sont interdits, sur toutes les cultures visitées par les abeilles et autres insectes pollinisateurs, pendant les périodes de floraison et de production d'exsudats.

2

Par dérogation, certains insecticides et acaricides peuvent être utilisés, en dehors de la présence des abeilles, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation adaptée ayant conclu à un risque acceptable. Leur autorisation comporte alors une mention spécifique "emploi autorisé durant la floraison et/ou au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles".

3

Il ne faut appliquer un traitement sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les conditions d'emploi associées à l'usage du produit, mentionnées sur la brochure technique (ou l'étiquette) livrée avec l'emballage de la spécialité commerciale autorisée.

4

Afin d'assurer la pollinisation des cultures, de nombreuses ruches sont en place dans ou à proximité des parcelles en fleurs. Il faut veiller à informer le voisinage de la présence de ruches. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur ces parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines, peuvent avoir un effet toxique pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Il faut éviter toute dérive lors des traitements phytosanitaires.

Retrouvez plus d'information dans la [note nationale Abeilles & Pollinisateurs](#) qui propose une synthèse d'informations actualisées pour la protection des insectes pollinisateurs et relative à la réglementation sur les produits phytopharmaceutiques.



Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale.

FREDON Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles. Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.

Action de la stratégie Ecophyto 2030 piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité.