

Martinique

Bulletin de Santé du Végétal

Banane

N° 7 - 1er au 31 Juillet
2026

Animateurs inter-filières :

Teddy OVARBURY (FREDON Martinique)
Jacques-Edouard EUGENIE (FREDON Martinique)

Animateurs filières :

Jacques-Edouard EUGENIE (FREDON Martinique)
Grégory COLDOLD (SICA Cercoban)

Avec les données d'observations de :

SICA Cercoban, UGPBAN et Presta' SCIC


Crédit photos (sauf mentions contraires) : FREDON
Martinique.

PRÉVISIONS SAISONNIÈRES JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

En Martinique, le prochain trimestre devrait être moins arrosé et les températures supérieures aux normes.

Le second mois de la saison cyclonique encore très sec malgré le passage de 11 ondes tropicales sur le bassin Atlantique ce mois-ci.
Le mois de juillet comptabilise 21 jours de brume de sable.


SYNTHÈSE À LA STATION DE RÉFÉRENCE DU LAMENTIN



CERCOSPORIOSE NOIRE



PRESSION FAIBLE




- Niveau moyen des EE **en baisse** (sous les 250)
- Fléchissement des évaporations fin juillet
- Pression localisée entre le Lorrain et Ajoupa-Bouillon

MALADIES DE CONSERVATION



PRESSION FAIBLE




- Le taux de MDC du mois de juillet 2026 (0,77%) est moins élevé que celui de l'année 2025 (1,03%).
- Sous le seuil des 1%.

CHARANÇON DU BANANIER




PRESSION MOYENNE



- diminution sur le François, Saint-Joseph et le Lamentin.
- apparition de niveaux élevés dans le Nord: Macouba, Saint Pierre et Morne-Rouge.
- Une remontée des captures attendue avec l'augmentation de la pluviométrie en août.

CERCOSPORIOSE NOIRE

OBSERVATIONS ET ANALYSE DE RISQUE




La carte ci-contre présente, à la fin du mois de juillet, l'état de la pression de la cercosporiose noire en Martinique.

Comme en juin, les relevés du mois de juillet effectués dans **le nord atlantique et sur la dorsale** présentent une forte pression de la maladie avec **des niveaux d'EE pouvant dépasser les 750 le foyer étant localisé entre le Lorrain et Ajoupa-Bouillon**.

Néanmoins, sur **la plaine de Basse-Pointe / Macouba le sud, la zone Caraïbe et sur la plaine du Lamentin**, les chiffres restent **bas** avec **des relevés de niveau faible à modéré**.

Nous pouvons donc statuer sur un **risque de contamination modéré**.



Le graphique ci-contre montre qu'en juillet, **la situation de pression est faible et quasi généralisée** donnant des moyennes **en dessous de 250**. C'est une situation **rarement vue à cette période** ou en principe les EE sont à la hausse.

Cette diminution est à attribuer **des évaporations** particulièrement élevés pour la période. Grâce notamment aux **alizées et à une brume de sable persistante (21 jours de brume de sable ce mois-ci selon météo france)**.

La vigilance est de mise sur l'élimination des nécroses.


Evaluation du risque: Le risque de contamination est **faible**

CERCOSPORIOSE NOIRE

Facteurs explicatifs

Le graphique ci-dessous illustre le niveau d'évaporation durant le mois de juillet, couvrant les semaines 27 à 30. Suite à un pic d'évaporation observé pendant les semaines 28 et 29, intensifié par l'action du vent régulier et de la brume de sable. Les contaminations des feuilles supérieures (2 à 4) ont été fortement limitées expliquant le niveau des relevés ce mois-ci. Un fléchissement de cette tendance apparaît en semaine 30. En effet, avec l'humidité caractéristique de la saison cyclonique, nous devrions anticiper une dégradation de la situation au cours du mois d'août.

Évaluation du risque : modéré



Les évaporations PICHE correspondent à la quantité d'eau évaporée à la surface de la feuille. Elles sont un facteur explicatif de la pression de la maladie.

Evaporations > 30 mm/semaine : développement des cercosporioses faible

Evaporations < 22 mm/semaine : conditions idéales pour les cercosporioses

GESTION DU RISQUE

Les nécroses présentes sur les feuilles de bananier émettent des spores contaminantes qui se déposent sur les feuilles adjacentes et les parcelles avoisinantes. Leur élimination ciblée et hebdomadaire permet de diviser par trois le potentiel infectieux de l'inoculum.

Cette prophylaxie est essentielle dans la réussite du contrôle de la cercosporiose noire. Elle s'applique à tous les bananiers tant d'exportation, plantains ou figues sucrées.



A savoir qu'il existe un risque de résistance avéré pour les produits à base **difénocanazole** et de **trifloxystrobine**. Leur utilisation doit donc être alternée avec celle de produits composés d'autres substances actives.


Des produits de biocontrôle existent. Par ailleurs, la mise en œuvre du coupe-feuille ou effeuillage sanitaire est une mesure prophylactique cruciale dans la gestion de la maladie.




MALADIES DE CONSERVATION

Les maladies de conservation qui apparaissent sur les bananes vertes à leur arrivée en Europe sont constituées d'un certain nombre de **champignons** qui vont se développer sur différentes parties du fruit comme la couronne, l'épiderme et les pédoncules. Les chancres apparaissent sur un **défaut d'origine** (pliore, meurtrissure, couteau, apex...). La pourriture des couronnes survient par **un mauvais traitement, peu de temps de lavage, une mauvaise qualité de l'eau...**

OBSERVATIONS ET ANALYSE DE RISQUE



Répartition des Maladies de conservation- Juillet 2026



Le taux de MDC du mois de juillet 2026 (**0,77%**) est moins élevé que celui de l'année 2025 (**1,03%**). Comme le mois de juin, le mois de juillet est également marqué par des maladies de conservation peu présentes et essentiellement sur blessures. Le taux reste sous la barre des 1%

Une situation stable pour les maladies de conservation.

Risque faible

Ci-contre quelques photos illustrant les MDC transmises par l'UGPGAN. De gauche à droite, nous avons :

- 1 pourriture de couronne
- 2 pourriture de péduncule
- 3 pourriture d'épiderme



GESTION DU RISQUE

Afin de compenser les conditions climatiques favorables aux maladies de conservation qui continuent à prévaloir, les mesures prophylactiques doivent être renforcées :

- Gainage des régimes au stade dernière main horizontale, avec mise en place du lien au-dessus de la cicatrice de la première bractée
- Epistillage au champ
- Retrait des bractées et de la cravate
- Retournement, écartement ou découpe de la dernière feuille sortie avant le régime
- Nettoyage régulier de la station de conditionnement (en particulier élimination des déchets végétaux)
- Bonne gestion du point de coupe
- Adaptation du nombre de mains supprimées à la surface foliaire saine du bananier
- Récolte des régimes sur trays adaptés
- Transport des régimes en position verticale
- Réfection des traces pour limiter les chocs

Retrouvez plus d'informations sur les fiches Soins aux régimes et Maladies de Conservation (MDC) et du Manuel du planteur (IT²).



©UGPBAN



Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale.
La Chambre d'Agriculture de la Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles.
Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.

Action du plan ECOPHYTO piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité.