Bulletin de Santé du Végétal
HORTICULTURE ET PEPINIERE EN NORMANDIE

N°10 – 31 juillet 2025

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL

FREDON NORMANDIE

Retrouvez gratuitement le BSV HORTICULTURE ET PEPINIERE sur le site de **FREDON Normandie**

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté Égalité Fraternité

Retrouvez gratuitement les BSV sur le site de **DRAAF Normandie**

BSV RELEVE DE PIEGEAGE

Suivi piégeages						
	Production				Distribution / Vente	
	Pépinière		Horticulture		Produits finis	
Secteur géographique	Département 14 - 50 - 61	Département 27 - 76	Département 14 - 50 - 61	Département 27 - 76	Département 14 - 50 - 61	Département 27 - 76
Duponchelia fovealis			6	6		
Lygus rugulipennis			3	3		
Nombre d'établissements participants aux dispositifs de piégeage						

POINT METEOROLOGIQUE

Les conditions météorologiques resteront globalement douces. Quelques précipitations sont prévues en début de semaine prochaine. Les températures resteront également plutôt douces.

ABONNEZ-VOUS AU MAILING BSV

Vous voulez être avertis dès qu'un nouveau BSV Horticulture et pépinière parait ; il suffit d'en faire la demande.

Inscrivez-vous auprès de l'animateur :
damien.loisel@fredon-normandie.fr

REJOIGNEZ LE RESEAU D'OBSERVATEURS BSV HORTICULTURE ET PEPINIERE EN NORMANDIE

Le contenu des Bulletins de santé du végétal (BSV) est basé sur les informations issues d'un réseau d'observateurs. La fiabilité du BSV est d'autant plus grande que le nombre d'observations est important.
Rejoignez le réseau et participez à l'enrichissement des BSV en apprenant à mieux observer vos cultures ou vos plantes finies !

Inscrivez-vous auprès de l'animateur :
damien.loisel@fredon-normandie.fr

Identifiez les cibles de produits de biocontrôles grâce à ce logo B

Identifiez les résistances de bioagresseurs à des produits phytopharmaceutiques (PPP) R

SOMMAIRE

Horticulture 3
Suivi piegeages 3
AUXILIAIRES 4
BASE ABAA Auxiliaires 4
LIENS UTILES 4
NOTES BIODIVERSITE 5
Les notes nationales biodiversité 5
FOCUS ACLEES TAIWANENSIS, le Charançon noir du Figuier 6

SUIVI PIEGEAGES

Depuis 2011, un piégeage est réalisé tous les ans pour suivre les populations de *Duponchelia fovealis* dans 12 établissements. Le dispositif est mis en priorité sur cyclamen.

Pour ce sixième relevé, aucune nouvelle capture n'a été constatée. 5 captures avaient été constatées au précèdent relevé : 1 capture à l'Ets 4 BN, 1 capture à l'Ets 2 HN, 2 captures à l'Ets 4 HN et 1 capture à l'Ets 5 HN.

Nb de papillons piégés de *Duponchelia fovealis* / Etablissement

Semaine	ETS 1 BN	ETS 2 BN	ETS 3 BN	ETS 4 BN	ETS 5 BN	ETS 6 BN	ETS 1 HN	ETS 2 HN	ETS 3 HN	ETS 4 HN	ETS 5 HN	ETS 6 HN	Total
S20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
S22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
S26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S28	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	0	**5**
S30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**



Depuis 2024, un piégeage est également mis en place dans 6 établissements pour cette campagne afin de suivre *Lygus rugulipennis*, une punaise pouvant occasionner l'avortement de boutons floraux. 5 sont disposés sur la parcelle qui accueillera les chrysanthèmes et le dernier est dans un établissement de production de fleurs locales.

Pour ce sixième relevé, il n'y a toujours pas de capture de *Lygus rugulipennis.*

Nb de punaises piégées de *Lygus rugulipennis* / Etablissement

Semaine	ETS 1 BN	ETS 2 BN	ETS 3 BN	ETS 1 HN	ETS 2 HN	ETS 3 HN	Total
S20	0	0	0	0	0	0	0
S22	0	0	0	0	0	0	0
S24	0	0	0	0	0	0	0
S26	0	0	0	0	0	0	0
S28	0	0	0	0	0	0	**0**
S30	0	0	0	0	0	0	**0**

AUXILIAIRES

BASE ABAA Auxiliaires

La bonne identification et connaissance des auxiliaires se révèle très utile dans le cadre de la protection intégrée. Cela permet de mieux connaitre et estimer la régulation naturelle et d'ajuster ainsi les méthodes préventives mises en œuvre, et le choix des méthodes de lutte à appliquer, qu'elles soient chimiques ou non.

Les ressources qui concernent les auxiliaires sont disséminées sur des sites déjà en lien sur EcophytoPIC *(Ephytia, Fredon, Instituts Techniques Agricoles,…)* mais il n'est pas simple pour un internaute d'accéder rapidement à une donnée ciblée.

C'est pourquoi nous avons créé une base recensant à la fois les organismes utiles (Auxiliaires), nuisibles (BioAgresseurs) ainsi que les Accidents physiologiques et climatiques : la base ABAA.

LIENS UTILES

Tester vos connaissances sur les auxiliaires à travers ce quiz :

https://ecophytopic.fr/pic/pour-aller-plus-loin/quiz-auxiliaires-des-cultures

NOTES BIODIVERSITE

Les notes nationales biodiversité

La réglementation pour la protection des insectes pollinisateurs a évolué depuis fin 2021.

Cliquer ici pour télécharger la note d'information BSV-Abeille 2022
https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20220330-note_abeilles_2022.pdf

Cliquer ici pour découvrir les nouvelles dispositions règlementaires pour la protection des abeilles et des insectes pollinisateurs https://agriculture.gouv.fr/nouvelles-dispositions-reglementaires-pour-la-protection-des-abeilles-et-des-insectes

« Méthodes alternatives : Des produits de biocontrôle existent »

Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour différents usages

Retrouvez la liste actualisée régulièrement sur le site : http://www.ecophytopic.fr/

Résistance aux produits phytosanitaires :

Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA https://www.r4p-inra.fr/fr/home/

FOCUS ACLEES TAIWANENSIS, LE CHARANÇON NOIR DU FIGUIER

Le charançon noir du figuier est un coléoptère de la famille des curculionidés originaire de Chine dont l'hôte principal est le figuier (*Ficus carica*). Les adultes d'*Aclees taiwanensis* d'une taille de l'ordre de 2 cm ont une silhouette caractéristique des charançons. Le corps est entièrement noir brillant avec des élytres ponctués. Il peut, cependant, avoir une pruinosité rosâtre sur le corps avant d'atteindre sa coloration entièrement noire. Présent en Italie depuis plusieurs années, il est détecté en France pour la première fois dans le Var en 2019. **Cette année, il a été découvert dans une pépinière en Normandie.**

PRÉFÈTE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt

Fiche d'information phytosanitaire

CHARANCON NOIR DU FIGUIER *Aclees taiwanensis*

Le charançon noir du figuier – *Aclees taiwanensis*

Le **charançon noir du figuier** est un coléoptère de la famille des curculionidés originaire de Chine dont **l'hôte principal est le figuier (*Ficus carica*).** Les adultes d'*Aclees taiwanensis* d'une taille de l'ordre de 2 cm ont une silhouette caractéristique des charançons. Le corps est entièrement noir brillant avec des élytres ponctués. Présent en Italie depuis plusieurs années, il est détecté en France pour la première fois dans le Var en 2019. **Il est signalé dans le Lot et Garonne en 2022 à Monclar d'Agenais.**

photo : Facebook alerte charançon noir du figuier

Son cycle de développement, de l'œuf à l'adulte, est de l'ordre de trois mois en fonction des températures. Deux cycles de développement annuel sont possibles. C'est un insecte essentiellement nocturne à tendance grégaire. Il pond ses œufs à la base du tronc, généralement au niveau du collet. Les larves qui se développent dans l'arbre le détruisent du fait de leur consommation des tissus végétaux avec une destruction progressive de l'aubier conduisant à une réduction du flux de sève brute.

Adultes et larve de charançon noir du figuier *(Photo : Vegetech)*

Enjeux de la surveillance

Cet insecte nuisible **émergent** n'est pas réglementé à ce stade. Il convient néanmoins de déterminer l'étendue de sa dispersion sur le territoire national en mettant en place suivant une **démarche collective volontaire un plan de surveillance** et de lutte afin d'entraver sa dispersion.

Cet insecte nuisible émergent n'est pas réglementé à ce stade. Il convient néanmoins de déterminer

l'étendue de sa dispersion sur le territoire national en mettant en place suivant une démarche collective volontaire un plan de surveillance et de lutte afin d'entraver sa dispersion.

Pour plus d'informations sur ce ravageur, les symptômes et participer à cette surveillance, nous vous invitons à prendre connaissance de cette fiche d'information phytosanitaire établie par la DRAAF Nouvelle-Aquitaine : https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/wp-content/uploads/sites/4/2025/06/fiche_reconnaissance_charancon_du_figuier_vdef-003.pdf

En cas de suspicion ou de détection, contactez la DRAAF Normandie via le Service Régional de l'Alimentation (SRAL): sante-vegetale.sral.draaf-normandie@agriculture.gouv.fr

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau d'établissements professionnels d'horticulture, de pépinière et de jardinerie. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, les observations ne peuvent être transposées telles quelles à tous les établissements. FREDON Normandie dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les exploitants et les invite à prendre toutes les décisions pour la protection de leurs cultures sur la base d'observations qu'ils auront réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques ou de conseils obtenus auprès de professionnels agréés.

Observations : FREDON Normandie, ASTREDHOR SM, Campus Métiers Nature de Coutances et producteurs
Crédit photos : FREDON Normandie sauf mention particulière
Rédaction et animation : Damien LOISEL - FREDON Normandie

Directeur de la publication : David PHILIPPART

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du BSV HORTICULTURE ET PEPINIERE EN NORMANDIE n°10 du 31/07/2025 »

Coordination et renseignements : Damien LOISEL – damien.loisel@fredon-normandie.fr