



Bulletin de Santé du Végétal

HORTICULTURE ET PEPINIERE EN NORMANDIE

N°17 – 6 novembre 2025

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES OBSERVATIONS PONCTUELLES REALISEES DEPUIS 15 JOURS

	Production				Distribution / Vente	
	Pépinière		Horticulture		Produits finis	
Secteur géographique	Département 14 - 50 - 61	Département 27 - 76	Département 14 - 50 - 61	Département 27 - 76	Département 14 - 50 - 61	Département 27 - 76
Nb d'observations	1	/	2	2	/	1
1 observation = 1 établissement à une date donnée						
Suivi piégeages						
<i>Duponchelia fovealis</i>			6	6		
<i>Lygus rugulipennis</i>			3	3		
nombre d'établissements participants aux dispositifs de piégeage						

POINT METEOROLOGIQUE

Ces 15 derniers jours, la météo a été particulièrement douce pour la période. La météo a été favorable aux ventes de la Toussaint. L'arrachage en pépinière a commencé avec en perspective la Sainte-Catherine.

**CE BSV EST LE DERNIER DE L'ANNEE 2025.
MERCI A TOUS !**

**REJOIGNEZ LE RESEAU D'OBSERVATEURS BSV
HORTICULTURE ET PEPINIERE EN NORMANDIE**

Le contenu des Bulletins de santé du végétal (BSV) est basé sur les informations issues d'un réseau d'observateurs. La fiabilité du BSV est d'autant plus grande que le nombre d'observations est important.

Rejoignez le réseau et participez à l'enrichissement des BSV en apprenant à mieux observer vos cultures ou vos plantes finies !

Inscrivez-vous auprès de l'animateur :
damien.loisel@fredon-normandie.fr



Retrouvez gratuitement le
BSV HORTICULTURE ET
PEPINIERE sur le site de
[FREDON Normandie](https://www.fredon-normandie.fr)



Retrouvez gratuitement les
BSV sur le site de [DRAAF
Normandie](https://www.draaf-normandie.fr)

Identifiez les cibles de produits de biocontrôles grâce à ce logo



Identifiez les résistances de bioagresseurs à des produits phytopharmaceutiques (PPP)



SOMMAIRE

Horticulture.....	3
Les ravageurs.....	3
Aleurodes	3
Pucerons	3
Thrips.....	4
Les maladies	4
Oïdium	4
Rouille	4
Suivi piegeages	5
Pépinière	6
Les ravageurs.....	6
Tigre du Pieris	6
Suivi CULTURE AGRUMES.....	7
AUXILIAIRES.....	8
BASE ABAA Auxiliaires	8
LIENS UTILES	8
NOTES BIODIVERSITE	9
Les notes nationales biodiversité.....	9
FOCUS 1ère DETECTION DU NEMATODE DU PIN EN FRANCE	10



Les ravageurs

Aleurodes

1 établissement concerné



Sous serre, une faible présence d'aleurodes a été observée sur 5% d'une culture de poinsettia. Des adultes ont été observés essentiellement.

Adulte d'aleurode

Filière Horticulture



Poinsettia : itinéraire innovant grâce à des plantes-pièges

https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-10/Fiche%20Syst%C3%A8me%20HORTIPOT_Astredhor%20Pays%20de%20Loire_Poinsettia.pdf



À surveiller !

Evolution à suivre : les aleurodes sont présents toute l'année sous serre. La durée du cycle est d'environ 20 jours à 27°C. Le piégeage des adultes sur des panneaux jaunes englués permet de détecter leur présence.

Méthode de lutte et prophylaxie :

- ↳ Désherbez les serres, les abris et leurs abords.
- ↳ Évitez de garder des plantes inutilisées dans un coin de serre qui sont des refuges pour les aleurodes.
- ↳ Examinez attentivement les plants avant leur entrée en culture sous serre.
- ↳ Soyez vigilant à la mise en place de nouvelles cultures qui font suite à une culture ayant été propice aux aleurodes (ex : Poinsettia).



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Pucerons

1 établissement concerné

Sous tunnel, une faible attaque a été observée sur giroflée avec des grappes de pucerons sous les feuilles et des manchons sur la tige.



À surveiller !

Evolution à suivre : surveillez vos cultures sous abris, les conditions sont favorables à leur développement. Observez également la présence de la faune auxiliaire.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Thrips

1 établissement concerné

Sous serre, une faible attaque a été observée sur cyclamen. Le feuillage est gaufré et des adultes ont été aperçus sous les feuilles.



À surveiller !

Evolution à suivre : à surveiller toute l'année sous abri. La température est le facteur essentiel jouant sur le développement du thrips : plus la température est élevée, plus le cycle est rapide.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Les maladies

Oïdium

1 établissement concerné



Oïdium sur pensées

Dans un point de vente, une attaque minime a été constatée sur pensées. Une variété est concernée.



À surveiller !

Evolution à suivre : l'oïdium prolifère à la faveur de l'amplitude thermique entre le jour et la nuit et de l'humidité. Distancez suffisamment les plants. Aérez au maximum vos abris et évitez de mouiller le feuillage lors des arrosages notamment en fin de journée. Le choix variétal est à prendre en considération.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Rouille

2 établissements concernés



Rouille sur pâquerette
ASTREDHOR SM

Sous abris, une faible attaque de rouille a été signalée sur des feuilles de pâquerette avec peu de taches (1 établissement).



À surveiller !

Evolution à suivre : l'humidité ambiante des abris accompagnée par des températures fraîches (optimum de 15°C) sont favorables à son développement. A surveiller.

Une attaque de rouille brune, *Puccinia chrysanthemi*, a été constatée dans un établissement sur une fin de stock de chrysanthèmes vendus pour la Toussaint. 2 variétés sont concernées.



À surveiller !


Evolution à suivre : il est important de la surveiller car elle rend les plantes peu attrayantes et invendables. Bien que non réglementée contrairement à la rouille blanche (*Puccinia horiana* **ORNQ**), la stratégie de gestion culturale est commune avec un distançage approprié et un arrosage prudent visant à réduire l'humidité du feuillage. La sélection variétale a considérablement réduit ces problématiques de rouille.




Depuis 2011, un piégeage est réalisé tous les ans pour suivre les populations de *Duponchelia fovealis* dans 12 établissements. Le dispositif est mis en priorité sur cyclamen.

Depuis 2024, un piégeage est également mis en place dans 6 établissements pour cette campagne afin de suivre *Lygus rugulipennis*, une punaise pouvant occasionner l'avortement de boutons floraux. 5 sont disposés en parcelle de chrysanthèmes et le dernier est dans un établissement de production de fleurs locales.

Pour ce dernier relevé de la campagne, des captures de *Duponchelia fovealis* ont été comptabilisées dans 2 établissements avec 1 papillon à chaque fois : ETS1 HN (qui enregistre sa 1^{ère} capture de la campagne) et ETS6 HN (qui enregistre sa 5^{ème} capture de la campagne et qui est l'établissement qui aura le plus piégé pendant cette campagne).



Pour ce dernier relevé de la campagne, aucune capture de *Lygus rugulipennis* n'a été constatée.



Un signalement hors réseau de piégeage BSV, nous indique un pic de piégeage pour la noctuelle de l'artichaut, *Chrysodexis chalcites*, au mois d'octobre dans un établissement. Cette noctuelle qui aime les plantes horticoles en pots et qui peut être retrouvée également dans la filière maraîchère est migratrice. Espèce annuelle migrante du sud de l'Europe, elle apparaît chaque année dans les régions nordiques. Elle semble incapable d'hiverner à l'extérieur au nord de l'Europe, cependant, elle parvient très bien à survivre d'une année sur l'autre dans les serres.



Les ravageurs

Tigre du Pieris

1 établissement concerné



Adulte et excréments au revers
d'une feuille



À surveiller !

Une attaque de *Stephanitis takeyai* a été observée à la réception de plants. Les dégâts sont modérés

Evolution à suivre : on compte plusieurs générations par an. Observez attentivement le revers des anciennes feuilles et plus particulièrement sur les feuilles présentant des piqûres de nutrition.



Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#). Contactez votre conseiller.

Tableau synthétique du suivi sanitaire (2 établissements)

Ravageurs	
Acariens	
Aleurodes	L'aleurode floconneux, <i>Aleurothrixus floccosus</i> ORNQ, a été observé dans un établissement où il réalise son cycle.
Chenilles	
Cochenilles	
Pucerons	
Thrips	
Autre	



Aleurode floconneux
Aleurothrixus floccosus

Maladies	

	Pas d'attaque	Attaques faibles	Fortes attaques
--	---------------	------------------	-----------------

B Des produits de biocontrôle existent, cf. [liste actualisée des produits de biocontrôle](#).



Aleurothrixus floccosus est classé Organisme Réglementé Non de Quarantaine (ORNQ) : règlement d'exécution (UE) 2019/2072 Annexe IV partie J

Insectes et acariens		
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ	Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)	Seuils pour les matériels de multiplication de fruits et plantes fruitières concernés
<i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %

La mise en circulation de végétaux contaminés est interdite.



BASE ABAA Auxiliaires

Base ABAA



La bonne identification et connaissance des auxiliaires se révèle très utile dans le cadre de la protection intégrée. Cela permet de mieux connaître et estimer la régulation naturelle et d'ajuster ainsi les méthodes préventives mises en œuvre, et le choix des méthodes de lutte à appliquer, qu'elles soient chimiques ou non.

Les ressources qui concernent les auxiliaires sont disséminées sur des sites déjà en lien sur EcophytoPIC (*Ephytia*, *Fredon*, *Instituts Techniques Agricoles*,...) mais il n'est pas simple pour un internaute d'accéder rapidement à une donnée ciblée.

C'est pourquoi nous avons créé une base recensant à la fois les organismes utiles (Auxiliaires), nuisibles (BioAgresseurs) ainsi que les Accidents physiologiques et climatiques : la base ABAA.

LIENS UTILES



Tester vos connaissances sur les auxiliaires à travers ce quiz :


<https://ecophytopic.fr/pic/pour-aller-plus-loin/quiz-auxiliaires-des-cultures>



Les notes nationales biodiversité



La réglementation pour la protection des insectes pollinisateurs a évolué depuis fin 2021.



Cliquer ici pour télécharger la note d'information BSV-Abeille 2022

https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20220330-note_abeilles_2022.pdf

Cliquer ici pour découvrir les nouvelles dispositions réglementaires pour la protection des abeilles et des insectes pollinisateurs <https://agriculture.gouv.fr/nouvelles-dispositions-reglementaires-pour-la-protection-des-abeilles-et-des-insectes>



Note Nationale - Focus
Bulletin de Santé du Végétal



Cette note vise à accompagner la démarche agro-écologique portée par le Bulletin de Santé du Végétal. Elle propose une synthèse d'informations actualisées pour la protection des insectes pollinisateurs et relative à la réglementation sur les produits phytosanitaires.



Le déclin des insectes pollinisateurs est ...
... une réalité mondiale touchant de nombreux secteurs de notre environnement.
D'origine biologique, technique, alimentaire et environnementale (usage, pesticides, érosion de la biodiversité, etc.),



« Méthodes alternatives : Des produits de biocontrôle existent »


Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour différents usages

Retrouvez la liste actualisée régulièrement sur le site : <http://www.ecophytopic.fr/>



Résistance aux produits phytosanitaires :

Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA <https://www.r4p-inr>



Dégât du nématode du pin à Madère (© Morgane GOUDET DSF/ EPHYTIA)

Dans le cadre de la surveillance officielle des organismes de quarantaine pilotée par les services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), un foyer de nématode du pin vient d'être confirmé par le laboratoire national de référence de l'Anses, pour la première fois en France, dans la commune de Seignosse (Landes).

Le nématode du pin est un organisme ravageur classé « organisme de quarantaine prioritaire » au titre de la législation européenne, car il entraîne une mortalité des pins et peut avoir un impact particulièrement important s'il venait à proliférer sur le territoire. Par conséquent, il doit faire l'objet de mesures de lutte obligatoires en cas de détection afin d'éradiquer le foyer. **S'il constitue un sérieux danger pour les pins, ce nématode ne présente en revanche aucun risque pour la santé humaine ou animale.**

Pour éviter sa propagation à d'autres massifs forestiers de résineux, **Étienne GUYOT**, préfet de région de Nouvelle-Aquitaine, a pris **un arrêté qui interdit la circulation des végétaux sensibles, des bois et écorces des espèces de résineux sensibles ainsi que l'ensemble des travaux d'exploitation** (coupes, éclaircies, débardages, dessouchages, taille, élagage) dans une zone de 20 kilomètres autour du foyer détecté sur la commune de Seignosse.

Ces mesures s'appliquent sur tous les résineux des genres *Pinus* (pins), *Abies* (sapins), *Cedrus* (cèdres), *Larix* (mélèzes), *Picea* (épicéas), *Pseudotsuga* (Douglas) et *Tsuga* avec une vigilance particulière sur les pins qui sont les espèces les plus sensibles à la maladie, qu'ils soient situés en forêts ou en parcs et jardins et dans le domaine public ou privé.

Pour en savoir plus :

- [Foyer de nématode du pin, le préfet de région prend des mesures pour contenir le risque de diffusion - Novembre 2025 - Communiqués de presse 2025 - Communiqués de presse - Actualités - Les services de l'État en Gironde](#)
- [Foyer de nématode du pin, communication de FREDON FRANCE](#)
- [Fiche de reconnaissance du nématode du pin](#)

FICHE DE RECONNAISSANCE SORE*

*SURVEILLANCE OFFICIELLE DES ORGANISMES NUISIBLES RÉGLEMENTÉS OU ÉMERGENTS



- NOM SCIENTIFIQUE
BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS
- NOMS VERNACULAIRES
NÉMATODE DU PIN
PINWOOD NEMATODE
PINE WILT NEMATODE
- CATÉGORIE TAXONOMIQUE
NEMATODE
- ORDRE
RHABDITIDA
- FAMILLE
APHELENCHOIDIDAE
- CODE OEPP
BURSXY

RÉGLEMENTATION ET DISTRIBUTION

STATUT RÉGLEMENTAIRE

ORGANISME DE QUARANTAÎNE PRIORITAIRE (OQP)

ORGANISME NUISIBLE FAISANT L'OBJET DE MESURES D'URGENCE DE L'UNION (ONMU)

DISTRIBUTION DE L'ORGANISME NUISIBLE ■ Présent ■ Transitoire



- [Surveillance officielle des organismes réglementés \(SORE\) pour la filière forêt-bois, en France métropolitaine](#)
- [Plan national d'intervention sanitaire d'urgence relatif à *Bursaphelenchus xylophilus*](#)
- [Groupe de travail sur la surveillance du nématode du pin](#)
- [Fiche *Bursaphelenchus xylophilus* de l'OEPP](#)
- <https://ephytia.inra.fr/fr/C/21257/Forets-Nematode-du-pin>

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau d'établissements professionnels d'horticulture, de pépinière et de jardinerie. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, les observations ne peuvent être transposées telles quelles à tous les établissements. FREDON Normandie dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les exploitants et les invite à prendre toutes les décisions pour la protection de leurs cultures sur la base d'observations qu'ils auront réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques ou de conseils obtenus auprès de professionnels agréés.

Observations : FREDON Normandie, ASTREDHOR SM, Campus Métiers Nature de Coutances et producteurs

Crédit photos : FREDON Normandie sauf mention particulière

Rédaction et animation : Damien LOISEL - FREDON Normandie

Directeur de la publication : David PHILIPPART

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du BSV HORTICULTURE ET PEPINIERE EN NORMANDIE n°17 du 06/11/2025 »

Coordination et renseignements : Damien LOISEL – damien.loisel@fredon-normandie.fr