



# Pomme de terre

**Normandie**

BSV n°13 du 30/07/2026



## Animatrice référente

Laura EPINEAU  
FREDON NORMANDIE  
02 31 46 96 50  
06 77 59 25 02  
laura.epineau@fredon-normandie.fr

## Animatrice suppléante

Valérie PATOUX  
Chambres d'agriculture  
de Normandie  
02 31 53 55 09  
valerie.patoux@normandie.chambagri.fr

## Directeur de la publication

Sébastien WINDSOR  
Président des Chambres  
d'agriculture de Normandie

BSV consultable sur les sites  
de la DRAAF, des Chambres  
d'agriculture et des partenaires  
du programme

A consulter sur  
[normandie.chambres-agriculture.fr](http://normandie.chambres-agriculture.fr)

Action de la Stratégie Écophyto 2030  
pilotee par les ministères chargés de  
l'Agriculture, de l'Environnement, de  
la Santé et de la Recherche, avec le  
soutien financier de l'Office Français  
de la Biodiversité

Financé dans le cadre  
de la stratégie **écophyto**



Avec le soutien financier de



## L'essentiel de la semaine

**METEO :** Les températures actuelles sont revenues aux normales de saison. Des  
averses sont prévues localement. Cependant, un temps sec et ensoleillé sera  
majoritairement présent.

**STADES :** Les parcelles sont sèches. La tubérisation se poursuit doucement mais des  
broyages et des récoltes ont commencé.

**MALADIES /RAVAGEURS :** Peu de risque maladies. Risque doryphore atteint pour  
une parcelle du Calvados. 2<sup>nd</sup> génération de larves observée.


**AUXILIAIRES :** Pas de présence en parcelle.

**ADVENTICES :** Quelques adventices observées en parcelle.

Le réseau est en place, la carte ci-dessous est représentative de l'ensemble des parcelles  
(18) du réseau BSV pomme de terre – Normandie. Les températures très élevées freinent le  
grossissement des tubercules dans les parcelles non irriguées observées cette semaine. En  
effet, les stress hydriques et thermiques limitent les grossissements et peuvent donc  
entraîner un retard de développement voire une perte de tubercules au pied. Pour certaines  
parcelles, la tubérisation continue tout de même doucement et pour d'autres, les  
défanages, broyages voire les récoltes commencent. Attention, des symptômes de  
maladies de faiblesse, comme le botrytis ou la verticilliose, peuvent apparaître.

## RESEAU :

A ce jour sont enregistrées **3 parcelles** de 30% de tubérisation à 70% de tubérisation, **3  
parcelles** en début d'inflorescence voire floraison, **1 parcelle** en développement voire en  
maturation des fruits, **9 parcelles** de « début de sénescence » à « 50% de sénescence » et **2  
parcelles** en récolte.







Variété MAIWEN plantée le 17/04 (Ferme de l'Odon)



De gauche à droite, variété HANSA + 35mm, MOZART +45 mm, AGRIA + 40 à +55 mm, HARRY +55 et +60 mm et CAESAR +50 à +65mm (CA)



Butte sèche (CA)



Fruit sur CAESAR (CA)



Broyage des pommes de terre à chair ferme (ALLIANS et GARANCE)

# Maladie

## \* MILDIOU

### Risque mildiou



### Observations :

Les parcelles du réseau sont saines. Pas de nouvelle tache.

### Éléments de biologie :

Le mildiou de la pomme de terre est provoqué par *Phytophthora infestans*. Les conditions favorables à son développement sont : une température comprise entre 3 et 26°C, une hygrométrie supérieure à 87% et une végétation dense. Pendant l'hiver, il se conserve sous forme de mycélium dans les tubercules laissés au champ, les tas de déchets ou les repousses. Ainsi, au printemps, les spores d'hiver constituent des réserves de spores et peuvent infecter les nouvelles cultures grâce à leur dissémination par le vent ou par la pluie.

### Analyse du risque mildiou réalisée avec l'Outil d'Aide à la Décision VISIOFARM® (anciennement MILEOS®), mis à disposition par ARVALIS Institut du végétal.

#### Interprétation du tableau de risque Mildiou :

Le niveau de risque Mildiou : tient compte de la réserve de spores et du potentiel de sporulation. La réserve de spores correspond à la quantité de spores théoriquement présentes dans l'environnement qui pourront être contaminantes si les conditions climatiques sont favorables. Le potentiel de sporulation est la quantité de spores prêtes à sporuler, il alimente la réserve de spores. Ainsi l'importance du potentiel de sporulation et donc de la réserve de spores caractérise le niveau

de risque qui peut être :

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé

Le seuil indicatif de risque atteint : indique en fonction de la sensibilité variétale si le seuil indicatif du risque est atteint (OUI) ou pas (NON). Pour qu'il soit atteint, il faut entre autres qu'il y ait une réserve de spores potentielle (prête à contaminer) et que les conditions climatiques soient favorables à la contamination puis à l'expression de la maladie.

Les conditions favorables à la sporulation sont, pour une hygrométrie à 87%, d'une durée de :

◇ 8 heures à une température de 21°C

◇ 10 heures à une température de 14°C

◇ 13 heures à une température de 10°C



Les risques donnés dans le tableau ci-après sont valables pour ce **jeudi 30 juillet** et pour des parcelles non irriguées. L'irrigation peut augmenter le risque en fonction des heures où elle est positionnée.



## Situation au 30 juillet 2026

|                | Stations météorologiques<br>(Données Weather Measures) | Dates de dépassement du<br>seuil indicatif de risque<br>durant les 7 derniers jours | Niveau de risque Mildiou | Seuil indicatif de risque atteint<br>du 30 juillet au 1er août |                          |                       | Pluviométrie<br>(mm) depuis le<br>23 juillet |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                |                                                        |                                                                                     |                          | Variété<br>sensible                                            | Variété<br>intermédiaire | Variété<br>résistante |                                              |
| Seine-Maritime | ALLOUVILLE-BELLEFOSSE                                  | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 1,4                                          |
|                | ANCRETIEVILLE-SAINT-VICTOR                             | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 2,9                                          |
|                | BARENTIN                                               | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 2,5                                          |
|                | BOLBEC                                                 | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0,9                                          |
|                | LUNERAY                                                | le 26 juillet                                                                       | Elevé                    | OUI                                                            | OUI                      | NON                   | 0,8                                          |
|                | NORMANVILLE                                            | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0,6                                          |
|                | HAUDRICOURT                                            | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 2,1                                          |
| Orne           | SEES                                                   | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0                                            |
| Manche         | BEAUVOIR                                               | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0                                            |
|                | SAINTE-GENEVIEVE                                       | le 26 juillet                                                                       | Elevé                    | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0                                            |
| Eure           | BOUQUETOT                                              | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 1,9                                          |
|                | CHAMBORD                                               | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0                                            |
|                | EPREVILLE-PRES-LE-NEUBOURG                             | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0                                            |
|                | SURTAUVILLE                                            | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0,2                                          |
| Calvados       | DOUVRES-LA-DELIVRANDE                                  | le 25 juillet                                                                       | Très élevé               | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0,3                                          |
|                | ROTS                                                   | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0,2                                          |
|                | SAINT-SYLVAIN                                          | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0,1                                          |
|                | VENDEUVRE                                              | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0                                            |
|                | MORTEAUX-COULIBOEUF                                    | /                                                                                   | Faible                   | NON                                                            | NON                      | NON                   | 0                                            |

\*Niveau de risque = Potentiel de sporulation

Des contaminations ont été enregistrées le 26 juillet sur les secteurs de Luneray et Sainte-Geneviève et le 25 juillet sur le secteur de Douvres-la-Délivrande.

Le potentiel de sporulation est faible sur 16 stations météo. Il est très élevé sur le secteur de Douvres-la-Délivrande, élevé sur les secteurs de Sainte-Geneviève et Luneray.

Le seuil indicatif de risque est atteint sur variétés sensibles et intermédiaires sur le secteur de Luneray pour ce samedi. Pour le reste des secteurs, aucun seuil indicatif de risque ne sera atteint aujourd'hui ni dans les deux prochains jours.

### Evolution du risque :

Pas de changement, peu de risques. Les averses localisées, l'humidité matinale et nocturne et les parcelles irriguées peuvent favoriser le développement du mildiou. Soyez vigilants et observez attentivement vos parcelles.

### Gestion du risque :

#### Prophylaxie :

Utilisez des plants sains

Détruire ou bâcher les tas de déchets et les repousses de pomme de terre. Voir [BSV Pomme de terre n°01 du 19/03/2026](#)

Effectuez un bon buttage

Favorisez les rotations culturales

#### Biocontrôle :



Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre ce bio agresseur.

Ils sont consultables à l'adresse : <https://ecophytopic.fr/réglementation/protéger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

Contactez votre technicien.

Résistance :



Le groupe « mildiou/fluazinam » et le groupe « mildiou /mandipropamide et CAA » sont exposés à un risque de résistance. Pour plus d'informations, consultez le site du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRAE qui centralise de nombreux outils et informations sur les résistances et qui recense les notes des résistances : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

## \* ALTERNARIOSE

Risque alternariose



### Observations :

Des symptômes sont observés sur quelques feuilles voire quelques plantes dans 3 parcelles dont une parcelle dans le Calvados et deux parcelles dans la Manche.



Taches d'alternariose (Calvados)

### Éléments de biologie :

L'alternariose est provoquée par les champignons *Alternaria solani* et /ou *Alternaria alternata*.

La maladie provoque surtout des dégâts en climat continental, chaud et sec, mais est accentuée en culture irriguée.

L'Alternariose est favorisée par la sénescence des plantes et des conditions climatiques bien précises :

- Température élevée (20-25°C) et rosée pendant la nuit pour permettre l'infection,
- Alternance de périodes humides et ensoleillées pour la formation des conidies et la sporulation.

La dispersion des spores est assurée par le vent et les éclaboussures de pluie.

L'Alternariose est une maladie de faiblesse (particulièrement vrai pour *A. alternata*, qui se développe surtout sur les feuilles déjà atteintes par *A. solani*, ou sur des feuilles « faibles »). Elle se développe d'abord sur les feuilles et les plantes les plus faibles : vieilles feuilles (bas de tiges) ou abîmées (vent, grêle), plantes en manque d'eau, de lumière et/ou d'éléments nutritifs, particulièrement l'azote, le manganèse, le magnésium et le soufre.

### Evolution du risque :

Peu de risques sur les secteurs dont les nuits sont sèches. Les températures élevées et l'hygrométrie nocturne et matinale peuvent favoriser le développement de l'alternariose ainsi que sa sporulation. Avec les stress hydriques et thermiques, la senescence peut s'installer précocement et engendrer également des symptômes d'alternariose. Attention également aux parcelles irriguées et aux averses localisées. Surveillez vos parcelles notamment celles toujours en cours de tubérisation.

### Gestion du risque :

#### Prophylaxie:

Apportez une fertilisation et une irrigation équilibrées afin d'éviter tout stress accélérant la sénescence des plantes.

Limitez l'inoculum primaire en détruisant les résidus de culture infectés et les adventices.

Utilisez des variétés peu sensibles.

Récolter dès que les tubercules sont suffisamment matures et limiter les blessures à la récolte et lors du conditionnement pour éviter la pourriture des tubercules.

### \* RHIZOCTONE

#### Risque rhizoctone



### Observations :

Le rhizoctone est observé sur quelques plantes dans 2 parcelles du Calvados (variétés Opal et Gourmandine).



Symptôme de Rhizoctone sur feuillage, variété Etincelle (Comité Nord)



Tubercules aériens formés à l'aisselle des feuilles sur pomme de terre atteinte de Rhizoctone brun



### Éléments de biologie :

Le rhizoctone brun de la pomme de terre est favorisé par un climat frais et humide après plantation ainsi que par tous les autres facteurs qui retardent la levée des plantes (et donc augmentent la période de sensibilité de la plante aux attaques sur les germes) : plantation profonde, précoce, en sol froid, plant non germé ou réchauffé.

Les rotations courtes sont un facteur essentiel aggravant les attaques, de même qu'un long délai entre le défanage et la récolte.

**Evolution du risque :**

L'humidité nocturne et matinale associée à des températures plus fraîches que le jour peuvent favoriser le rhizoctone. Attention également aux averses localisées et aux parcelles irriguées dans lesquelles le développement du rhizoctone est plus favorable. Surveillez vos parcelles.

**Gestion du risque :****Prophylaxie:**

Privilégier des rotations en cohérence avec le potentiel infectieux des sols et les autres espèces cultivées sur la parcelle.

Planter en sol réchauffé et bien préparé.

Utiliser des plants sains pour garantir une levée homogène et un risque faible de sclérotés sur les tubercules à la récolte.

Le défanage par arrachage des fanes peut limiter la formation de sclérotés : le délai défanage-récolte doit être le plus court possible.

**\* JAMBE NOIRE****Observation :**

Pas de nouveau symptôme observé cette semaine dans les parcelles du réseau.



Symptôme de jambe noire (Comité Nord)

**Éléments de biologie :**

Son développement dépend d'un complexe bactériologique composé de différentes espèces, les symptômes sont notamment causés par les genres *Pectobacterium* et *Dickeya*. Les températures jouent un rôle dans le développement de la pourriture. Plus d'informations en suivant ce lien :

<https://www.plantdepommedeterre.org/maladie-ravageur/jambe-noire-et-pourriture-molle-blackleg-and-soft-rot/>

**Evolution du risque :**

La majorité des espèces de jambe noire ont des températures de développement comprises entre 25 et 40°C. L'humidité nocturne et matinale peut également contribuer à son développement. Surveillez vos parcelles notamment en cas d'averses localisées ou d'irrigation ainsi que les variétés plus sensibles.

**Gestion du risque :****Prophylaxie:**

Eviter de planter dans des parcelles humides et des zones tassées

Utiliser du plant certifié et éliminer les tubercules pourris avant plantation

Eliminer en végétation l'ensemble des plantes présentant des symptômes

Eviter des fumures azotées excessives ainsi que des irrigations trop importantes

Limiter les blessures de tubercules lors des manipulations car elles constituent des portes d'entrée pour les bactéries,

Eviter les excès d'humidité en séchant dès la récolte et en conservant en conditions aérées et sèches à basse température.

## Ravageurs

### \* PUCERONS

**Observations :**

NB PUCERONS/FOLIOLE

% FOLIOLES PORTEUSES

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| CALVADOS       | / | / |
| MANCHE         | / | / |
| SEINE-MARITIME | / | / |
| EURE           | / | / |

Aucun puceron observé dans les parcelles du réseau.

**Seuil de nuisibilité :**

Sur une feuille de pomme de terre située sur la moitié inférieure de la plante, choisir une des folioles latérales. Le seuil est de 20 folioles porteuses de pucerons sur 40 folioles observées soit 50% des folioles porteuses de pucerons ou 5 à 10 pucerons par feuille.

**Evolution du risque :**

Le risque est quasi nul, la météo actuelle n'est pas favorable à leur installation.



**Gestion du risque :****Prophylaxie :**

Observez vos parcelles, les pucerons peuvent transmettre des virus notamment aux variétés sensibles.

**Biocontrôle :**

Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre ce bio agresseur.

Ils sont consultables à l'adresse : <https://ecophytopic.fr/réglementation/protéger/liste-des-produits-de-biocontrôle>. Contactez votre technicien.

\* **DORYPHORES****Risque doryphore****Observations :**

Cette semaine, 7 parcelles sont concernées par la présence de doryphores. Les premières larves de 2<sup>nd</sup> génération sont observées. Le seuil de risque est atteint pour une parcelle du Calvados avec plusieurs foyers présents. Pour le reste des parcelles, cela va de quelques adultes présents à un foyer ou seulement quelques larves et d'adultes.



Nombreux adultes et pontes (CA)

**Seuil de nuisibilité :**

Il est atteint lorsque 2 foyers pour 1000 m<sup>2</sup> en bordure de parcelle sont observés (1 foyer = 2 à 3 plantes avec au moins 20 larves au total).

**Éléments de biologie :**

Cf. [BSV n°7 du 18/06/2026](#)

**Evolution du risque :**

Surveillez vos parcelles, les conditions météorologiques sont favorables à leur développement. Le risque perdure pour les parcelles encore en cours de tubérisation.

**Gestion du risque :****Prophylaxie :**

Rotation de pomme de terre tous les 4 ans pour éliminer les adultes hivernant dans le sol.

Élimination des repousses et des tas de déchets, où les premiers doryphores se concentrent et s'alimentent.

Absence de travail du sol en été pour entraver, par le maintien d'une terre dure, la pénétration dans le sol des larves.

Plantation précoce pour limiter l'infestation car le feuillage plus âgé au moment des attaques sera moins appétant.

**\* CICADELLES****Observations :**

Pas de nouvelles piqûres cette semaine.

**Evolution du risque :**

Les dégâts directs de ces insectes sont peu importants en culture de pomme de terre de consommation. Cependant, les cicadelles peuvent jouer un rôle dans la transmission de virus ou de phytoplasmes comme le stolbur. Plus d'informations sur le site Ephytia : [https://ephytia.inra.fr/fr/C/21007/Pomme-de-terre-Cicadelles#:~:text=Les%20d%C3%A9g%C3%A2ts%20de%20cicadelles%20sont,des%20piq%C3%BAtes%20\(figure%202\)](https://ephytia.inra.fr/fr/C/21007/Pomme-de-terre-Cicadelles#:~:text=Les%20d%C3%A9g%C3%A2ts%20de%20cicadelles%20sont,des%20piq%C3%BAtes%20(figure%202))

**Auxiliaires****\* CHRYSOPES/COCCINELLES/HYMENOPTERES/SYRPHES****Observations :**

En l'absence de puceron, les auxiliaires ne sont pas observés dans les parcelles du réseau.



Chrysope, adulte



Larve et Pupa de coccinelle (Ferme de l'Odon)

**Éléments de biologie :**

Cf. BSV n°7 du 18/06/2026

## Adventices

### Observations :

|                         | Manche | Calvados    | Seine-Maritime | Eure       |
|-------------------------|--------|-------------|----------------|------------|
| <b>Ray-grass</b>        |        | 1 parcelle  |                |            |
| <b>Liserons</b>         |        | 1 parcelle  |                |            |
| <b>Chardons</b>         |        | 2 parcelles |                |            |
| <b>Vulpin résistant</b> |        |             |                | 1 parcelle |
| <b>Matricaire</b>       |        | 1 parcelle  |                |            |



### Méthodes alternatives : Des produits de biocontrôle existent

Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour différents usages. Retrouvez la liste actualisée régulièrement sur le site : <https://ecophytopic.fr/réglementation/protéger/liste-des-produits-de-biocontrôle>



### Résistance aux produits phytosanitaires

Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du **réseau R4P** (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA :

<https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>.

Crédit photos : FREDON Normandie sauf mention particulière

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation. Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.



## Informations supplémentaires

### → Zoom sur un Organisme de Quarantaine : *Tecia solanivora*, Teigne guatémaltèque



Source des photos : Ephytia



Selon la base de données mondiale de l'OEPP, *Tecia solanivora* est un ravageur de la pomme de terre en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Concernant sa présence dans l'Union européenne, il est actuellement présent et en cours d'éradication en Espagne. Les larves se nourrissent exclusivement de tubercules de pomme de terre. Les œufs sont généralement pondus à la surface du sol (quelques-uns sur les feuilles et les tiges des pommes de terre) ou directement sur les tubercules stockés. Les adultes sont de petits papillons de nuit gris brunâtre. Ils peuvent voler sur de courtes distances d'un champ à l'autre. Les femelles peuvent pondre de 150 à 360 œufs. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver sa fiche descriptive sur le site de l'OEPP : <https://gd.eppo.int/taxon/TECASO> Mais aussi Ephytia : <https://ephytia.inra.fr/fr/C/21284/Pomme-de-terre-Scrobipalpopsis-Tecia-solanivora-teigne-guatemalteque-de-la-pomme-de-terre>

En cas de suspicion, contactez l'animatrice ou bien le SRAL Normandie.

## Les notes nationales BIODIVERSITE

