



NID DE FRELONS OU BÛTINAGE DANS LES PLANTES ?



Au cours de l'année, en fonction des différentes **floraisons** ou de la **présence de proies**, certaines **plantes peuvent se retrouver littéralement couvertes de frelon à pattes jaunes**.

Ce comportement peut être observé par exemple sur :

- ✚ Le saule pleureur, la vigne vierge, le cotonéaster et la symphorine à la fin de l'été
- ✚ Le lierre à l'automne

Il n'est alors pas possible d'intervenir pour enlever les frelons, car **le nid n'est pas présent dans la végétation**. Un traitement sur la végétation serait **dangereux** (pour les personnes et les animaux alentours) et **inefficace** (les frelons reviendront dès que le produit ne fera plus effet).

Il faut intervenir sur le nid pour éliminer toute la colonie efficacement.

Pour différencier les deux situations :

« Bûtinage »

Les frelons **prospectent la végétation**, allant de fleurs en fleurs ou de feuilles en feuilles.

Il s'agit d'un **comportement de nourrissage**. Le nid n'est pas présent.

Ils sont souvent accompagné d'autres insectes (guêpes, frelons européens, abeille...)

» Il faut donc **trouver le nid dans le voisinage** pour pouvoir intervenir.

Présence d'un nid

Les frelons font des **aller-retour à un endroit précis** dans la végétation.

Il s'agit d'un **comportement de retour au nid**. Celui-ci est caché dans la végétation.

» **J'appelle ma mairie** pour déclarer le nid et qu'il soit pris en charge dans le cadre de la lutte collective.