



N°30
28/10/2025



Animateurs filières

Céréales à paille

Philippe PENICHO

FREDON N-A

philippe.penichou@fredon-na.fr

Suppléance : **CDA 87**

valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Maïs

Valérie LACORRE / **CDA 87**

valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Suppléance : **FREDON N-A**

philippe.penichou@fredon-na.fr

Oléagineux

Valérie LACORRE / **CDA 87**

valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Suppléance : **FREDON N-A**

philippe.penichou@fredon-na.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE

Président de la Chambre Régionale

Nouvelle-Aquitaine

Boulevard des Arcades

87060 LIMOGES Cedex 2

accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF

Service Régional

de l'Alimentation

Nouvelle-Aquitaine

22 Rue des Pénitents Blancs

87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

Écophyto est une
politique publique du



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

Reproduction partielle autorisée

avec la mention « extrait du

bulletin de santé du végétal

Nouvelle-Aquitaine Grandes

cultures N°X

du JJ/MM/AA »

Avec le soutien financier de



Edition **Limousin**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

**Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)**

Ce qu'il faut retenir

Colza

- **Stades phénologiques** : du stade « 5 à 10 Feuilles » (BBCH 15 – 1n).
- **Larves de grosses altises (altises d'hiver)** : simulation du cycle.
- **Tenthredès** : risque moyen pour les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 6 Feuilles (BBCH16), surveillez vos parcelles.
- **Pucerons** : Pour les colzas qui sont dans les stades sensibles (moins de 6 Feuilles BBCH 16), restez vigilant.
- **Charançon du Bourgeon Terminal** : la période de risque étant actuellement en cours, surveillez vos parcelles.
- **Phoma**

Céréales à paille

- **Stades phénologiques** : semis en cours à 3 feuilles (BBCH 00 à 13).
- **Limaces** : conditions favorables.
- **Pucerons d'automne** : conditions peu favorables mais à surveiller dès la levée.
- **Cicadelles des céréales** : conditions peu favorables.

PREVISIONS METEO (sources météo France)

Cette semaine, retour de la douceur dans une ambiance instable avec un week-end pluvieux et venté.

Limoges

MARDI 28	MERCREDI 29	JEUDI 30	VENDREDI 31	SAMEDI 01	DIMANCHE 02	LUNDI 03
						
11° / 16°	7° / 17°	10° / 20°	13° / 18°	11° / 16°	8° / 14°	8° / 14°
↙ 10 km/h	↗ 20 km/h 40 km/h	↗ 20 km/h	↗ 20 km/h 45 km/h	↙ 20 km/h 40 km/h	↙ 20 km/h 45 km/h	↙ 20 km/h 40 km/h

Guéret

MARDI 28	MERCREDI 29	JEUDI 30	VENDREDI 31	SAMEDI 01	DIMANCHE 02	LUNDI 03
						
10° / 14°	6° / 18°	10° / 19°	12° / 17°	11° / 16°	8° / 13°	7° / 14°
↙ 15 km/h	↙ 20 km/h 45 km/h	↙ 20 km/h 40 km/h	↙ 25 km/h 45 km/h	↙ 25 km/h 50 km/h	↗ 20 km/h 60 km/h	↙ 20 km/h 45 km/h

Brive

MARDI 28	MERCREDI 29	JEUDI 30	VENDREDI 31	SAMEDI 01	DIMANCHE 02	LUNDI 03
						
12° / 18°	8° / 20°	11° / 22°	15° / 21°	13° / 20°	10° / 16°	8° / 17°
↗ 5 km/h	↗ 10 km/h	↗ 10 km/h	↗ 15 km/h	↙ 15 km/h	↗ 10 km/h 45 km/h	↗ 15 km/h

Colza

• Stades phénologiques et observations du réseau

A l'heure actuelle, le réseau compte 14 parcelles : 7 en Haute-Vienne, 5 en Creuse et 2 en Corrèze.

11 parcelles du réseau ont été observées :

Les colzas sont au stade « 6 à 10 Feuilles » BBCH 16 1n

- 18 % sont au stade « 5 à 6 Feuilles » (BBCH 15 16)

- 82 % sont au stade « 7 à 10 Feuilles » (BBCH 17 1n)

(Photo : colza sur la parcelle de Nexon (87) V.LACORRE CDA 87 le 27/10/2025)



	semis	Variétés	Stade	Charançons du Bourgeon Terminal (cuvette)	Altises piégées (cuvette)	Fréquence (% plantes touchées)			
						Dégâts deTenthrede	Dégâts limaces	Pucerons verts	Phoma
87-Eyjeaux	16/08/2025	LG Acropole	8 Feuilles	0	0			0%	0%
23-Evaux Les Bains P	18/08/2025	RGT Paradizze /2308	5 Feuilles	3	5			0%	0%
23- St Pierre Le Bost	18/08/2025	KWS Feliciano	9 Feuilles	0	0			0%	0%
87-St Martial/Isop	18/08/2025	Es Mambo	6 Feuilles	0	5			0%	0%
23-Evaux Les Bains B	19/08/2025	Kanzzas / LG austin				Parcelle non observée			
87-Janailhac	19/08/2025	LG Avenger	10 Feuilles	0	1			0%	0%
23-Le Grand Bourg	20/08/2025	Cezanne	10 Feuilles	0	0			0%	0%
87-Nexon	22/08/2025	LG Adeline	9 Feuilles	0	0			0%	0%
87-Chartelat	24/08/2025	DK Exagris	8 Feuilles	0	0			0%	1%
19-St Pantaléon de Lapleau	26/08/2025	LG Aviron	7 Feuilles	0	0			0%	0%
23-Ajain	28/08/2025	LG Avenger				Parcelle non observée			
87-St Maurice Les Brousses	28/08/2025	Nymphaea	9 Feuilles	0	0			0%	5%
19- St Mexant	03/09/2025	LG Adeline				Parcelle non observée			
87-La Meyze	05/09/2025		7 Feuilles	0	10			0%	0%


• Larves de grosses altises (altises d'hiver)

Éléments de biologie

Ces larves sont très petites, d'une longueur de moins de 3 mm **avec les deux extrémités noires et 3 paires de pattes.**

Ne pas confondre avec des larves de mouche qui peuvent être présentes également dans les pétioles et qui n'ont pas de patte.

Ces dernières ne présentent aucun danger pour la plante.



Simulation du cycle de développement

En fonction de la date du début du vol des altises il est possible de simuler les dates de pontes ainsi que l'évolution des différents stades larvaires. Ces prévisions de dates sont obtenues à partir des données météorologiques réelles de l'année (MAJ 28 octobre 2025) et complétées par des valeurs moyennes.

En base 7, selon Terres Inovia, il faut atteindre 40°C degrés – jour pour la ponte, 190°C pour l'éclosion et 240°C pour la larve L2 et 300°C pour la larve L3.

Pour le département de la Creuse les données météorologiques utilisées sont celles de la station de Boussac, celles de Magnac-Laval servant à la simulation en Haute-Vienne.

	Date début du vol	Ponte	Eclosion	Larve L2	Larve L3
Haute-Vienne	25-sept	02-oct	30-oct	-	-
Creuse	25-sept	04-oct	-	-	-

Rappel: les larves après éclosion (L1) rejoignent les pétioles des plantes à partir du sol. Il est possible dans un premier temps d'observer la présence de la perforation leur permettant de pénétrer dans la plante. Ensuite les différents stades larvaires (L2-L3) sont observables dans les pétioles. Les larves âgées (Stade larvaire L3) sont les plus à risque car les meilleures candidates à la migration vers le cœur.

• Tenthrèdes de la rave


Biologie : l'adulte est un hyménoptère jaune et noir de 6-8 mm de long. Il n'est pas nuisible. La larve est une fausse chenille grise à noire avec une bande longitudinale foncée de chaque côté du corps. Elle consomme les feuilles du colza en dédaignant les nervures. Les morsures sur cotylédons et jeunes feuilles, entraînant une réduction de la surface foliaire.

Les larves de tenthrèdes sont des ravageurs occasionnels et se manifestent particulièrement sur des semis précoces de colzas. Ponctuellement les dégâts peuvent être très importants avec la quasi-destruction de la culture notamment en cas d'automne chaud et sec.

Observations du réseau : Pas de signalement.

Période de risque : de la levée à 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : les surfaces consommées sont supérieures au ¼ de la surface végétative.



Photos Terres
Inovia

Evaluation du risque :

Risque **moyen** pour les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 6 Feuilles (BBCH16), surveillez vos parcelles.

• Pucerons

Éléments de biologie : [Cf : BSV Limousin N°23 du 16/09/2025](#)

Observations du réseau : Cette semaine, pas de signalement.

Période de risque : de la levée à 6 feuilles.

Seuil de nuisibilité : pucerons présents sur 2 pieds sur 10 (fréquence 20 % de plantes hébergeant des individus).



Voir les caractéristiques des variétés qualifiées à « résistance partielle au virus TuYV » dans le « Guide colza 2025 de Terres Inovia » (**téléchargeable gratuitement ici**: <https://www.terresinovia.fr/p/guide-culture-colza>)

Evaluation du risque :

Pour les colzas qui sont dans les stades sensibles (moins de 6 Feuilles BBCH 16), **restez vigilant.**




Attention : le puceron vert est résistant aux pyréthrinoides et au pirimicarbe

- **Charançon du bourgeon terminal (*Ceuthorrhynchus picitarsis*)**

Éléments de biologie : Les adultes pondent dans les pétioles à l'automne. Les larves passent dans le cœur des plantes au stade rosette et détruisent le bourgeon terminal.

Attention à ne pas confondre le charançon Gallicole avec le charançon du Bourgeon Terminal. Seul ce dernier étant considéré nuisible.



Observations du réseau : Cette semaine, 3 charançons ont été piégés sur la parcelle d'Evaux Les Bains P 23.

Période de risque : De la levée au stade rosette.

Seuil indicatif de risque : Il n'y a pas pour le charançon du bourgeon terminal de seuil de risque. Etant donné la nuisibilité potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles, repérée dans les cuvettes, est un risque.

Les petits colzas sont beaucoup plus sensibles. Les femelles sont rarement aptes à pondre dès leur arrivée sur les parcelles. On considère que le risque est plus important 8 à 10 jours après les premières captures.

Outil d'Aide à la Décision (OAD) pour prédire les vols de Charançon du Bourgeon Terminal




Pour accompagner la surveillance de vos colzas, Terres Inovia a construit un OAD de prédiction de vol du charançon du Bourgeon Terminal. Sur la base des captures relevées sur le territoire depuis 2011 par les observateurs BSV, et en se basant sur un réseau de stations météorologiques couvrant les différents bassins de production, le modèle sort une **courbe** de probabilité de piégeage sur la commune renseignée **Limoges 87** (jusqu'à J+7).

Lorsque la courbe se rapproche du seuil d'alerte (ligne en pointillés), vous devez vérifier régulièrement les captures dans votre cuvette.



Une vue d'ensemble sur une **carte** de France est également consultable et représente la probabilité quotidienne de capture à la date sélectionnée (jusqu'à J+7).

Pour tester l'OAD, **cliquez ici**.



Mardi 28 octobre 2025

Lundi 3 novembre 2025

Actuellement, le risque modélisé de vols de charançons du bourgeon terminal est avéré voir fort pour les jours à venir sur le Limousin.

Evaluation du risque :

La période de risque étant actuellement en cours, surveillez vos parcelles.

• **Phoma**

Sur les feuilles, taches arrondies gris cendré de 5 à 15 mm présentant des points noirs.

Observations du réseau : on nous signale la présence de phoma à hauteur de 1 à 10% sur les parcelles de Chaptelat et St Maurice Les Brousses (87).

Photo du 06/10/2025 V.LACORRE CDA87



Méthodes alternatives :

Toutes les variétés du réseau sont classées peu Sensible à Très Peu Sensible au Phoma

Céréales à paille

Poursuite d'un temps très pluvieux. Près de 90 mm de précipitations ont été comptabilisées ces 7 derniers jours sur la station de Limoges Bellegarde et les chantiers de semis sont à l'arrêt. Les orges les plus avancées sont à « 3 feuilles » (BBCH13).

• Gestion des Limaces

Observations du réseau : 2 % sur OH à Couzeix.


Généralités :

Recommandations avant les semis de céréales : se reporter au [BSV Limousin N°26 du 07/10/2025](#).

A consulter : [Note nationale DGAL/SDQPV \(Octobre 2014\) limaces](#)

Données de modélisation :

Calcul de l'indice de risque « limaces » par l'outil d'aide à la décision « Acta-Arvalis-Météo France » au 27/10/2025 à partir des données de la station météo France de Limoges-Bellegarde.



Evaluation du risque :

Les conditions météorologiques actuelles sont toujours favorables. Nette progression de l'indice de risque calculé par le modèle au 27/10/2025 (courbe noire). La gestion du risque doit être raisonnée à la parcelle. **Le risque est fort** particulièrement en conditions agronomiques favorables (historique limaces, parcelles motteuses, résidus de précédents en surface etc...)

• Pucerons d'automne

Généralités :

De nombreuses variétés d'orge d'hiver sont tolérantes à la JNO ([se reporter au BSV N° 25 du 30/09/2025](#)).

Cette tolérance ne confère pas une résistance totale, mais elle permet de faire l'impasse à la condition d'avoir respecté les dates de semis recommandées. Pour les semis « trop » précoces, le risque n'est pas nul.

En blé tendre, deux variétés seulement possèdent le gène de résistance partielle à la JNO : RGT Tweeteo et RGT Sundeo. Il convient aussi de respecter de la même manière les dates de semis recommandées de ces variétés pour profiter au mieux de cette tolérance.

Les dégâts dus à la JNO peuvent être très importants : jusqu'à retournement de la culture en orge et de quelques quintaux à 25-30 q/ha pour le blé.

Observations du réseau : Aucun relevé de pucerons sur plantes.

Période de risque : dès la levée (BBCH 09) et au-delà fin tallage (BBCH 29) si nécessaire.

Seuils indicatifs de risque :

Sur orges sensibles (sans le gène de tolérance à la JNO), blé et triticales, une intervention est envisageable lorsque 10 % de plantes sont colonisés par au moins 1 puceron ou bien si la présence de ces organismes est encore observée au bout de 10 jours.

Evaluation du risque :

Les conditions d'observations au champ ne sont pas optimales. Toutefois il est important de contrôler minutieusement les cultures dès la levée. Le niveau de risque actuel est faible.

• Cicadelles des céréales

Observations du réseau : Aucun relevé de pucerons sur plantes

Des pièges destinés à estimer l'importance des populations en présence peuvent être disposés dès la levée.

Seuil indicatif de risque :

- A partir de 30 captures hebdomadaires sur plaque jaune engluée.
- Observations sur 5 endroits de la parcelle faisant sauter au moins 5 cicadelles devant soi.

Période de risque : de levée (BBCH 09) à 3 feuilles (BBCH 13).



Photo : V.LACORRE CDA 87 **Orge le 27/10/25**

Evaluation du risque- cicadelles

Comme les pucerons, la présence de cicadelles est favorisée avec des températures supérieures à 12°C, l'absence de pluie et un temps ensoleillé. Les conditions actuelles sont donc peu favorables – Le niveau de risque actuel est faible.

Prochain bulletin : mardi 4 novembre 2025

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Zone Limousin sont les suivantes : FREDON N-A, Chambres d'Agriculture 19, 23 et 87, OCEALIA, Agricentre Dumas, Agriaxe, Sébastien Pinthon, Marc Bonnet Agriculteurs, LPA La Faye - Saint Yrieix la Perche

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action de la stratégie écophyto 2030 pilotée par les ministères chargés de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Santé et de la Recherche, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité "