



Grandes cultures

N°34
21/10/2025



Animateur filières

Céréales à paille / Maïs
Khalid KOUBAITI
FREDON Nouvelle-Aquitaine
khalid.koubaiti@fredon-na.fr

Oléagineux - Protéagineux
Solana VERA / Terres Inovia
s.vera@terresinovia.fr

Animateurs délégués

Céréales à paille / Maïs
Clément GRAS / ARVALIS
c.gras@arvalis.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle
autorisée avec la mention
« extrait du bulletin de
santé du végétal Nouvelle-
Aquitaine Grandes
cultures N°X du
JJ/MM/AA »**



Edition **Poitou-Charentes**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Colza

- **Stade** : 1 feuille à plus de 10 feuilles (B 1 à B 10).
- **Charançon du bourgeon terminal** : quelques captures, à surveiller.
- **Larves de grosses altises** : commencez les premiers Berlèses.
- **Adultes de grosses altises** : captures en diminution, **surveillance prioritaire** des colzas de moins de 4 feuilles.
- **Adultes et larves de tenthrèdes de la rave** : quelques captures d'adultes, surveillance des larves.

Céréales à paille

- **Réseau blé et orge** : en cours de mise en place.
- **État de la culture** : semis ont débuté dans de bonnes conditions.
- **Date des semis** : à raisonner.
- **Limaces** : mettre en place les pièges pour évaluer la pression avant la levée des céréales.
- **Vecteurs de viroses** : pucerons et cicadelles, à surveiller dès la levée des céréales en conditions favorables à l'observation.

Prévisions selon MétéoFrance pour les stations de :


	MERCREDI 22	JEUDI 23	VENDREDI 24	SAMEDI 25	DIMANCHE 26	LUNDI 27
Poitiers	 14° / 19° ↙ 30 km/h	 10° / 14° ➤ 35 km/h	 8° / 12° ➤ 20 km/h	 8° / 15° ➤ 20 km/h	 6° / 12° ➤ 20 km/h	 7° / 14° ➤ 20 km/h
Niort	 14° / 20° ↙ 35 km/h	 11° / 15° ➤ 40 km/h	 9° / 14° ➤ 20 km/h	 8° / 16° ➤ 20 km/h	 5° / 13° ➤ 20 km/h	 8° / 17° ➤ 20 km/h
Saintes	 15° / 20° ↙ 35 km/h	 11° / 16° ➤ 40 km/h	 8° / 16° ➤ 20 km/h	 8° / 16° ➤ 20 km/h	 6° / 13° ➤ 20 km/h	 8° / 16° ➤ 20 km/h
Angoulême	 15° / 19° ↙ 30 km/h	 12° / 16° ➤ 30 km/h	 9° / 15° ➤ 20 km/h	 9° / 15° ➤ 20 km/h	 6° / 12° ➤ 15 km/h	 7° / 16° ➤ 20 km/h

Colza


• Stade phénologique et état de la culture

41 parcelles du réseau Poitou-Charentes sont observées cette semaine.

Les stades des colzas sont très hétérogènes, ils s'échelonnent du stade 1 feuille pour les parcelles ressemées à plus de 10 feuilles pour les parcelles les plus précoces. 83% des parcelles ont atteint ou dépassé le stade 6 feuilles.




Carte des parcelles de colza observées du 15 au 21 octobre 2025
(Terres Inovia)



• Charançon du Bourgeon Terminal

Observations terrain :

5 parcelles parmi les 41 renseignées piègent des charançons du bourgeon terminal cette semaine.



Carte des piégeages du Charançon du Bourgeon Terminal du 15 au 21 octobre 2025

Point rouge : CBT capturés (5 parcelles)

Point vert : CBT absents (non piégées en cuvette)


(Terres Inovia)

OAD Prédiction des vols de Charançon du Bourgeon Terminal


Pour rappel : le modèle sort une **courbe** de probabilité de piégeage sur la commune renseignée (jusqu'à J+7). Lorsque la courbe se rapproche du seuil d'alerte (ligne en pointillés), vous devez vérifier régulièrement les captures dans votre cuvette. Une vue d'ensemble sur une **carte de France** est également consultable et représente la **probabilité quotidienne de capture** à la date sélectionnée (jusqu'à J+7). [Consultez l'outil en ligne](#) :



Graphique de la probabilité de captures en cuvette du Charançon du Bourgeon Terminal
Prévision le 21 octobre 2025 à Niort (79)




Mardi 21 octobre 2025



Samedi 25 octobre 2025

Cartes de prédiction des vols de Charançon du Bourgeon Terminal



La probabilité de captures modélisée atteint le seuil d'alerte pour Niort (79) pour la fin de la semaine.

Actuellement, le risque modélisé de vols de charançons du bourgeon terminal est faible sur la moitié ouest du Poitou-Charentes et avéré sur la moitié est.

Période de risque : de 4 - 5 feuilles au décolllement du bourgeon terminal.

Seuil indicatif du risque : il n'y a pas de seuil pour ce ravageur. Etant donné la nuisibilité potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles est un risque. Ce risque est plus important pour les colzas à faible développement et à faible croissance.

Évaluation du risque :


Le risque est **actuellement faible**.

Le modèle de prédiction des vols de Charançons du bourgeon terminal prédit des captures cette semaine : **Surveillez la présence du ravageur**.

Attention aux confusions :

Charançon Gallicole

Adulte : ne pas confondre avec le charançon du Bourgeon Terminal



• Larves de grosses altises (altises d'hiver)

Les premiers Berlèses réalisés dans le réseau ne montrent aucune larve pour le moment.

Cette année, l'activité accrue des adultes dans les colzas est remarquée le weekend du 20 septembre. Prenez en référence pour les simulations **la date du 20/09 comme début des activités**.

Modélisation des dates d'apparition des stades larvaires :

L'utilisation du modèle de développement larvaire permet d'estimer l'apparition des larves de grosses altises dans les pétioles, pour positionner au mieux les observations. A partir des données météorologiques, pour une date donnée de début du vol, il est possible de définir le cycle larvaire.

Calculs réalisés avec les dernières données disponibles au 27/10/25 avec prévisionnelles (en vert)
ensuite utilisation des valeurs moyennes (20 ans)

	Date début activité	Ponte	Eclosion L1	Mue L2	Mue L3
Niort Souché (79)	20-sept.	24-sept.	15-oct.	22-oct.	30-oct.
	25-sept.	30-sept.	21-oct.	29-oct.	7-nov.
	30-sept.	4-oct.	25-oct.	4-nov.	16-nov.
	5-oct.	11-oct.	1-nov.	13-nov.	
	10-oct.	15-oct.	10-nov.		

	Date début activité	Ponte	Eclosion L1	Mue L2	Mue L3
Poitiers Biard (86)	20-sept.	25-sept.	20-oct.	30-oct.	12-nov.
	25-sept.	1-oct.	28-oct.	6-nov.	
	30-sept.	6-oct.	2-nov.	19-nov.	
	5-oct.	12-oct.	13-nov.		
	10-oct.	18-oct.	29-nov.		

	Date début activité	Ponte	Eclosion L1	Mue L2	Mue L3
La couronne Angoulême (16)	20-sept.	24-sept.	15-oct.	22-oct.	30-oct.
	25-sept.	1-oct.	21-oct.	29-oct.	7-nov.
	30-sept.	5-oct.	26-oct.	4-nov.	17-nov.
	5-oct.	10-oct.	1-nov.	13-nov.	
	10-oct.	15-oct.	10-nov.		

	Date début activité	Ponte	Eclosion L1	Mue L2	Mue L3
Saintes (17)	20-sept.	23-sept.	12-oct.	19-oct.	25-oct.
	25-sept.	30-sept.	19-oct.	24-oct.	1-nov.
	30-sept.	4-oct.	23-oct.	31-oct.	9-nov.
	5-oct.	10-oct.	30-oct.	8-nov.	
	10-oct.	15-oct.	6-nov.	19-nov.	

Rappel : Les larves après éclosion (L1) rejoignent les pétioles des plantes à partir du sol. Il est possible dans un premier temps d'observer la présence de la perforation leur permettant de pénétrer dans la plante. Ensuite, les différents stades larvaires (L2-L3) sont observables dans les pétioles. Les larves âgées (stade larvaire L3) sont les plus à risque car les meilleures candidates à la migration vers le cœur.

En cohérence avec les simulations du tableau ci-dessus, il est envisageable de commencer les premiers tests Berlèses en Poitou-Charentes.

[Consulter le protocole Berlèse.](#)

Période de risque : depuis le stade rosette jusqu'au décollement du bourgeon terminal.

Seuil indicatif de risque :

- Par la méthode Berlèse (la plus fiable) : à partir de 3 larves par plante.
- Par dissection : 7 pieds sur 10 avec au moins une galerie. Attention : les galeries peuvent être creusées par d'autres larves (mineuses).

Évaluation du risque :

Aucun risque pour l'instant, **il faut évaluer la population larvaire présente.**

Tutoriel : Comment faire un Berlèse ?

- **Adultes de grosses altises (altises d'hiver)**


Observations terrain :

Les piégeages de grosses altises adultes diminuent cette semaine en Poitou-Charentes : 75 % des parcelles en ont piégé.

Le nombre d'altises capturées en cuvettes enterrées varie de 0,5 à 52 individus.

4 parcelles ont relevé entre 5 et 40 % de surface foliaire détruite.

Pour rappel : la cuvette n'est qu'un indicateur d'arrivée ou de présence du ravageur dans la parcelle. Le risque pour le colza s'évalue en croisant l'intensité et la fréquence des attaques sur les plantes avec le stade de la culture, et non selon le nombre d'altises capturées.



Carte des piégeages de grosses altises du 15 au 21 octobre 2025

Point orange : grosses altises capturées (31 parcelles)

Point vert : grosses altises absentes (non piégées en cuvette enterrée – 10 parcelles)

(Terres Inovia)

Période de risque : de la levée au stade 3 feuilles inclus.

Seuil indicatif du risque : 8 pieds sur 10 portants des morsures et 25 % de la surface foliaire détruite.



Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée

Évaluation du risque :

Les captures de grosses altises diminuent en Poitou-Charentes : 75 % des parcelles en ont capturé.

Le risque lié aux morsures est **faible** pour les colzas **ayant atteint ou dépassé le stade 4 feuilles**.

Pour estimer plus précisément le risque, [consultez l'outil en ligne](#) :



Attention : la grosse altise est résistante aux pyréthrinoïdes.



• Adultes et larves de tenthrèdes de la rave

Observations terrain :

Les adultes de tenthrèdes de la rave sont relevés en cuvette dans 3 parcelles du réseau cette semaine. Les captures vont de 1 à 6 individus.

Les larves sont observées sur 1 parcelle du réseau à BENON (17) avec 5% de plantes avec présence de larves et 2% de la surface foliaire détruite. La parcelle concernée est au stade 2 feuilles.

La présence de adultes ne présage en rien du niveau d'attaque par les larves. Pour rappel, l'adulte n'est pas nuisible, c'est un hyménoptère de 6-8 mm à l'abdomen de couleur jaune-orangé. Il est néanmoins important de rester vigilant quant à l'arrivée des larves qui en cas de fortes attaques, défolient rapidement la parcelle.



Adulte (à gauche) et larve (à droite) de tenthrède de la rave

(Terres Inovia)

Période de risque : de la levée au stade 6 feuilles inclus.

Seuil indicatif du risque : 25 % de la surface foliaire détruite.

Évaluation du risque :

71% des parcelles ont dépassé la période de risque (stades supérieurs à 7 feuilles).

Avec les observations actuelles, le risque est **faible** dans le réseau.

Pour aller plus loin :

[Gestion des ravageurs secondaires](#)

[La cuvette jaune, le piège incontournable pour détecter l'arrivée des ravageurs du colza](#)

- **Météo ([cliquez ici](#))**

Après les conditions anticycloniques de la semaine dernière, le temps devient variable. Une succession de plusieurs ondes pluvieuses actives, parfois accompagnées de vents forts pour demain et jeudi.

Après un été chaud et ensoleillé suivi d'un automne avec des pluies étalées, les conditions de préparation des semis des céréales sont devenues optimales dès début octobre.

- **État de la culture et réseau d'observation des blés et de l'orge d'hiver**

La préparation des sols ainsi que les semis des orges d'hiver et du blé tendre sont en avance par rapport aux 2 années précédentes. Les surfaces semées approchent ou dépassent la moitié des surfaces à emblaver par ces cultures. Selon la nature des sols, les semis reprendront à la fin de cette perturbation.

5 parcelles sont observées à ce jour, dont une est au stade levée (BBCH 10). Les rares parcelles levées sont à une feuille (BBCH 11).

Les réseaux d'observation des céréales à paille sont en cours de mise en place.

Enregistrez vos parcelles BSV rapidement (de préférence avant le semis) et il est encore possible d'intégrer les réseaux céréales du BSV en contactant les animateurs du BSV.


- **Date de semis**

Retarder la date de semis est une technique efficace pour esquiver des périodes de levées préférentielles des graminées adventices.

Dans les cultures d'hiver, la date de semis conditionne, dans de nombreux milieux, la faisabilité d'interventions mécaniques ultérieures. Positionner les graines à profondeur constante, semer suffisamment dense et réussir la levée d'un couvert homogène constituent aussi un gage de réussite pour le désherbage mécanique en culture !

La date de début des semis est établie à partir du critère de précocité à montaison, la date de fin de semis est établie à partir du critère de précocité à maturité (liée à la précocité à épiaison). Si les semis précoces permettent dans nos régions de limiter les risques d'échaudage en fin de cycle, l'excès de précocité entraîne une augmentation des pressions parasitaires (piétin échaudage, maladies des feuilles comme la rouille naine, maladies virales transmises par les pucerons et cicadelles, mosaïque, ...) ainsi que le risque de verse. L'excès de précocité augmente également la pression des adventices, notamment les graminées. Les surcoûts de protection et les pertes éventuelles dues aux accidents limitent très fortement le gain vis-à-vis de l'échaudage. Si les conditions d'implantations optimales le permettent, il n'est donc pas recommandé de débuter les semis avant le 15 octobre dans le Nord du Poitou-Charentes et pas avant le 20 octobre dans la partie Sud.

Les dates proposées ci-dessous sont un compromis entre la prise en compte des risques agro-climatiques, parasitaires ainsi que le risque de ne plus pouvoir accéder aux parcelles. Le calendrier de semis doit être bâti en tenant compte avant tout de la précocité des variétés. Celle-ci est suffisamment variable au sein d'une même espèce pour alterner les semis des différentes espèces présentes sur l'exploitation et adapter les dates d'implantation à chaque variété




(en gras, variété type de la classe de précocité)

Risque de pertes de rendement/JNO, désherbage, piétin échaudage

Risques sanitaires trop élevés, semis déconseillés avant le 10/10
 0-15 q/ha
 0-5 q/ha
 Risque négligeable

Blé tendre
 (source Arvalis)



En majuscule escourgeons, en minuscule orges 2 rangs

Nouveautés

15-50 q/ha
 10-25 q/ha
 5-20 q/ha
 Risque faible

Orge d'hiver
 (source Arvalis)

Note réalisée à partir des guides ARVALIS :


- [Choisir et décider – Préconisations régionales campagne 2025-2026 – Variétés et interventions d'automne en blé tendre](#)
- [Choisir et décider – Préconisations régionales campagne 2025-2026 – Variétés et interventions d'automne en orge d'hiver](#)

• Limaces


Le temps doux et humide de septembre a été favorable pour le développement des limaces (grises ou noires).

L'indice de risque annuel du modèle climatique « LIMACE » a progressé courant septembre pour l'ensemble des stations du Poitou-Charentes. Il est actuellement supérieur aux années précédentes conduisant à un risque élevé seulement dans la partie Nord, représenté par la station de référence « Poitiers-Biard ». Pour les autres stations de référence le risque est actuellement en dessous de celui de 2024.

Il est important de vérifier la présence des limaces avant le semis, spécialement si le niveau de risque est élevé (voir tableau des facteurs ou niveaux indicatifs de risques limaces dans la note nationale, lien ci-dessous).



L'axe des abscisses comporte une année découpée en décades, et commence en janvier ou en août. Les histogrammes sont des indices de risque journaliers et se rapportent à l'axe de droite. Les courbes sont des indices de risque cumulés et se rapportent à l'axe de gauche. La courbe de l'année en cours est encadrée par rapport à des années de référence hautes et des années de référence basses parmi celles disponibles dans la base



L'axe des abscisses comporte une année découpée en décades, et commence en janvier ou en août. Les histogrammes sont des indices de risque

Aux stades critiques de la levée et de la sortie des premières feuilles, effectuez des observations régulières, au moins 1 fois par semaine, voire davantage selon les conditions météo.

Rappel de la technique du piégeage :

Cette méthode permet d'évaluer les niveaux de population à la parcelle et de se référer, le cas échéant, à un seuil de nuisibilité. Installez un piège au sol, de préférence en début de journée avant 10h : une aquanappe Inra-Bayer 50 cm x 50 cm, un piège De Sangosse, Certis, ou à défaut, un abri (carton ondulé, tuile, soucoupe, planche...). Avant la pose, humidifiez les pièges et éventuellement la surface du sol. Dénombrer les individus si possible le lendemain matin et à défaut au maximum 3 à 7 jours après selon les conditions climatiques. Les captures reflètent l'intensité de la population de limaces actives par m².



Mise en place du piège limaces Inra-Bayer




Capture de limaces en piège Inra-Bayer

Période de risque : de la levée à 3F (BBCH 13).

Seuil indicatif de risque : selon les facteurs de risque, les limaces ont besoin d'humidité et d'abris. Les attaques explosives ont lieu en période douce et humide dans des conditions de :

- **Climat :** pluvieux et doux avant le semis et à la levée.
- **Type et travail du sol :** les limaces s'abritent et se déplacent dans les anfractuosités du sol. Les sols argileux, motteux, soufflés, leur fournissent des abris ; la conservation de la matière organique en surface (préparation simplifiée) leur est favorable. Dans les sols sableux, les limaces sont rares.
- **Rotation à base de colza, céréales et fourrages :** offrant nourriture et abris en continu, sont favorables aux limaces ; le colza est le précédent le plus à risque.
- **Interculture :** les repousses, les adventices, une culture intermédiaire, procurent aux limaces humidité et nourriture.

Figure 1 : Règles de décision de la protection des céréales à paille contre les limaces



(Source : projet CASDAR RESOLIM)

Évaluation du risque :

Les limaces sont en forte activité et les céréales semées ou en cours de levée sont en situation de risque **fort** notamment dans les parcelles à risque.

Au vu des conditions climatiques et de la période de sensibilité des céréales, la vigilance est de mise.

Observez vos parcelles, prioriser les parcelles avec activité limace dans la culture précédente, sans gestion résidus, couverts appétant, sol argileux et/ou motteux, semis TCS ou SD.

FOCUS Auxiliaires

A

Carabes

Appartenant à l'ordre des coléoptères, les carabes sont des insectes disposant de muscles puissants au niveau des pattes pour se déplacer au sol, ce qu'ils font rapidement. On les recherche notamment dans les cultures annuelles.

Cycle biologique

Les carabes sont très sensibles à l'évolution de leur milieu. Le stade larvaire se déroule principalement dans le sol. Ces insectes sont donc directement impactés par le travail du sol. Ils ont une espérance de vie assez longue : de 2 à 3 ans. Lorsque l'hiver arrive, ils hibernent.

Rôle(s) d'auxiliaire

Les carabes adultes se nourrissent principalement de limaces. Ils peuvent aussi se nourrir d'acariens, de pucerons, de chenilles et de divers diptères. Les larves de carabes sont particulièrement voraces. Présentes dans le sol, elles consomment les œufs de différents insectes, des limaces, escargots mais aussi des insectes adultes.

Plus d'informations sur la page Ephytia dédiée : <http://ephytia.inra.fr/fr/C/22500/Hypp-encyclopedie-en-protection-des-plantes-Autres-coleopteres-predateurs>



B

Méthodes alternatives :

Les produits de biocontrôle sont listés dans la note de service DGAL/SDSPV/ 2025-606 datant du 02/10/2025. [Téléchargez la liste.](#)

À consulter : - [Limaces : vigilance sur les parcelles déjà fortement attaquées au printemps](#)

• Vecteurs de viroses : Pucerons et cicadelles

Les pucerons d'automne comme les cicadelles ne sont pas responsables de dégâts directs. Ils sont nuisibles par le biais des virus qu'ils peuvent transmettre aux plantes. À défaut de lutte efficace contre les virus, la lutte cible uniquement les ravageurs (pucerons ou cicadelles).

La maladie des pieds chétifs comme la JNO, transmises respectivement par la cicadelle ou les pucerons, sont des maladies incurables, seule la gestion de ces ravageurs à l'automne permet de limiter la transmission de ces maladies.

Rappel de quelques éléments pour essayer de limiter les risques viroses occasionnés par les pucerons et cicadelles :

- Ne pas semer trop tôt permet entre autres de réduire le temps d'exposition des jeunes plants aux ravageurs d'automne vecteurs de virus.
- Possibilité de semer une variété d'orge ou de blé tendre (comme TWEETEO) **tolérante** à la maladie virale de la JNO (Jaunisse Nanisante de l'Orge)
- **Observer les parcelles très régulièrement par temps clair et sec.** Faire des comptages de présence des sur les plantes et poser des pièges chromatiques jaunes pour la cicadelle.

Pucerons d'automne :

La Jaunisse Nanisante de l'Orge (JNO), transmise par les piqures alimentaires des pucerons en automne (*Rhopalosiphum padi* principalement, mais également *Sitobion avenae*, *Metopolophium dirrhodum* et autres...). La manifestation des symptômes et les pertes de rendements peuvent être plus ou moins importantes.


Période de risque : à partir de la levée.

Seuil indicatif du risque : 10% de plantes porteuses d'au moins un puceron ou présence de pucerons pendant plus de 10 jours.

Les observations : sont à réaliser directement sur les plantes, de façon minutieuse dès la levée de la culture et jusqu'aux grands froids.



Rhopalosiphum padi - Aphidnet.org



Source : ARVALIS – Institut du végétal

Cicadelles des céréales :

La maladie des pieds chétifs est une virose transmise par la cicadelle *Psammotettix alienus*.

Le blé est la céréale la plus sensible à cette virose.

La contamination des céréales se fait dès les premières feuilles à l'automne, mais les symptômes ne sont visibles qu'à partir de la montaison.

Les levées précoces (début octobre) et les parcelles bien abritées sont les plus exposées car les conditions douces favorisent les pullulations ($T > 15^{\circ}\text{C}$).

Reconnaitre la cicadelle vectrice de la maladie des pieds chétifs : les différents critères observables

(Source O. PILLON, SRAL DRAFF Champagne-Ardenne, 2012)

Taille : 4 mm ,
tibiaux épineux,
Coloration générale beige,

présence d'ornementations sur la tête, sur le thorax :
5 bandes longitudinales plus claires

et sur les élytres :

Coloration des nervures dorsales éclaircie à leurs intersections


Macules dorsales réparties en zones sombres limitées aux
bordures des nervures

sauf pour la macule apicale
qui est entièrement assombrie



La présence de cet organisme peut être appréciée par piégeage sur plaque engluée jaune (photo ci-dessus). À partir de 30 captures hebdomadaires, de levée (BBCH 09) à 3 feuilles (BBCH 13), on considère que le risque de contagion est réel.

Facteurs favorables aux cicadelles



Source : ARVALIS - Institut du végétal

Toutes les céréales à paille n'ont pas la même sensibilité face à la JNO. À l'exception des variétés tolérantes JNO, l'orge d'hiver est avec l'avoine la céréale la plus sensible, avec des dégâts qui peuvent nécessiter jusqu'à retournement de la culture. Consultez les préconisations variétés du guide ARVALIS par les liens ci-dessous :

- [Choisir et décider – Préconisations régionales campagne 2025-2026 – Variétés et interventions d'automne en blé tendre](#)
- [Choisir et décider – Préconisations régionales campagne 2025-2026 – Variétés et interventions d'automne en orge d'hiver](#)

Les notes nationales de biodiversité à découvrir : [Coléoptères & santé des agro-écosystèmes](#).

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Poitou-Charentes sont les suivantes : AGRICULTEURS, CA 86, COOP MANSLE-AUNAC, COOPERATIVE DE MATHA, COOP DE LA TRICHERIE, EI. BOTET, FREDON-NA, GROUPE CA17-CA79, NEOLIS, OCEALIA, OXAGRI, SAS LAMY-BIENAIMÉ, SOUFFLET AGRICULTURE, TERRE ATLANTIQUE, TERRES INOVIA, VSN NEGOCE.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".