



N°05
18/06/2025



Animateurs filière

Jessica Rodriguez
FREDON
Nouvelle-Aquitaine
jessica.rodriguez@fredon-na.fr

Thierry BONNET
CT2F
thierry.bonnet@ct2f.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisé.
Reproduction partielle
autorisée avec la mention
« extrait du bulletin de santé
du végétal National Tabac N°05
du 18/06/25 »



Bulletin disponible sur les sites CRA : bsv.na.chambagri.fr www.mp.chambagri.fr
<https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/>

et sur les sites des DRAAF Nouvelle-Aquitaine et Grand-Est
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
<https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes>

Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT :
Nouvelle-Aquitaine : Formulaire d'abonnement au BSV
Occitanie : www.bsv.occitanie.chambagri.fr
Grand-Est : Abonnement aux BSV

Consultez les **événements agro-écologiques** près de chez vous !

Ce qu'il faut retenir

Situation météorologique ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))

Stade de la culture ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))

- **Stades** : les stades de production de plants varient du stade reprise (BBCH 1105) à celui de « choux » juste avant montaison (BBCH 2900).

Observations parasitaires ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))

- **Oïdium** : risque faible, pression en baisse.
- **Viroses AMV, CMV, TMV et PVY** : Premières apparitions sur trois départements.
- **Mildiou** : faible présence sur le secteur du Lot-et-Garonne (47).
- **Limaces et escargots** : en baisse depuis le dernier BSV.
- **Pucerons** : forte pression des adultes ailés observés sur de nombreux secteurs.
- **Taupins** : des individus observés sur de nombreux secteurs.
- **Noctuelles terricoles** : pression moyenne avec quelques dégâts.
- **Altises, Epitrix** : en progression avec une pression moyenne, des attaques observées dans sept départements.

Adventices ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))

Réseau de piégeage ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))







- **Agrotis ispilon et segetum** : plusieurs captures en parcelle de référence sur un secteur.

Notes nationales et informations ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))

- **Auxiliaires du Tabac** : diversité d'individus observés.
- **Alerte organisme de quarantaine prioritaire** : *Popillia japonica*

Situation météorologique

A retenir de la période précédente : On note que les mois de mai et de juin sont chauds avec des déficits de pluie pour certaines régions. En début du mois de mai, on note des précipitations régulières et parfois soutenues, apportant de 25 mm à 50 mm selon les secteurs. Les températures moyennes ont été supérieures aux normales de saison (+4.6°C selon les départements), excepté du 28 au 31 mai où elles ont été supérieures de 0.2 à 2°C, période marquée par le retour de conditions estivales avec des maximales atteignant 34°C. Les minimales étaient comprises entre 4°C et 15°C et les maximales entre 26°C et 34°C en fonction des secteurs.



Graphiques des précipitations et des températures des parcelles de référence de la zone Sud
Réalisation : Jessica RODRIGUEZ – FREDON NA

Prévisions pour la période à venir (juin 2025 – Source Météo France) :

Proissans (24)	MARDI 17  13° / 30° ▼ 10 km/h	MERCREDI 18  13° / 32° ► 10 km/h	JEUDI 19  14° / 33° ◀ 5 km/h	VENDREDI 20  16° / 33° ◀ 5 km/h	SAMEDI 21  18° / 36° ► 10 km/h	DIMANCHE 22  19° / 35° ► 10 km/h	LUNDI 23  23° / 36° ► 10 km/h
Saint-Agnet (40)	MARDI 17  14° / 29° ◀ 15 km/h	MERCREDI 18  17° / 31° ► 10 km/h	JEUDI 19  17° / 34° ► 15 km/h	VENDREDI 20  20° / 34° ▼ 10 km/h	SAMEDI 21  20° / 34° ▲ 15 km/h	DIMANCHE 22  18° / 32° ◀ 10 km/h	LUNDI 23  21° / 34° ► 15 km/h
Cuzorn (47)	MARDI 17  14° / 30° ▲ 5 km/h	MERCREDI 18  14° / 32° ↻ 5 km/h	JEUDI 19  17° / 34° ▲ 10 km/h	VENDREDI 20  18° / 34° ▲ 10 km/h	SAMEDI 21  20° / 35° ► 10 km/h	DIMANCHE 22  18° / 35° ▼ 10 km/h	LUNDI 23  22° / 35° ▼ 15 km/h
Saint-Ignat (63)	MARDI 17  11° / 30° ▼ 20 km/h	MERCREDI 18  13° / 31° ▼ 20 km/h	JEUDI 19  15° / 33° ► 10 km/h	VENDREDI 20  16° / 33° ► 10 km/h	SAMEDI 21  15° / 33° ↻ 5 km/h	DIMANCHE 22  16° / 36° ◀ 5 km/h	LUNDI 23  19° / 35° ▲ 5 km/h
Lapeyrouse-Mornay (26)	MARDI 17  14° / 30° ▼ 15 km/h	MERCREDI 18  14° / 32° ▼ 15 km/h	JEUDI 19  15° / 31° ▼ 15 km/h	VENDREDI 20  17° / 31° ▼ 15 km/h	SAMEDI 21  18° / 34° ► 20 km/h	DIMANCHE 22  20° / 35° ◀ 20 km/h 40 km/h	LUNDI 23  22° / 35° ◀ 20 km/h 45 km/h
Sanvensa (12)	MARDI 17  12° / 29° ◀ 10 km/h	MERCREDI 18  15° / 30° ◀ 5 km/h	JEUDI 19  17° / 32° ► 5 km/h	VENDREDI 20  17° / 32° ◀ 10 km/h	SAMEDI 21  20° / 34° ► 10 km/h	DIMANCHE 22  21° / 34° ► 15 km/h	LUNDI 23  23° / 32° ► 20 km/h 45 km/h

Stade de la culture

• Parcelles de référence

D'une manière générale, l'ensemble des plants est sain avec une bonne croissance des tabacs grâce aux conditions chaudes. Pour le secteur de Saint-Agnet (40), la parcelle sera replantée à la suite d'une pluviométrie excessive. On observe des stades très variables d'un secteur à l'autre. Les différents stades sont synthétisés dans le tableau qui suit :

Stade	Parcelles de référence	
Reprise de plantation + 15 jours (BBCH 1105)	- Saint-Agnet (40) - Proissans (24)	- Sanvensa (12)
Stade « Choux » juste avant montaison (BBCH 2900)	- Frontenay (79) - Mussig (67) - Lapeyrouse-Mornay (26) - Saint-Ignat (63)	- Brissac (49) - Cuzorn (47) - Beaufort (38)

Parcelles concernées	Ravageurs	Maladies
Brissac (49)	On note quelques dégâts de noctuelles terricoles et de taupins.	
Frontenay (79)	Quelques attaques de vers gris, de taupins et de pucerons en fort développement sur cette parcelle précoce.	
Lapeyrouse-Mornay (26)	Présence de nombreux pucerons ailés sur la parcelle.	
Adventices		
Toutes les parcelles	On note leur apparition dans de nombreux secteurs.	



Champs de tabacs au stade choux
(Crédit Photos : L. GATARD – CT2F)

• Tour de plaine

Les plants sont sains dans l'ensemble des secteurs, avec des parcelles homogènes. Malgré des conditions sèches on note dans la plupart des secteurs un bon développement des tabacs et de fortes poussées d'adventices avec la mise en place du sarclage. On observe des stades très variables d'un secteur à l'autre. Les différents stades sont synthétisés dans le tableau qui suit :

Stade	Parcelles tour de plaine	
Reprise de plantation + 15 jours (BBCH 1105)	- Puy-de-Dôme (63) - Lot (46)	- Dordogne (24) - Lot-et-Garonne (47)
Stade « Choux » juste avant montaison (BBCH 2900)	- Bas-Rhin (67) - Vienne (86) - Landes (40)	- Maine-et-Loire (49) - Isère (38) - Puy-de-Dôme (63)

Parcelles concernées	Ravageurs	Maladies
Vienne (86)	Développement important des pucerons sur le secteur avec quelques dégâts de taupins et de noctuelles terricoles. On note également quelques dégâts de corbeaux sur les gaines de goutte à goutte.	
Maine-et-Loire (49)	Présence et attaque de pucerons, vers gris et taupins.	
Adventices		
Toutes les parcelles	On note beaucoup d'adventices dans de nombreux secteurs avec une recrudescence de pourpiers dans les parcelles du Puy-de-Dôme (63).	

Ce BSV a été rédigé avec des informations collectées sur 10 parcelles de références et sur l'équivalent de 775 ha pour les tours de plaine.

Observations des maladies

• Brûlure racinaire *Olpidium brassicae*

Situation sur le terrain	Tour de plaine	
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de – à + de 20%
Lot (46)	Traces identifiées sur 7 ha	Des dégâts de moins de 20% sur 1 ha
Puy-de-Dôme (63)	Symptômes sur 7 ha	
Evaluation du risque		
		
Actuellement le niveau de pression est faible, environ 10% des plantes présentent des symptômes sur feuilles et sur les racines. Le semis est un stade à risque pour le développement de cette maladie. Appliquer les mesures prophylactiques et observer attentivement vos semis. Rappel : L' <i>Olpidium</i> crée des hétérogénéités de reprise.		

- Les Viroses AMV, CMV, TMV et PVY

Situation sur le terrain	Parcelle de référence	
Secteurs concernés :	Fréquence en %	Dégâts de - à + de 20%
Mussig (67)	3 % des plants	

Situation sur le terrain	Tour de plaine	
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de - à + de 20%
Lot (46)	Présence sur 2 ha	
Isère (38)	Symptômes sur 2 ha	
Dordogne (24)	Traces identifiées de virus PVY sur 24 ha et de virus AMV, CMV, TMV sur 10 ha	Dégâts de moins de 20% sur 16 ha de virus PVY et sur 9 ha de virus AMV, CMV, TMV



Evaluation du risque

Actuellement le niveau de pression est faible, moins de 10% des plants sont atteints. Restez vigilants car celles-ci affectent les tabacs en plein champ. Il n'existe pas de méthode curative efficace permettant de contrôler les virus en cours de culture. Appliquez les mesures prophylactiques permettant de limiter la propagation des virus et une lutte contre les pucerons.



Produits de biocontrôle et autres méthodes alternatives :

Des substances naturelles existent. Consulter la « Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle » mise à jour régulièrement : voir en fin de bulletin (Notes nationales et informations).



Virus AMV, CMV, TMV et PVY sur jeunes plants de tabacs et sur feuille
(Crédit Photo : T. BONNET – CT2F)

- **Mildiou *Peronospora hyoscyami* sp. *tabacina***

Situation sur le terrain

En tour de plaine, le mildiou est signalé dans le secteur du Lot-et-Garonne (47) où l'on note sa présence sur 4.5 ha en parcelle.



Evaluation du risque

Actuellement le niveau de pression est faible, moins de 10% des plants présentent des symptômes sur feuilles. En ce moment le risque d'apparition du mildiou est fort avec ces conditions météorologiques très propices. Les irrigations et les chaleurs à venir vont permettre son développement accentuant ainsi le risque lié à cette maladie. Surveillez vos parcelles et appliquez les mesures prophylactiques nécessaires.



Produits de biocontrôle et autres méthodes alternatives :

Des substances naturelles existent. Consulter la « Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle » mise à jour régulièrement : voir en fin de bulletin (Notes nationales et informations).



Dégâts de mildiou sur feuilles de plant de tabac en champ (en haut à gauche) et sur semis (à droite et en bas)

(Crédit Photos : N. BARRET - TGA)

Observations des ravageurs

- **Limaces et escargots**

Situation sur le terrain		Parcelle de référence
Secteurs concernés :	Fréquence en %	Dégâts de - à + de 20%
Sanvensa (12)	1 % des plants	
Mussig (67)	Symptômes de l'ordre de 1%	

Situation sur le terrain		Tour de plaine
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de - à + de 20%
Lot (46)	Symptômes sur 2 ha	
Isère (38)	Traces identifiées sur 2 ha	
Bas-Rhin (51)	Présence sur 16 ha	

Evaluation du risque	
Actuellement le niveau de pression est faible, les dégâts des limaces et escargots sont observés sur moins de 20% des plants.	



Dégâts de limaces sur jeunes plants de tabac - (Crédit Photos : S. SEGUIN – TGA)

- **Pucerons *Myzus persicae***

Situation sur le terrain	Parcelle de référence	
Secteurs concernés :	Fréquence en %	Dégâts de - à + de 20%
Sanvensa (12) et Saint-Ignat (63)	1 % des plants	
Lapeyrouse-Mornay (26) et Beaufort (38)	Symptômes de l'ordre de 1 %	
Frontenay (79), Brissac (49) et Mussig (67)		Quelques dégâts de moins de 20% sur les plants

Situation sur le terrain	Tour de plaine	
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de - à + de 20%
Dordogne (24) et Lot (46)	Présence allant de 3 à 7 ha	
Isère (38) et Puy-de-Dôme (63)	Traces identifiées allant de 17 à 25 ha	
Bas-Rhin (67)		Dégâts de plus de 20% sur 201 ha
Vienne (86)	Présence sur 75 ha	Faibles dégâts de moins de 20% sur 25 ha
Maine-et-Loire (49)	Symptômes sur 25 ha	Dégâts de plus de 20% sur 18 ha



Evaluation du risque

Actuellement le niveau de pression est moyen à fort, on note plus de 20% de folioles porteuses de pucerons sur les plants et quelques dégâts. La pression des pucerons continue à augmenter. Restez vigilants et surveillez-les pour détecter les premiers foyers. Lors de vos observations, il faut également contrôler la présence et l'activité des auxiliaires naturels.



Produits de biocontrôle et autres méthodes alternatives :

Des auxiliaires prédateurs ou parasitoïdes existent, tels que les guêpes parasitoïdes du genre **Aphidius** ou **Aphidoletes**, les nevroptères (**chrysopes** et **hémérobès**), les syrphes (**Episyrphus balteatus**), de nombreuses larves de coléoptères (**Scymnus**, **coccinelles...**) ou bien encore des champignons entomopathogènes (**Lecanicillium muscarium**). Consulter la « Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle » mise à jour régulièrement : voir en fin de bulletin (Notes nationales et informations).



Pucerons sur feuilles de jeunes plants - (Crédit Photos : D. SAUREL – TGA et T. BONNET – CT2F)

- **Taupins *Agriotes sordidus***

Situation sur le terrain		Parcelle de référence
Secteurs concernés :	Fréquence en %	Dégâts de - à + de 20%
Frontenay (79)	1 % de traces sur les plants	
Brissac (49)		Quelques dégâts de moins de 20%
Lapeyrouse-Mornay (26)	Présence sur les plants de l'ordre de 1%	

Situation sur le terrain		Tour de plaine
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de - à + de 20%
Lot (46) et Isère (38) et Lot-et-Garonne (47)	Forte présence allant de 2 à 5 ha	
Landes (40)		Dégâts de moins de 20% sur 5 ha
Bas-Rhin (67)	Symptômes sur 19 ha	Des dégâts de moins de 20% sur 11 ha
Vienne (86)	Traces nombreuses et identifiées sur 45 ha	Faibles dégâts de moins de 20% sur 18 ha
Maine-et-Loire (49)	Nombreux symptômes sur 32 ha	Des dégâts faibles de moins de 20% sur 12 ha



Evaluation du risque

Actuellement le niveau de pression est moyen, on note que 20% des plants sont attaqués par les taupins.



Produits de biocontrôle et autres méthodes alternatives :

Des substances naturelles existent. Consulter la « Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle » mise à jour régulièrement : voir en fin de bulletin (Notes nationales et informations).



Larve de taupin sortant d'un pied de tabac (gauche) et taupin adulte (droite)

(Crédit Photos : R. GENEVE - Oxyane)

• Noctuelles terricoles

Situation sur le terrain		Parcelle de référence
Secteurs concernés :	Fréquence en %	Dégâts de - à + de 20%
Proissans (24) et Sanvensa (12)	Observées sur 1% des plants	
Saint-Ignat (63)	Nombreuses apparitions sur 1% des pieds	
Brissac (49) et Frontenay (79)		Quelques dégâts de moins de 20%
Lapeyrouse-Mornay (26) et Beaufort (38)	Traces identifiées de l'ordre de 1%	

Situation sur le terrain		Tour de plaine
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de - à + de 20%
Lot (46), Lot-et-Garonne (47) et Puy-de-Dôme (63)	Présence sur 5 ha	
Isère (38)	Symptômes allant de 5 à 10 ha	Fréquence d'attaque de moins de 20% allant de 0.5 à 7 ha
Landes (40)		Dégâts de moins de 20% sur 5 ha
Vienne (68)	De nombreux symptômes sur 90 ha	Des dégâts de moins de 20 % sur 45 ha et de plus de 20% sur 11 ha
Maine-et-Loire (49)	Présence sur 28 ha	Fréquence d'attaque de moins de 20% sur 20 ha
Bas-Rhin (67)	Traces identifiées sur 36 ha	Faibles dégâts de moins de 20% sur 24 ha



Evaluation du risque

Actuellement le niveau de pression est moyen, on note moins de 20% de plants attaqués par les noctuelles terricoles. Restez vigilants et surveillez-les pour détecter les premiers foyers.



Noctuelles terricoles (à gauche et droite) et dégâts de noctuelles sur pied de tabac (au milieu)
(Crédit Photos : L. GATARD – CT2F et T. BONNET – CT2F)


- **Altises *Alticinae* sp.**

Situation sur le terrain

Pour les parcelles de référence, seul le secteur de Proissans (24) est concerné pour le moment par la présence d'altises sur les feuilles de tabacs. En tour de plaine, on note de faibles dégâts de moins de 20% sur 25 ha pour le secteur du Lot-et-Garonne (47). On note également sa présence sur 5 ha pour les départements du Lot (46) et Isère (38). Des dégâts de plus de 20% allant de 4 à 5 ha ont été constatés sur les parcelles des Landes (40) et de la Dordogne (24). En Puy-de-Dôme (63) et Dordogne (24), la présence d'altises amène de faibles dégâts de moins de 20% allant de 1 à 2 ha.

Evaluation du risque

Actuellement le niveau de pression est moyen, on note moins de 20% de plants attaqués par les altises.
Restez vigilants et surveillez-les pour détecter les premiers foyers.



Dégâts d'altises sur jeune plant de tabac - (Crédit Photos : D. SAUREL - TGA)

- **Gibiers**

Situation sur le terrain

En parcelle de référence, on note la présence de corbeaux sur 1% des plants sur Lapeyrouse-Mornay (26). En tour de plaine, on note des dégâts de moins de 20% causés par les corbeaux sur les gaines de goutte à goutte sur les départements des Landes (40) et de la Vienne (46). Enfin on note des dégâts parfois significatifs de lièvres allant de 2.5 à 7 ha en Isère (38).

- **Tipules**

Situation sur le terrain

En tour de plaine, on note la présence de traces sur 24 ha sur le département du Bas-Rhin (67) et l'on observe sur 1 ha de faibles dégâts d'une fréquence d'attaque de moins de 20% pour le département des Landes (40).

- **Noctuelles défoliatrices**

Situation sur le terrain

En tour de plaine, on note la présence des premières traces de noctuelles défoliatrices allant de 3 à 14 ha sur les départements de la Dordogne (24) et du Puy-de-Dôme (63).

Situation sur le terrain : En parcelle de référence, on note sur le secteur de Saint-Ignat (63) la présence de pourpiers. A la suite du temps chaud de ces derniers jours et des pluies, on signale la levée de nombreuses adventices sur de nombreux secteurs en tour de plaine dont la présence d'adventices sur 5 ha pour le département des Landes (40). Le tableau ci-dessous indique les adventices observées en parcelle de référence et en tour de plaine :

ZONES GEOGRAPHIQUES	Parcelles de référence (X : nombre de plantes au m²)						Tour de plaine (Surface en ha où la présence d'adventices a été observée)							
	Sanvessa (12)	Mussig (67)	Saint-Ignat (63)	Lapeyrouse-Mornay (26) et Beaufort (38)	Brissac (49)	Frontenay (79)	Lot (46)	Isère (38)	Dordogne (24)	Puy-de-Dôme (63)	Lot-et-Garonne (47)	Bas-Rhin (67)	Vienne (86)	Maine-et-Loire (49)
Adventices tt. esp.						Présence					12 ha	225	155	80 ha
Ambroisie				X<1			1 ha	5		2 ha			28 ha	
Amarante	X<1		X<1	X<1	1>X<10	1>X<10	5 ha		3 ha	25 ha	2 ha	91 ha	85 ha	55 ha
Chardons							1 ha			10 ha	4 ha		25 ha	12 ha
Chénopode		X<1	X<1		10>X<20	1>X<10	3 ha	1 ha		20 ha		124	120	48 ha
Datura					1>X<10	1>X<10			2 ha	1 ha			55 ha	22 ha
Liserons	X<1	X<1			1>X<10	X<1	7 ha	5 ha	1 ha	10 ha		25 ha	85 ha	45 ha
Mercuriale		1>X<10			10>X<20	10>X<20			2 ha	3 ha			130	65 ha
Morelle noire			X<1		1>X<10	1>X<10	3 ha			3 ha			90 ha	45 ha
Panic	X<1	1>X<10			1>X<10		4 ha		2 ha	12 ha		140	55 ha	28 ha
Renouée	X<1				1>X<10	1>X<10	7 ha			4 ha			60 ha	25 ha
Sétaire										10 ha			15 ha	
Lampourde							7 ha	1 ha	1 ha		9 ha			
Souchets				1>X<10										
Graminées						Présence	3 ha				4 ha		25 ha	25 ha
Oxalis						1>X<10	2 ha						12 ha	16 ha
A.Dicotylédones													45 ha	45 ha




Mercuriales (à gauche) – Oxalis (au milieu) – Datura (à droite)

(Crédit Photos : L. GATARD – CT2F et D. SAUREL - TGA)

Réseau de piégeage

Situation sur le terrain

Sur le réseau de piégeage on signale trois captures de papillons **d'Agrotis ipsilon** et seize captures d'**Agrotis segetum** dans le secteur de Saint-Ignat (63).



Notes nationales et informations

• Les solutions de biocontrôle

Rappel : Avant d'utiliser un produit de biocontrôle, il faut vérifier son homologation sur la culture pour l'usage ciblé.



Solutions de biocontrôle

Consultez la dernière *note de service de la DGAL* [ici](#). Cette note établit la liste des **produits de biocontrôle** comprenant les micro-organismes, les substances naturelles, les médiateurs chimiques et les pièges à insectes. Pour les macro-organismes, respecter les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire.

• Auxiliaires du tabac

Situation sur le terrain

En parcelle de référence on observe la faible présence de syrphes et de coccinelles sur le secteur de Saint-Ignat (63), Mussig (67), Lapeyrouse-Mornay (26), Beaufort (38) et Proissans (24). Sur les zones de Brissac (49) et Frontenay (79) on note une présence moyenne de coccinelles et de syrphes avec quelques chrysopes.

Pour les parcelles en tour de plaine, à cause d'une forte population de pucerons des coccinelles sont présentes en grand nombre sur 225 ha pour le département du Bas-Rhin (67). On note également la présence de coccinelles sur 3 ha et de syrphes sur 10 ha pour le secteur de Puy-de-Dôme (63). Pour le Lot (46), on note quelques individus de coccinelles sur 1 ha, de chrysopes ainsi que la présence de syrphes sur 2 ha et des micro-hyménoptères sur 1 ha. On remarque aussi la présence sur 5 ha de coccinelles et de syrphes allant de 3 à 5 ha sur les secteurs de Dordogne (24) et Isère (38). Pour le département de la Vienne (86) et du Maine-et-Loire (49) on note une action positive des chrysopes et hémérobes qui a été observée sur 15 à 35 ha, de syrphes sur 35 à 65 ha et de coccinelles sur 45 à 120 ha. Dans le département de la Vienne (86), on signale la présence de coccinelles sur 80 ha, de chrysopes et hémérobes sur 60 ha ainsi que celle de syrphes sur 80 ha.

Enfin n'oubliez pas que vos auxiliaires naturels tels que les araignées, les syrphes et les coccinelles présents dans vos parcelles ont aussi un rôle à jouer sur la protection naturelle et la biodiversité ! Pour plus d'information voir ce lien sur les différents auxiliaires moins connus des cultures : [ICI](#). De manière générale, observez et soyez vigilant quant à leur conservation dans vos stratégies de protection des cultures.

Alerte organisme de quarantaine prioritaire : *Popillia japonica*

Popillia japonica ou scarabée japonais, est un coléoptère originaire d'Asie extrêmement préoccupant compte tenu de ses capacités à s'attaquer à une très grande diversité de végétaux et à proliférer rapidement.



Introduit accidentellement en Italie puis en Suisse, à ce jour absent du territoire français, le scarabée japonais fait l'objet d'une surveillance renforcée sur l'ensemble du territoire afin de permettre une détection précoce en cas d'introduction et la mise en œuvre de moyens de lutte visant à sa rapide éradication.

Consultez la fiche d'alerte éditée par le service régionale de l'alimentation (SRAL) N-A : https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/094_Inst-Nouvelle-Aquitaine/Documents/BSV_Notes_Techniques/Fiche_alerte_POPILLIA_Japonica_SRAL_NA.pdf

Tout symptôme évocateur de sa présence doit être immédiatement déclaré en joignant des photos aux services officiels (DRAAF/SRAL NA) par courriel à l'adresse : sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr



Sinistre de grêle, d'orage et de stagnation d'eau (à gauche et à droite)

(Crédit Photos : R. GENEVE - Oxyane)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Grand Sud-Ouest Tabac sont les suivantes : FREDON Nouvelle-Aquitaine - Tabac Garonne Adour - Coopérative CT2F - Oxyane

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. Les Chambres Régionales d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et Grand-Est dégagent donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".