



N°06
02/07/2025



Animateurs filière

Jessica Rodriguez
FREDON
Nouvelle-Aquitaine
jessica.rodriguez@fredon-na.fr

Thierry BONNET
CT2F
thierry.bonnet@ct2f.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisé.
Reproduction partielle
autorisée avec la mention
« extrait du bulletin de santé
du végétal National Tabac N°06
du 02/07/25 »



Bulletin disponible sur les sites CRA : bsv.na.chambagri.fr www.mp.chambagri.fr
<https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/ecophyto/bulletins-de-sante-du-vegetal/>

et sur les sites des DRAAF Nouvelle-Aquitaine et Grand-Est
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
<https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-organismes>

Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT :
Nouvelle-Aquitaine : Formulaire d'abonnement au BSV
Occitanie : www.bsv.occitanie.chambagri.fr
Grand-Est : Abonnement aux BSV

Consultez les **événements agro-écologiques** près de chez vous !

Ce qu'il faut retenir

Situation météorologique ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))

Stade de la culture ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))

- **Stades** : les stades de production de plants varient du stade « choux » juste avant montaison (BBCH 2900) à montaison (BBCH 5010).

Observations parasitaires ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))

- **Viroses AMV, CMV, TMV et PVY** : continue sa progression avec de quelques symptômes.
- **Pourriture noire « Chalara »** : faible pression, quelques traces.
- **Pucerons** : toujours en progression sur certains secteurs, régulés par les auxiliaires.
- **Punaies** : quelques individus, en la pression est en progression.
- **Noctuelles terricoles** : pression moyenne avec quelques dégâts.
- **Altises, Epitrix** : se développent dans cinq secteurs.
- **Noctuelles défoliatrices** : faible présence.
- **Gibiers** : toujours quelques apparitions avec faible dégâts.
- **Taupins** : premières apparitions, faible présence.

Adventices ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))

Parasites ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))

Réseau de piégeage ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))







- **Agrotis ipsilon et segetum** : un total de 11 captures en parcelle de référence sur Saint-Ignat (63).

Notes nationales et informations ([cliquer ici pour accéder au paragraphe](#))

- **Auxiliaires du Tabac** : diversité d'individus observés.

Situation météorologique

A retenir de la période précédente : le mois de juin a été plus chaud cette année, avec des températures moyennes atteignant les 22.6°C dans certains départements (+3.6°C par rapport à 2024). Il a été marqué par une augmentation progressive des températures devenues estivales vers la fin du mois, associées à des passages pluvieux et orageux avec quelques épisodes de grêles pour certains départements. On note des températures un peu plus fraîches en matinée ainsi que des températures plus chaudes en fin d'après-midi.



Graphiques des précipitations et des températures des parcelles de référence de la zone Sud
Réalisation : Jessica RODRIGUEZ – FREDON NA

Prévisions pour la période à venir (juillet 2025 – Source Météo France) :

Proissans (24)	LUNDI 30  20° / 38° ▲ 10 km/h	MARDI 01  20° / 38° ▲ 10 km/h	MERCREDI 02  20° / 33° ► 15 km/h	JEUDI 03  20° / 34° ▼ 10 km/h	VENDREDI 04  20° / 30° ▼ 15 km/h	SAMEDI 05  16° / 29° ▲ 15 km/h	DIMANCHE 06  15° / 23° ▲ 15 km/h 40 km/h
Saint-Agnet (40)	LUNDI 30  22° / 38° ▼ 20 km/h 40 km/h	MARDI 01  20° / 38° ► 25 km/h 45 km/h	MERCREDI 02  20° / 28° ► 20 km/h 40 km/h	JEUDI 03  19° / 33° ► 20 km/h	VENDREDI 04  19° / 27° ▲ 15 km/h	SAMEDI 05  17° / 28° ▲ 15 km/h	DIMANCHE 06  17° / 25° ▲ 20 km/h
Cuzorn (47)	LUNDI 30  18° / 38° ▲ 15 km/h	MARDI 01  20° / 39° ► 15 km/h	MERCREDI 02  19° / 35° ► 15 km/h	JEUDI 03  20° / 34° ▲ 10 km/h	VENDREDI 04  21° / 30° ▲ 10 km/h	SAMEDI 05  17° / 30° ▲ 15 km/h	DIMANCHE 06  16° / 24° ▲ 15 km/h
Saint-Ignat (63)	LUNDI 30  19° / 37° ▼ 20 km/h	MARDI 01  19° / 39° ► 20 km/h	MERCREDI 02  19° / 38° ► 15 km/h	JEUDI 03  21° / 35° ▼ 15 km/h	VENDREDI 04  18° / 30° ▼ 15 km/h	SAMEDI 05  17° / 31° ▼ 10 km/h	DIMANCHE 06  16° / 25° ▼ 15 km/h
Lapeyrouse-Mornay (26)	LUNDI 30  20° / 37° ▲ 25 km/h 55 km/h	MARDI 01  20° / 39° ► 20 km/h	MERCREDI 02  22° / 38° ▲ 20 km/h 45 km/h	JEUDI 03  23° / 38° ▼ 20 km/h 40 km/h	VENDREDI 04  21° / 33° ▼ 20 km/h 45 km/h	SAMEDI 05  20° / 32° ▼ 20 km/h	DIMANCHE 06  19° / 29° ► 15 km/h
Sanvensa (12)	LUNDI 30  20° / 36° ▼ 15 km/h	MARDI 01  21° / 38° ▼ 10 km/h	MERCREDI 02  20° / 34° ▲ 15 km/h	JEUDI 03  18° / 33° ▲ 10 km/h	VENDREDI 04  21° / 30° ▲ 10 km/h	SAMEDI 05  17° / 29° ▲ 15 km/h	DIMANCHE 06  16° / 24° ▲ 15 km/h

Stade de la culture

• Parcelles de référence

D'une manière générale, l'ensemble des plants est sain avec des parcelles en buttage notamment en Virginie. Sur Proissans (24), on observe des dégâts dus à un passage de grêle le 15 juin. Pour la zone de Cuzorn (47), on note que les tabacs ont subi beaucoup de dégâts (surtout les Burley) à la suite des épisodes orageux et de grêle du 25 juin. La tempête a fait rage sur Lapeyrouse-Mornay (26), mais on ne note aucun dégât à déplorer avec une parcelle hétérogène. **Rappel : sur certains secteurs, des risques de développement de mildiou et de sclérotinia sont à craindre, d'autant plus sur les parcelles irriguées.** Les différents stades sont synthétisés dans le tableau qui suit :

Stade	Parcelles de référence	
« Choux » juste avant montaison (BBCH 2900)	- Mussig (67) - Saint-Agnet (40)	- Sanvensa (12) - Lapeyrouse-Mornay (26)
Début montaison (BBCH 3000)	- Saint-Ignat (63) - Brissac (49)	- Frontenay (79) - Proissans (24)
Montaison (BBCH 5010)	- Beaufort (38)	- Cuzorn (47)

Parcelles concernées	Ravageurs	Maladies
Mussig (67)	Les populations de pucerons ailés ont totalement disparu de la parcelle. Les punaises ont fait leur apparition.	
Frontenay (79)	Des attaques de punaises sont en cours.	Présence de pourritures grises ralentissant la reprise des tabacs par zones « Chalara ».
Brissac (49)	Passage de gibiers sur la parcelle avec des attaques de punaises en cours. Les pucerons sont maîtrisés par les auxiliaires.	
Adventices / Parasites		
Toutes les parcelles	On note leur levée dans de nombreux secteurs.	
Saint-Agnet (40)	On note quelques dicotylédones et graminées diverses, les binages sont en cours.	
Mussig (67)	L'orobanche s'est accrochée en nombre sur les plants de tabacs de manière assez précoce.	



Grêlons sur la commune de Cuzorn (à gauche) et dégâts de grêle à Albias (à droite)

(Crédit Photos : N. BARRET et D. SAUREL – TGA)

• Tour de plaine

Les tabacs sont sains et hétérogènes sur l'ensemble des parcelles et certains présentant déjà le stade de montaison en fonction des variétés. Les températures chaudes du mois de juin font jaunir les tabacs sur les étages bas et l'on note d'importants dégâts de grêle le mercredi 25 juin sur le secteur Lot-et-Garonne (47). En Isère (38) et dans les Landes (40) les parcelles sont saines et poussantes, on ne note aucun dégât à la suite des orages, des ravinements et des passages de grêle. **Rappel : Risque de mildiou élevé dans certaines régions.** Les différents stades sont synthétisés dans le tableau qui suit :

Stade	Parcelles tour de plaine	
« Choux » juste avant montaison (BBCH 2900)	- Lot (46) - Lot-et-Garonne (47)	- Puy-de-Dôme (63)
Début montaison (BBCH 3000)	- Bas-Rhin (67) - Maine-et-Loire (49)	- Dordogne (24) - Isère (38)
Montaison (BBCH 5010)	- Isère (38) - Vienne (86)	- Landes (40)
Dégagement des boutons floraux (BBCH 5500)	- Landes (40)	

Parcelles concernées	Ravageurs	Maladies
Bas-Rhin (67)	Présence en petite quantité de pucerons verts, les punaises sont déjà sorties des céréales.	Moins de viroses que lors du dernier BSV.
Vienne (86) et Maine-et-Loire (49)	Quelques dégâts de lièvres, sangliers, chevreuils et corbeaux. Nombreuses attaques de punaises et les pucerons sont bien contrôlés par les nombreux auxiliaires.	
Adventices / Parasites		
Toutes les parcelles	On note leur levée dans de nombreux secteurs avec la mise en place des binages.	
Bas-Rhin (67)	L'orobanche est présente avec les premiers dégâts visibles dans 15 jours.	



Stade « choux » (à gauche), début de montaison (au centre) et montaison (à droite)
(Crédit Photo : N. BARRET – TGA et L. GATARD – CT2F)

Ce BSV a été rédigé avec des informations collectées sur 10 parcelles de références et sur l'équivalent de 842 ha pour les tours de plaine.

Observations des maladies

• Les Viroses AMV, CMV, TMV et PVY

Situation sur le terrain	Parcelle de référence	
Secteurs concernés :	Fréquence en %	Dégâts de - à + de 20%
Mussig (67) et Lapeyrouse-Mornay (26)	Symptômes de viroses AMV, CMV, TMV de l'ordre de 1% et virus PVY à 2%	
Lapeyrouse-Mornay (26)	Traces identifiées de AMV, CMV, TMV de l'ordre de 2%	

Situation sur le terrain	Tour de plaine	
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de - à + de 20%
Isère (38)	Quelques traces de viroses AMV, CMV, TMV de l'ordre de 1% sur 35 ha et du virus PVY sur 4.5 ha	
Bas-Rhin (67)	Traces identifiées de virus PVY sur 63 ha et AMV, CMV, TMV sur 49 ha	
Puy-de-Dôme (63)	Traces identifiées de virus PVY sur 1 ha et de virus AMV, CMV, TMV sur 10 ha	
Lot (46)	Symptômes de virus AMV, CMV, TMV sur 4 ha et de virus PVY sur 1 ha	



Evaluation du risque

Actuellement le niveau de pression est faible, moins de 10% des plants sont atteints. Restez vigilants car celles-ci affectent les tabacs en plein champ. Il n'existe pas de méthode curative efficace permettant de contrôler les virus en cours de culture. Appliquez les mesures prophylactiques permettant de limiter la propagation des virus et une lutte contre les pucerons.



Produits de biocontrôle et autres méthodes alternatives :

Des substances naturelles existent. Consulter la « Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle » mise à jour régulièrement : voir en fin de bulletin (Notes nationales et informations).



Viroses AMV, CMV, TMV sur les plants de tabac

(Crédit Photo : D. SAUREL, S. SEGUIN – TGA et R. GENEVE – Oxyane)

- **Pourriture noire des racines « *Chalara* »**

Situation sur le terrain		Parcelle de référence
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de – à + de 20%
Frontenay (79)	Présence de l'ordre de 10% sur les tabacs	
Mussig (67)	Traces identifiées sur 3% des pieds de tabacs	
Evaluation du risque		
		
Actuellement le niveau de pression est faible, moins de 10% des tabacs présentent des symptômes sur les racines. Rappel : Les parcelles déjà contaminées peuvent être de nouveau être atteintes les années suivantes.		

Observations des ravageurs

- **Pucerons *Myzus persicae***

Situation sur le terrain		Parcelle de référence
Secteurs concernés :	Fréquence en %	Dégâts de – à + de 20%
Beaufort (38), Mussig (67), Sanvensa (12) et Brissac (49)	Symptômes de l'ordre de 1%	
Mussig (67)		Quelques dégâts de moins de 20%

Situation sur le terrain		Tour de plaine
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de – à + de 20%
Dordogne (24), Lot (46) et Isère (38)	Présence allant de 4 à 10 ha	
Bas-Rhin (67) et Puy-de-Dôme (63)	Traces identifiées allant de 20 à 34 ha	
Landes (40)	Symptômes sur 5 ha	Quelques faibles dégâts de moins de 20% sur 5 ha
Vienne (86)	Symptômes sur 60 ha	Faibles dégâts de moins de 20% sur 60 ha
Maine-et-Loire (49)	Traces identifiées sur 35 ha	Quelques dégâts de moins de 20% sur 30 ha
Evaluation du risque		
		

Actuellement le niveau de pression est moyen, on note moins de 10% de folioles porteuses de pucerons sur les plants. La pression des pucerons commence à augmenter. Restez vigilants et surveillez-les pour détecter les foyers. Lors de vos observations, il faut également contrôler la présence et l'activité des auxiliaires naturels.



Pucerons sur feuilles de jeunes plants - (Crédit Photos : D. SAUREL – TGA et T. BONNET – CT2F)

- **Punaises (*Nezara*, *Halyomorpha*...)**

Situation sur le terrain		Parcelle de référence
Secteurs concernés :	Fréquence en %	Dégâts de - à + de 20%
Mussig (67) et Sanvensa (12)	Symptômes de l'ordre de 1%	
Frontenay (79) et Brissac (49)		Quelques dégâts de moins de 20%

Situation sur le terrain		Tour de plaine
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de - à + de 20%
Lot (46) et Puy-de-Dôme (63)	Présence allant de 4 à 8 ha	
Vienne (86)	Traces identifiées sur 50 ha	Faibles dégâts de moins de 20% sur 45 ha
Maine-et-Loire (49)	Signalées sur 40 ha	Des dégâts de moins et plus de 20% sur 25 ha
Bas-Rhin (67)	Symptômes identifiés sur 152 ha	Quelques dégâts de moins de 20% sur 140 ha



Evaluation du risque

Actuellement le niveau de pression est moyen, on note que moins de 20% des plants sont attaqués par les punaises. Restez vigilants et surveillez-les pour détecter les foyers.



Punaise des près (à gauche), punaise des baies (au centre) et dégâts de punaises (à droite)
(Crédit Photo : T. BONNET et L. GATARD – CT2F)

- **Noctuelles terricoles *Agrotis segetum***

Situation sur le terrain		Parcelle de référence
Secteurs concernés :	Fréquence en %	Dégâts de – à + de 20%
Brissac (49) et Sanvensa (12)	1 % des plants avec sa présence	
Mussig (67)	Nombreuses apparitions sur 1% des pieds	

Situation sur le terrain		Tour de plaine
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de – à + de 20%
Puy-de-Dôme (63) et Maine-et-Loire (49)	Quelques apparitions allant de 3 à 18 ha	
Lot (46)	Traces de noctuelles terricoles sur 7 ha	Dégâts de moins de 20% sur 1 ha
Landes (40)	Population conséquence sur 3 ha	Faibles dégâts de moins de 20% sur 3 ha
Lot-et-Garonne (47)	Traces identifiées de vers gris sur 4 ha	Dégâts de moins de 20% sur 3,5 ha



Evaluation du risque

Actuellement le niveau de pression est moyen, on note plus de 20% de plants attaqués par les noctuelles terricoles. Restez vigilants et surveillez-les pour détecter les premiers foyers.



Noctuelles terricoles (à gauche, au centre) et dégâts de noctuelles sur pied de tabac (à droite)
(Crédit Photos : L. GATARD – CT2F et D. SAUREL – TGA)

- **Altises *Alticinae* sp.**

Situation sur le terrain		Parcelle de référence
Secteurs concernés :	Fréquence en %	Dégâts de – à + de 20%
Proissans (24)	Symptômes de l'ordre de 1%	

Situation sur le terrain		Tour de plaine
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de – à + de 20%
Isère (38) et Lot (46)	Présence du bioagresseur allant de 1.5 à 3 ha	
Bas-Rhin (67)	Traces identifiées sur 12 ha	
Dordogne (24)		Des dégâts de plus de 20% sur 10 ha
Lot-et-Garonne (47)	Symptômes sur 2 ha	Quelques dégâts de moins de 20% sur 12 ha

Evaluation du risque

Actuellement le niveau de pression est moyen, on note moins de 20% de plants attaqués par les altises. Restez vigilants et surveillez-les pour détecter les premiers symptômes.


- **Noctuelles défoliatrices**

Situation sur le terrain		Parcelle de référence
Secteurs concernés :	Fréquence en %	Dégâts de – à + de 20%
Mussig (67)	1 % des plants	

Situation sur le terrain		Tour de plaine
Secteurs concernés :	Fréquence en ha	Dégâts de – à + de 20%
Puy-de-Dôme (63)	Présence sur 2 ha	
Dordogne (24)	Symptômes sur 5 ha	
Bas-Rhin (67)	Traces identifiées sur 26 ha	

Evaluation du risque

Actuellement le niveau de pression est faible, on note moins de 10% de plants attaqués par les noctuelles défoliatrices. Restez vigilants et surveillez-les pour détecter les premiers foyers.



Chenille défoliatrice sur plants de tabac - (Crédit Photo : S. SEGUIN - TGA)

- **Gibiers**

Situation sur le terrain

En parcelle de référence, on note la présence de gibiers sur 1% des plants sur Lapeyrouse-Mornay (26) et quelques dégâts de moins de 20% sur le secteur de Brissac (49). En tour de plaine, on note des dégâts de moins de 20% du gibiers sur 11 ha dans le département du Bas-Rhin (67). Pour la Vienne (86) on note de forte population de lièvres, sangliers, chevreuils et corbeaux sur 55 ha avec des dégâts de moins de 20% sur 30 ha. Ces mêmes espèces animales sont également observés sur 28 ha du département de la Maine-et-Loire avec de faibles dégâts de moins de 20% sur 12 ha.

- **Taupins *Agriotes sordidus***

Situation sur le terrain

En tour de plaine, on note la présence de taupins sur 5 ha et des dégâts de moins de 20% causés sur 5 ha pour le département des Landes (40).

Adventices

Situation sur le terrain

En parcelle de référence on remarque sur Saint-Agnet (40) la présence de quelques dicotylédones et graminées avec un binage en cours. A la suite du temps chaud de ces derniers jours, on signale sur de nombreux secteurs des adventices : morelles noires, amarantes, daturas, renouées, panics, liserons, etc.

Le tableau ci-dessous indique les adventices observées en parcelle de référence et en tour de plaine :

ZONES GEOGRAPHIQUES	Parcelles de référence (X : nombre de plantes au m ²)					Tour de plaine (Surface en ha où la présence d'adventices a été observée)				
	Proissans (24)	Mussig (67)	Sanvansa (12)	Saint-Ignat (63)	Frontenay (79)	Puy-de-Dôme (63)	Lot-et-Garonne (47)	Dordogne (24)	Bas-Rhin (67)	Lot (46)
Adventices tt. esp.			Présence		Présence			10 ha		
Ambroisie						5 ha				3 ha
Amarante	X<1	X<1	X<1	X<1	1>X<10	20 ha		4 ha	71 ha	6 ha
Chardons					X<1	10 ha	4 ha			1 ha
Chénopode		X<1		X<1	1>X<10	20 ha			63 ha	2 ha
Datura			X<1		1>X<10	6 ha		2 ha		2 ha
Liserons			X<1		1>X<10	10 ha	1.5 ha		21 ha	6 ha
Mercuriale					1>X<10	5 ha				
Morelle noire				X<1	1>X<10	8 ha				2 ha
Panic		1>X<10				6 ha	1.6 ha	4 ha	181 ha	5 ha
Renouée	X<1		1>X<10	X<1	1>X<10	3 ha	3.5 ha	2 ha	7 ha	8 ha
Oxalis										1 ha
Lampourde						2 ha	6 ha			7 ha
Graminées							8 ha			
A.Dicotylédones					Présence					



Datura, Panics (à gauche) ambrosie (au centre) et carex (à droite)
- (Crédit Photos : D. SAUREL, S. SEGUIN et N. BARRET - TGA)

Parasites

- **Orobanche rameuse *Orobanche ramosa***

Situation sur le terrain : En parcelle de référence on note la présence d'orobanche rameuse sur le secteur de Mussig (67. Pour le tour de plaine, l'orobanche rameuse est signalée pour la première fois dans le département du Bas-Rhin (67), où elle est présente sur 17 ha avec des dégâts de moins de 20% sur 9 ha. Les premiers dégâts seront visibles dans 15 jours.

Evaluation du risque : La pression est encore faible, à surveiller.




Orobanche rameuse près des pieds de tabac
(Crédit Photos : T. BONNET – CT2F)

Réseau de piégeage

Situation sur le terrain

Sur le réseau de piégeage on signale trois captures d'**Agrotis ipsilon** et huit captures de papillons d'**Agrotis segetum**, relevées dans le secteur de Saint-Ignat (63).



Notes nationales et informations

• Les solutions de biocontrôle

Rappel : Avant d'utiliser un produit de biocontrôle, il faut vérifier son homologation sur la culture pour l'usage ciblé.



Solutions de biocontrôle

Consultez la dernière *note de service de la DGAL* [ici](#). Cette note établit la liste des **produits de biocontrôle** comprenant les micro-organismes, les substances naturelles, les médiateurs chimiques et les pièges à insectes. Pour les macro-organismes, respecter les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire.

• Auxiliaires du tabac

Situation sur le terrain

En parcelle de référence on observe la faible présence de syrphes de l'ordre de 1 % sur les secteurs de Saint-Ignat (63), Mussig (67), Brissac (49), Frontenay (79), Sanvensa (12), Beaufort (38) et Lapeyrouse-Mornay (26). Des coccinelles moyennement présentes sur les secteurs de Lapeyrouse-Mornay (26), Mussig (67), Brissac (49), Beaufort (38) et Frontenay (79) ; elles ont une action positive contre les pucerons. Pour les secteurs de Lapeyrouse-Mornay (26), Beaufort (38), Brissac (49), Sanvensa (12) et on observe la présence de chrysopes, hémérobes et micro-hyménoptères ; 1 à 3% des pieds observés sont concernés.

Pour les parcelles en tour de plaine, des coccinelles avec une action positive sont présentes sur 224 ha avec des syrphes sur 58 ha pour le secteur de Bas-Rhin (67). On observe la régulation des pucerons par les coccinelles allant de 4 à 60 ha dans les secteurs de l'Isère (38), de la Vienne (86), du Maine-et-Loire (49) et du Lot (46). Pour les départements de l'Isère (38), de la Dordogne (24) et du Lot (46), on note quelques individus de syrphes, de chrysopes et d'hémérobies allant de 2 à 25 ha. On note une action positive des syrphes et de micro-hyménoptères dans 2 à 15 ha pour les secteurs du Lot (46) et du Puy-de-Dôme (63). Dans le département du Maine-et-Loire (49) et de la Vienne (86), on signale la forte présence de coccinelles sur 60 à 30 ha, des chrysopes sur 50 à 15 ha et des syrphes sur 20 à 40 ha.

Enfin n'oubliez pas que vos auxiliaires naturels tels que les araignées, les syrphes et les coccinelles présents dans vos parcelles ont aussi un rôle à jouer sur la protection naturelle et la biodiversité ! Pour plus d'informations voir ce lien sur les différents auxiliaires moins connus des cultures : [ICI](#)

De manière générale, observez et soyez vigilant quant à leur conservation dans vos stratégies de protection des cultures.



Coccinelles à 7 points et pupes

(Crédit Photos : D.SAUREL – TGA et T. BONNET – CT2F)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Grand Sud-Ouest Tabac sont les suivantes : FREDON Nouvelle-Aquitaine - Tabac Garonne Adour - Coopérative CT2F - Oxyane

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. Les Chambres Régionales d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et Grand-Est dégagent donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".