



Bulletin de Santé du Végétal

Nouvelle-Aquitaine



Vigne

N°06
06/05/2025



Animateur filière

Magdalena GIRARD
Chambre d'agriculture de la
Charente-Maritime
magdalena.girard@charente-
maritime.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES
Site de Bordeaux

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Charentes
N°06 du 06/05/2025 »



Edition Charentes

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur **Formulaire d'abonnement au BSV**

Consultez les **événements agro-écologiques** près de chez vous !

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- Stade moyen (Ugni blanc) : 5/6 feuilles étalées

Mildiou

- Risque conditionné par le niveau de précipitations

Black rot

- Risque fort à très fort

Oïdium

- Risque globalement faible

Tordeuses

- Poursuite des vols de Cochylis et d'Eudémis

Le bulletin de cette semaine est réalisé à partir des premières données d'observations du réseau de parcelles, complétées par des données « tour de plaine ».

La qualité des données du BSV dépend, en grande partie, de la qualité et de la taille du réseau d'observations du vignoble Charentais. Participez, vous aussi, tout au long de la saison à l'amélioration du réseau d'observations du BSV en multipliant vos signalements (maladies, ravageurs, événements climatiques...) sur le site [Web Alerte Vigne](#).

Phénologie

La vigne a profité de la météo estivale de la semaine dernière pour dynamiser sa croissance et montrer une pousse active.

Sur 50 parcelles d'Ugni blanc observées, le stade moyen calculé est de 12.4 : 5-6 feuilles étalées (BBCH 16). Les inflorescences commencent à être visibles, et quelques rameaux précoces atteignent le stade 17 (boutons floraux séparés).

Le nombre moyen de feuilles étalées par rameau est de 5.7, avec plus de 2 feuilles sorties en une semaine. La longueur moyenne des rameaux mesurés (sur 26 parcelles) est de 23.6 cm avec une pousse de plus de 14 cm depuis la semaine dernière.

Ces valeurs sont similaires à celles de 2024 à la même date.

Toutefois, la chute des températures de cette semaine devrait ralentir cette croissance et faire revenir les observations phéno à des valeurs plus dans la moyenne.



Stade 12 – 5/6 feuilles étalées



Cabernet franc Ile de Ré – approche boutons floraux séparés

Climatologie

→ De la semaine passée

Températures

Les températures moyennes de la semaine passée atteignent 17.5°C.

Pluies

Au cours de la dernière semaine, la moyenne hebdomadaire des précipitations sur l'ensemble des vignobles est de 1.5 mm. Le zonage montre les résultats suivants : Sud 1.6 mm ; Littoral 1 mm ; Cœur 0.8 mm ; Iles 3.3 mm ; Nord 1.4 mm ; Est 0.5 mm et Ouest 1 mm (Période du 29/04 au 05/05).

→ Prévisions météo

Du 06/05 au 12/05, la prévision météorologique la plus probable annonce un cumul de 4.3 mm de pluie. L'hypothèse la plus pessimiste annonce un cumul de 26.9 mm de pluie. L'épisode pluvieux le plus important aura lieu le 12/05 avec un cumul pouvant aller de 2.9 mm à 11.6 mm en moyenne sur le vignoble. Les températures maximales seront comprises entre 17 et 19°C cette semaine, avec un pic à 22.7°C le 10/05. Les minimales seront de 8-9°C en moyenne sur la semaine, avant d'augmenter en fin de semaine (12.5°C le 11/05).

Maladies


→ Mildiou

Observations

Les toutes premières taches, très rares, issues des contaminations pré-épidémiques, ont été observées à Brizambourg et à Juillac le Coq.

Des taches jaunes d'origines diverses sont observées au vignoble. A ne pas confondre avec le mildiou ! En cas de doute, placer la feuille dans une boîte fermée, avec de l'essuie-tout humide, et attendre la sporulation.

N'hésitez pas à signaler vos observations de premières taches par mail à magdalena.girard@cmds.chambagri.fr (merci de joindre une photo si possible).



Taches de mildiou, parcelle de référence Brizambourg et TNT Juillac le Coq
(Crédits photos S. Lucas - CIA1779, M. Cerclé - IFV)

Méthodes alternatives :

Les premières taches sont dues à un effet « splashing » de la pluie sur le sol vers la végétation. Le travail du sol ou l'enherbement sont tous les deux des moyens pour limiter l'effet éclaboussures. L'épamprage permet d'éliminer la végétation basse, premiers relais des contaminations primaires de mildiou.

Modélisation (source IFV)

Sur la semaine passée

La situation est restée globalement favorable au mildiou au cours de la semaine dernière, cependant le risque a diminué localement.


Le stock d'œufs responsables des contaminations épidémiques a légèrement augmenté dans le vignoble.

De très faibles contaminations épidémiques ont été calculées très localement dans le vignoble. Le nombre d'organes contaminés est très faible.

Dans les trois jours à venir

Dans la semaine, le risque potentiel va diminuer, il sera faible sur l'ensemble du vignoble. Le modèle n'indique aucune progression de la production d'œufs mûrs dans la semaine à venir. L'hypothèse météorologique la plus pessimiste avec un orage sur le début de la semaine prochaine pourrait créer des conditions favorables au mildiou sur l'ensemble du vignoble (risque potentiel fort voire très fort).

Selon l'hypothèse la plus probable, le modèle ne calcule pas de contaminations épidémiques dans les sept jours à venir. Dans le cas de l'hypothèse météorologique la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques régulières dans le vignoble.



Evaluation du risque :

Risque en baisse mais augmente de nouveau en cas de pluie.



En absence de pluie significative risque de contaminations faible



En cas de pluie significative risque de contaminations élevé

 Consultez la fiche « [mildiou](#) » du Guide de l'Observateur

→ Black rot



Tache de black rot, St Même les Carrières
(Crédit photo L. Davidou - Phloème)

Observations

Une première tache de black rot a été observée la semaine dernière à St Même les Carrières.

Modélisation

Sur la semaine passée

Le risque potentiel est resté globalement fort au cours de la semaine dernière.


À la fin de la semaine dernière, le modèle a calculé de faibles contaminations épidémiques régulières dans le vignoble. La FTA a progressé localement (sur 20% des points de modélisation). D'après le modèle, le nombre d'organes contaminés est globalement faible.

Dans les trois jours à venir

Le risque potentiel va rester fort dans le vignoble, voire devenir majoritairement très fort dans l'Ouest du vignoble.

Dans les trois jours à venir, le modèle ne calcule pas de contaminations en absence de pluies.

Dans les sept jours à venir, des contaminations régulières sont calculées à partir d'un épisode pluvieux de 2 mm. D'après le modèle, le nombre d'organes contaminés devrait rester faible. Des contaminations, avec une intensité modérée à forte, sont possibles sur les zones avec un risque potentiel très fort (Cf cartographie du risque potentiel).



Evaluation du risque :

Risque en augmentation. Contaminations d'intensité variable prévues sur les pluies à venir.



Risque fort à très fort en fonction des secteurs

Consultez la fiche « [black rot](#) » du Guide de l'Observateur



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

- Eliminez les baies momifiées (grappillons non récoltés, restés accrochés au palissage) lors de la taille ou du piégeage.
- Réduire l'humidité des parcelles (enherbement maîtrisé, drainage, combler les mouillères...).
- Les produits de biocontrôle sont listés dans la dernière note de l'IFV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#)

→ Oïdium

Modélisation

Sur la semaine passée

Au cours de la semaine dernière, le risque potentiel est resté globalement fort dans le vignoble.

De très faibles contaminations épidémiques ont été calculées très localement. Dans ce cas, le nombre d'organes contaminés est très faible.

Dans les trois jours à venir

Le risque potentiel sera fort sur l'ensemble du vignoble.

Dans la semaine à venir, de faibles contaminations sont calculées localement dans le vignoble lors des prochains épisodes pluvieux. D'après le modèle, le nombre d'organes contaminés devrait rester très faible.



Evaluation du risque :

Début de stade de réceptivité dans les parcelles sensibles et précoces. Risque de contaminations faible.



Risque globalement faible

Consultez la fiche « [oïdium](#) » du Guide de l'Observateur

→ Excoriose

Observations

Des symptômes d'excoriose sont présents dans certaines parcelles sur des rameaux verts, parfois les attaques sont importantes, notamment dans le Nord du vignoble

Observations BSV

Nouveau protocole d'observation pour le BSV (estimation de la présence au vignoble) :

- **L'observation sera effectuée sur 50 pieds en-dehors du témoin non traité**
- Réaliser l'observation au **stade 5/6 feuilles**
- Observer les **trois premiers entre-nœuds** de tous les rameaux
- Noter la **fréquence** de présence de l'excoriose **par pied** = nombre de pieds touchés sur 50.
- Saisir sur Epicure selon la procédure habituelle, dans protocole simplifié, onglet « maladies du bois »

 Consultez la fiche « [excoriose](#) » du Guide de l'Observateur

→ Eutypiose

Observations

Des symptômes, parfois importants, d'eutypiose sont observés localement au vignoble.

Éléments de biologie (Rappel)

L'agent responsable de l'Eutypiose, *Eutypa lata*, est un champignon se conservant sous forme de mycélium dans le bois mort et sous forme d'ascospores dans les périthèces présents sur les bois. Les ascospores sont libérées pendant et après une pluie, toute l'année, et disséminées par le vent. Les spores pénètrent par les plaies de taille, se propagent dans les tissus ligneux et provoquent le développement d'une nécrose sectorielle. Il faut 4 à 8 ans avant l'apparition des premiers symptômes.

Les symptômes sont essentiellement visibles lors des printemps pluvieux.

- Sur organes herbacés :
 - entre-nœuds raccourcis et rameaux nanifiés (sur un seul bras ou parfois tout le cep) ;
 - feuilles nanifiées, chlorotiques ;
 - inflorescences à port érigé,
 - coulure ou millerandage.
- Sur et dans le bois :
 - partie de tronc sans écorce avec présence de périthèces ;
 - à la section : présence de nécroses brunes, dures, sectorielles, bien délimitées ;
 - les parties mortes restent dures et les plus anciennes se cassent facilement.

Méthodes alternatives

- diminuer les sources d'inoculum : retirer et brûler les bois morts (et a fortiori les tas de souches) ;
- tailler le plus tard possible : à la montée de la sève (pleurs) ;
- si possible, éviter de tailler en période pluvieuse.

→ Nécrose bactérienne

Observations

Actuellement, des symptômes sur feuilles sont observés dans des vignes historiquement atteintes et ayant subi la grêle l'année dernière sur les Bords de Gironde.



Excoriose sur vieux bois et jeune rameau, Mons (17)

(Crédit photo L. Caillaud - CIA 17-79)



Symptômes importants d'eutypiose – Montils

(Crédit photo L. Bizeau - CIA17-79)



Nécrose bactérienne – Mortagne s/Gironde
(Crédit photo M. Girard - CIA17-79)

→ Botrytis

Observations

Les symptômes de Botrytis sur feuilles sont localement présents.



Tache de Botrytis – Ile de Ré
(Crédit photo J. Poulard – UNIRE)

Evaluation du risque

Les attaques de Botrytis sur feuilles sont fréquentes au printemps. Elles ne présentent aucun risque pour la vigne et ne présagent pas de futures attaques sur grappes.


Ravageurs

→ Tordeuses

Observations

73 Cochylis ont été capturées la semaine passée. Le vol est particulièrement actif sur le littoral, à Mortagne sur Gironde, avec 33 papillons, 27 et 13 papillons sont recensés respectivement à Champagne-Vigny et à Rouillac.

Eudémis : 61 papillons ont été piégés sur la semaine, 23 à Rouillac, 12 à St Simeux. Des captures inférieures à 10 papillons sont relevées à Malaville (9), Sigogne (7) et Champagne-Vigny (6).



Cochylis
(Crédit photo INRA)



Eudémis
(Crédit photo INRA)



Cnephasia sp
(Crédit photo C. Moreau, Segonzac)

Consultez la [fiche technique Vers de la grappe](#) qui présente les différents types de piégeage.

Le Mémo de l'Observateur

A faire :

- **Observations phénologie croissance.**
- **Observations excoriose**
- **Observation des témoins non traités et parcelles de référence**
- **Recherche de taches de mildiou/black rot**
- **Relevés des pièges sexuels**

Retrouvez le Guide de l'Observateur en [cliquant ici](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Charentes sont les suivantes : les Chambres d'Agriculture de la Charente et de la Charente Maritime/Deux Sèvres, la Coopérative Agricole d'Achats en Commun et d'Approvisionnement, la Coopérative Agricole de la Région de Cognac, la Coopérative Agricole Terre Atlantique, le Groupe Coopératif Océalia, la Coopérative Agricole du canton de Matha, la Coopérative des Vignerons de l'Île de Ré, Rémy Martin, Martell, Hennessy, Domaines Boinaud, Vitivista, le Groupe Isidore, les Ets Fortet-Dufaud, les Ets Soufflet Agriculture, les Ets Landreau et Fils, les Ets Piveteau, les Ets Niort Agricole, les Ets Etourneauud, les Ets Nau, la FDCETA, la FREDON Nouvelle Aquitaine, l'Institut Français de la Vigne et du Vin, la Station Viticole du BNIC et les Établissements d'enseignement agricole de Saintes, Jonzac et l'Oisellerie.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".