



Vigne

N°07
13/05/2025



Animateur filière

Magdalena GIRARD
Chambre d'agriculture de la
Charente-Maritime
magdalena.girard@charente-
maritime.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES
Site de Bordeaux

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Charentes
N°07 du 13/05/2025 »



Edition Charentes

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [Formulaire d'abonnement au BSV](#)

Consultez les [événements agro-écologiques](#) près de chez vous !

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- Stade moyen (Ugni blanc) : 7 feuilles étalées

Mildiou

- Risque faible en absence de pluies

Black rot

- Risque fort à très fort

Oïdium

- Risque globalement faible
- Stade de réceptivité atteint dans les parcelles précoces

Excoriose

- Comptage à effectuer pour les observateurs BSV

Tordeuses

- Diminution des vols de Cochylis
- Activation du vol d'Eudémis

Le bulletin de cette semaine est réalisé à partir des premières données d'observations du réseau de parcelles, complétées par des données « tour de plaine ».

La qualité des données du BSV dépend, en grande partie, de la qualité et de la taille du réseau d'observations du vignoble Charentais. Participez, vous aussi, tout au long de la saison à l'amélioration du réseau d'observations du BSV en multipliant vos signalements (maladies, ravageurs, événements climatiques...) sur le site [Web Alerte Vigne](#).

Phénologie

Comme prévu, le changement des conditions météorologiques a ralenti la croissance de la vigne.

Cette semaine, sur 48 parcelles d'Ugni blanc observées, le stade moyen calculé est de 14.2 (BBCH 51). Les inflorescences sont visibles et se développent, on s'approche du stade "boutons floraux encore agglomérés".

Le nombre moyen de feuilles étalées est de 7, avec 1.5 feuilles supplémentaires depuis la semaine dernière.

La longueur moyenne des rameaux mesurés (sur 24 parcelles) atteint 35 cm avec une pousse hebdomadaire de près de 12 cm.

Ces données sont similaires à celle de l'an dernier à la même période et sont en avance d'à peu près une semaine par rapport à la moyenne décennale.



Stade 15 – boutons floraux agglomérés

Climatologie

→ De la semaine passée

Températures

Les températures moyennes de la semaine passée atteignent 14.2°C.

Pluies

Au cours de la dernière semaine, la moyenne hebdomadaire des précipitations sur l'ensemble du vignoble est de 22.6 mm. Le zonage montre les résultats suivants : Sud 27.3 mm ; Littoral 15.4 mm ; Cœur 30.1 mm ; Iles 18.4 mm ; Nord 19.8 mm ; Est 18.7 mm et Ouest 19.5 mm (Période du 06/05 au 12/05)..

→ Prévisions météo

Du 13/05 au 19/05, la prévision météorologique la plus probable annonce un cumul de 1.8 mm de pluie. L'hypothèse la plus pessimiste annonce un cumul de 8.2 mm de pluie. L'épisode pluvieux le plus important aura lieu aujourd'hui (13/05) avec un cumul pouvant aller de 1.8 mm à 4.4 mm en moyenne sur le vignoble. Selon l'hypothèse la plus probable, aucune précipitation n'est attendue entre le 14 et le 19/05. Dans la semaine, les températures vont augmenter de 19°C à 24°C pour les maximales, et les minimales vont augmenter de 9°C à 12°C.

→ Grêle

Des épisodes de grêle ont eu lieu dans le Nord du vignoble le soir du 10 mai.



Grêle à Villemorin, Néré, Fontaine Chalendray
(Crédits photos M. Ardouin, R. Drillaud, B. Saboureau)

Maladies

→ Mildiou

Observations

Quelques nouvelles taches, issues des contaminations pré-épidémiques, ont été observées à Chenac St Seurin, Mortagne s/Gironde, Javrezac, Brie sous Archiac et Givrezac.

Des taches jaunes d'origines diverses sont observées au vignoble. A ne pas confondre avec le mildiou ! En cas de doute, placer la feuille dans une boîte fermée, avec de l'essuie-tout humide, et attendre la sporulation.

N'hésitez pas à signaler vos observations de premières taches par mail à magdalena.girard@cmds.chambagri.fr (merci de joindre une photo si possible).



Mildiou sur pampre proche du sol, jeune vigne, Chenac St Seurin

(Crédit photo C. Bernard – Mortagne s/Gironde)

Méthodes alternatives :

Les premières taches sont dues à un effet « splashing » de la pluie sur le sol vers la végétation.

Le travail du sol ou l'enherbement sont tous les deux des moyens pour limiter l'effet éclaboussures. L'épamprage permet d'éliminer la végétation basse, premiers relais des contaminations primaires de mildiou.

Sur la semaine passée

Les conditions climatiques sont restées globalement défavorables au mildiou la semaine dernière jusqu'à l'épisode pluvieux du 10/05 qui a créé localement des conditions favorables à très favorables au mildiou. Le risque potentiel était majoritairement faible dans l'Ouest et le Nord du vignoble et localement fort voire très fort dans le cœur du vignoble et dans les parties Est et Sud.

Le modèle a calculé des contaminations épidémiques généralisées lors des dernières pluies (90 % des points ont connu une hausse de leur FTA). D'après le modèle, le nombre d'organes contaminés reste faible.


Dans les trois jours à venir

Dans la semaine, le risque potentiel va diminuer, il sera globalement faible sur l'ensemble du vignoble, il restera fort très localement dans l'Est du vignoble. L'hypothèse météorologique la plus pessimiste avec des précipitations sur le début de la semaine prochaine pourrait créer des conditions favorables au mildiou sur l'ensemble du vignoble (risque potentiel fort voire très fort).

Dans les sept jours à venir :

Selon l'hypothèse la plus probable, le modèle calcule localement de faibles contaminations épidémiques ce début de semaine.

Modélisation (source IFV)



Dans le cas de l'hypothèse météorologique la plus pessimiste avec des pluies en début de semaine prochaine, le modèle calcule des contaminations épidémiques régulières avec un nombre d'organes contaminés faibles.

Evaluation du risque :

Risque majoritairement faible, malgré les pluies du week-end passé. Risque plus fort dans le Sud-Est du vignoble.



En absence de pluie significative risque de contaminations faible



En cas de pluie significative risque de contaminations régulières avec un niveau faible

 Consultez la fiche « [mildiou](#) » du Guide de l'Observateur

→ Black rot



Taches de black rot, Moulidars, Givrezac, Chérac

(Crédits photos B. Hirondeau – CA16, L. Bizeau, L. Caillaud - CIA 17/79))

Observations

Une sortie localement importante de taches de black rot est relevée 20 témoins non traités sur 43 observés : Givrezac (40% des ceps touchés), Bourg-Charente (40%), St Même les Carrières (22%), St Preuil (21%), Javrezac (14%), Birac, Chérac, Gémozac, Montils, Foussignac, Graves St Amant, Lignières, Champagnac, Ste Marie de Ré, Saintes, Sigogne, Rouillac, Thors, Chadenac et Malaville. C'est également le cas dans certaines parcelles traitées : Pouillac, Touzac, Barbezieux, Ste Colombe, Chardes, Gondeville, St Même les Carrières, Mainxe, Bellevigne.

Modélisation


Sur la semaine passée

Au cours de la semaine dernière, les conditions climatiques ont été favorables à la maturation des périthèces.

À la fin de la semaine dernière, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité faible à modérée, de manière généralisée dans le vignoble. Localement la hausse de la fréquence théorique d'attaque a été très forte, notamment à Brie-Sous-Mortagne, Rouffiac et Marignac.

Dans les trois jours à venir

Les conditions climatiques vont rester favorables à la maturation des périthèces. Le risque potentiel va rester très



fort dans l'Ouest du vignoble et fort sur le reste du vignoble.

Dans les sept jours à venir :

Selon l'hypothèse la plus probable, le modèle calcule uniquement de faibles contaminations localement dans l'Ouest du vignoble.

Dans le cas de l'hypothèse météorologique la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques régulières, d'intensité faible à modérée, dans le vignoble.

Evaluation du risque :

Risque en augmentation, très fort sur l'Ouest du vignoble. Contaminations d'intensité variable prévues en cas de pluies.



En cas de pluie risque fort à très fort en fonction des secteurs

 **Consultez la fiche « [black rot](#) » du Guide de l'Observateur**



Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

- Eliminez les baies momifiées (grappillons non récoltés, restés accrochés au palissage) lors de la taille ou du pliage.
- Réduire l'humidité des parcelles (enherbement maîtrisé, drainage, combler les mouillères...).
- Les produits de biocontrôle sont listés dans la dernière note de l'IFV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#)

→ Oïdium

Modélisation

Sur la semaine passée

Au cours de la semaine dernière, les conditions climatiques ont été favorables à l'oïdium dans le vignoble.


De très faibles contaminations épidémiques ont été calculées localement. Dans ce cas, le nombre d'organes contaminés est très faible.

Dans les trois jours à venir

Les conditions climatiques resteront favorables à l'oïdium sur l'ensemble du vignoble.

Dans la semaine à venir, le modèle ne calcule pas de contaminations épidémiques.

Dans le cas de l'hypothèse météorologique la plus pessimiste, des contaminations sont calculées localement dans le vignoble en début de semaine prochaine. D'après le modèle, le nombre d'organes contaminés devrait rester très faible.



Evaluation du risque :

Stade de réceptivité atteint dans les parcelles précoces. Localement risque de contaminations à un niveau très faible.



▲ Risque globalement faible

📖 Consultez la fiche « [oïdium](#) » du Guide de l'Observateur

Ravageurs

→ Tordeuses

Observations

Cochylis : le vol de 1ère génération a fortement ralenti cette semaine avec 33 captures sur le réseau. Seul le site d'Authon Ebéon reste actif avec 28 papillons comptabilisés.

Eudémis : 212 papillons ont été piégés cette semaine sur le réseau. Le vol est particulièrement actif sur le secteur de Rouillac avec 77 et 39 captures sur les deux pièges suivis. 40 eudémis sont relevés à Jurignac et St Simeux.

27 et 10 papillons sont relevés à Champagne-Vigny et Sigogne.



Cochylis
(Crédit photo INRA)



Eudémis
(Crédit photo INRA)



Cnephasia sp
(Crédit photo C. Moreau, Segonzac)

Consultez la [fiche technique Vers de la grappe](#) qui présente les différents types de piégeage.

→ Cochenilles

Des fourmis sont actuellement visibles sur les ceps. Leur présence indique généralement celle des cochenilles.

Les cochenilles ont passé l'hiver sans bouclier, sous les écorces des ceps et des rameaux. Avec les températures plus clémentes, l'activité des cochenilles reprend. Elles s'alimentent et excrètent occasionnellement du miellat. Elles vont pondre des centaines d'œufs sous leur bouclier.

L'évaluation des risques sera faite lors de l'éclosion des œufs, au stade baladeur, vers la mi-juin.



Fourmi et cochenilles
(Crédit photo groupe Viti'tech de Burie)

Au vignoble



Dégâts importants d'escargots, Guimps
(Crédit photo F. Joseph – Niort Agricole)



Eutypiose
(Crédit photo L. Mazure – CA16)



Cicadelle verte
(Crédit photo J. Poulard – UNIRE)



Taches de black rot, TNT Javrezac
(Crédit photo M. Cerclé – IFV)

Le Mémo de l'Observateur

A faire :

- Observations phénologie croissance.
- **Observations excoriose**
- Observation des témoins non traités et parcelles de référence
- Recherche de taches de mildiou/black rot/oïdium
- Relevés des pièges sexuels

Retrouvez le Guide de l'Observateur en [cliquant ici](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Charentes sont les suivantes : les Chambres d'Agriculture de la Charente et de la Charente Maritime/Deux Sèvres, la Coopérative Agricole d'Achats en Commun et d'Approvisionnement, la Coopérative Agricole de la Région de Cognac, la Coopérative Agricole Terre Atlantique, le Groupe Coopératif Océalia, la Coopérative Agricole du canton de Matha, la Coopérative des Vignerons de l'Île de Ré, Rémy Martin, Martell, Hennessy, Domaines Boinaud, Vitivista, le Groupe Isidore, les Ets Fortet-Dufaud, les Ets Soufflet Agriculture, les Ets Landreau et Fils, les Ets Piveteau, les Ets Niort Agricole, les Ets Etourneauud, les Ets Nau, la FDCETA, la FREDON Nouvelle Aquitaine, l'Institut Français de la Vigne et du Vin, la Station Viticole du BNIC et les Établissements d'enseignement agricole de Saintes, Jonzac et l'Oisellerie.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

" Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité ".