



N°08

13/08/2026



Animateur filière

Louise FURELAU-MEYNIER
FREDON N-A
louise.furelau@fredon-na.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Maraîchage
Edition Sud NA
N°09 du 13/08/2026 »

Edition **Sud Nouvelle-Aquitaine**

Départements 19/24/33/40/47/64

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Situation météorologique

Le **tableau** ci-dessous récapitule le risque de la semaine passée et à venir **pour chaque bioagresseur** selon ce code couleur :

Très Faible	Faible	Modéré	Fort	Très Fort
-------------	--------	--------	------	-----------

Tomates

Bioagresseur	Semaine passée	Semaine à venir
<u>Botrytis</u>		
<u>Punaises</u>		
<u>Tuta absoluta</u>		

Aubergine

Bioagresseur	Semaine passée	Semaine à venir
<u>Punaises</u>		
<u>Aleurodes</u>		

Poivron / piment

Bioagresseur	Semaine passée	Semaine à venir
<u>Pucerons</u>		
<u>Punaises</u>		
<u>Acariens</u>		

Concombre

Bioagresseur	Semaine passée	Semaine à venir
<u>Thrips</u>		
<u>Mineuses</u>		
<u>Punaises</u>		





Produits de biocontrôle

Consultez la *note de service DGAL/SDSPV* [ici](#). Cette note établit la liste des **produits de biocontrôle** comprenant les micro-organismes, les substances naturelles, les médiateurs chimiques et les pièges à insectes. Pour les macro-organismes, respecter les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire.

De manière générale et pour toutes les cultures, observez et soyez vigilant quant à la conservation de vos auxiliaires naturels dans vos stratégies de protection des cultures.

Situation météorologique

Au cours des deux dernières semaines, la Nouvelle-Aquitaine a connu une période globalement très chaude, mais marquée par plusieurs fluctuations. Après un début de période encore assez variable avec quelques passages nuageux et averses localisés, les conditions se sont progressivement asséchées et réchauffées. Plusieurs poussées de chaleur se sont succédé, avec un ensoleillement souvent généreux et des températures nettement supérieures aux normales de saison. Les valeurs maximales ont régulièrement dépassé les 30°C sur une grande partie de la région, atteignant localement 35 à 38°C, voire davantage dans les secteurs intérieurs. Les nuits sont également devenues de plus en plus douces lors des phases les plus chaudes, limitant parfois sensiblement le rafraîchissement nocturne.

Pour les prochains jours, la chaleur va nettement s'intensifier sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Une nouvelle poussée chaude, associée à des conditions anticycloniques, devrait favoriser un temps très largement ensoleillé et sec. Le pic de chaleur est attendu autour des 13 et 14 août, avec des températures maximales pouvant atteindre 35 à 40°C dans de nombreux secteurs, localement davantage dans l'intérieur des terres, tandis que les minimales resteront élevées et pourront dépasser 20°C dans les zones les plus exposées. Quelques développements orageux isolés pourront toutefois se produire, notamment à proximité des reliefs. Puis, la chaleur devrait ensuite persister quelques jours, avant une évolution plus instable et potentiellement moins chaude en deuxième partie de semaine prochaine.

Prévisions du 13 au 19 août 2026 (source : Météo France)

Station	Prévisions pour les 7 jours à venir :						
	JEUDI 13	VENDREDI 14	SAMEDI 15	DIMANCHE 16	LUNDI 17	MARDI 18	MERCREDI 19
Agen (47)	 24° / 41° ▼ 10 km/h	 21° / 40° ▲ 15 km/h	 21° / 36° ▼ 10 km/h	 21° / 29° ▲ 10 km/h	 19° / 29° ▲ 15 km/h	 17° / 30° ▲ 10 km/h	 16° / 30° ▲ 5 km/h
Podensac (33)	 21° / 40° ▼ 10 km/h	 21° / 40° ▲ 20 km/h	 21° / 32° ▲ 10 km/h	 20° / 28° ▲ 15 km/h	 18° / 31° ▲ 15 km/h	 17° / 32° ▲ 20 km/h	 16° / 31° ▲ 20 km/h
Bassillac (24)	 17° / 39° ▲ 10 km/h	 18° / 40° ▼ 20 km/h	 21° / 34° ▲ 10 km/h	 19° / 28° ▲ 10 km/h	 18° / 29° ▲ 10 km/h	 14° / 31° ▲ 10 km/h	 15° / 31° ▲ 10 km/h
Beaulieu-sur-Dordogne (19)	 14° / 39° ▲ 5 km/h	 18° / 40° ▼ 15 km/h	 20° / 35° ▲ 10 km/h	 19° / 28° ▲ 10 km/h	 17° / 29° ▲ 15 km/h	 14° / 31° ▲ 10 km/h	 14° / 31° ▲ 5 km/h

Tomate

→ Les observations pour rédiger ce BSV ont été réalisées sur près de **50 hectares** de cultures de tomates sous serre en Lot-et-Garonne.

Maladies

• Botrytis

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : La maladie est bien présente dans le réseau d'observation : des symptômes observés sur plus d'1/4 des sites suivis, avec une intensité d'attaques estimée à moins d'1/4 de plants affectés dans les parcelles concernées. Les contaminations restent favorisées dans les cultures à forte végétation, en présence de blessures (effeuillage, taille) et lorsque l'humidité persiste au sein du couvert.

Evaluation du risque :

Cette semaine le risque est estimé **faible**. Les blessures liées aux opérations culturales, la présence de rosées matinales, les irrigations et les conditions de confinement sous abri favorisent la poursuite des contaminations. Une surveillance attentive est recommandée afin de limiter la propagation de la maladie, en particulier dans les parcelles les plus denses et les plus humides.



Méthodes prophylactiques

- Enlever les parties contaminées
- Choisir des variétés tolérantes ou résistantes au Botrytis et pratiquer la rotation des cultures
- Aérer les cultures en effeuillant et en respectant les densités de plantation
- Favoriser l'aération des cultures et limiter les périodes de condensation
- Eviter les excès d'irrigation et les mouillages prolongés du feuillage
- Maintenir un équilibre entre densité du couvert et circulation de l'air

• Cladosporiose

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : Cette maladie est présente dans moins d'1/4 des parcelles suivies, avec une intensité d'attaque correspondant à moins d'1/3 de plants affectés. La pression est encore faible, avec une surveillance à maintenir en fonction des conditions humides favorables au développement du champignon. Situation semblable pour l'**oïdium**.

Evaluation du risque :

Risque estimé **faible**. La présence de symptômes dans les parcelles suivies nécessite une vigilance, notamment en cas de périodes humides avec une forte hygrométrie, des rosées fréquentes et un couvert végétal peu aéré, conditions favorables au développement de cette maladie.



Méthodes prophylactiques

- Assurer une bonne aération des cultures (espacement des plants, gestion du feuillage)
- Éviter de maintenir une humidité prolongée sur le feuillage
- Ventiler les abris afin de limiter la condensation
- Supprimer les feuilles atteintes et les évacuer de la parcelle
- Éviter de travailler dans les cultures lorsque le feuillage est humide
- Nettoyer et désinfecter le matériel entre les parcelles
- Respecter les rotations culturales et éliminer les résidus de culture infectés

Ravageurs

• Punaïses (Cyrtopeltis)

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : La présence de ces Miridés a évolué avec plus d'1/3 des ateliers du secteur concernés et une intensité d'attaques assez conséquente. Présence possible d'adultes et de jeunes larves sur feuillage et fruits en parcelle.

Evaluation du risque :

Risque **punaises moyen à fort** : avec les fortes chaleurs actuelles, elles deviennent plus actives et se déplacent davantage vers les cultures pour se nourrir. En plein champ, la pression reste variable selon les parcelles et les bordures, mais sous abri elles peuvent s'installer durablement si elles ne sont pas détectées assez tôt.



Méthodes prophylactiques

- Limiter les zones refuges à proximité des cultures (gestion des adventices, abords de serres)
- Surveiller régulièrement les parcelles, en particulier en bordure
- Mettre en place des filets ou barrières physiques en cultures sous abri
- Favoriser la biodiversité fonctionnelle (auxiliaires prédateurs)
- Éliminer rapidement les premiers individus ou foyers
- En cultures sous abri, bien vérifier l'étanchéité des structures (entrées possibles) et maintenir un environnement maîtrisé (limiter les abris favorables)

• *Tuta absoluta*

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : Leur présence est signalée sur près de 3/4 des sites à historiques surveillés du secteur et les intensités d'attaques varient de moyenne à forte.

Comment différencier les larves *Tuta absoluta* et la mineuse *Agromyzidae* ? (Crédit photos : ephytia.inra.fr)


Tuta absoluta



Larves et adulte de *Tuta*

Mouches mineuses du genre *Agromyzidae*

Famille de diptères cyclorraphes, dont les asticots sont phytophages, mineurs de feuilles ou foreurs de tiges.



Larves (a), pupa (b) et Mouche *Agromyzidae* (c)

Dégâts de *Tuta absoluta*



Sur les feuilles apparaissent des **grandes galeries blanchâtres** relatives au parenchyme dévoré par la larve laissant l'épiderme à nu. Ces taches deviennent ensuite brunes et nécrotiques. La larve attaque aussi bien les feuilles que les fruits. Des excréments noirs sont visibles sur les feuilles. Dans les mines, on relève des **larves de lépidoptères** (photo ci-dessus) de couleur crème lors du stade L1 à une couleur verdâtre/rose clair pour les 3 autres stades.

Dégâts de la mineuse (*Liriomyza trifolii*)



Mines de la mineuse américaine ***Liriomyza trifolii*** dont l'hôte est principalement la tomate en France.

Sur les feuilles apparaissent de **fines mines plus ou moins nombreuses** le long des nervures. Dans les mines, on peut relever des larves de **diptères** (asticot) de couleur crème à la naissance puis jaune.



Galerie de *Tuta absoluta* sur feuilles (Crédit photos : D. COMBLON – AGRIFEEL)

Evaluation du risque :

Risque *Tuta absoluta* actuellement **moyen** à **fort**. En période chaude comme maintenant, la chaleur accélère fortement son cycle et peut provoquer des explosions de populations en serre ou tunnel. En plein champ, le risque est plus variable mais augmente nettement dès que les températures restent élevées plusieurs jours d'affilée et que la surveillance / lutte ne sont pas régulières.

Méthodes prophylactiques

- Utiliser des plants sains
- Mettre en place des filets insect-proof (abris)
- Installer des pièges à phéromones pour le suivi
- Éliminer et détruire les feuilles ou plants infestés
- Gérer les résidus de culture (éviter les réservoirs)
- En cultures sous abri, veiller à assurer l'étanchéité des structures et mettre en place une surveillance régulière et précoce

• Autres bioagresseurs

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : Le **ToBRFV** (**Tomato brown rugose fruit virus**) semble être en augmentation depuis le dernier BSV, avec plus d'1/4 de parcelles présentant des symptômes.

Des **acariens** sont observés dans 1/3 des parcelles suivies. Les infestations restent limitées, avec environ près d'1/4 des plantes touchées dans les ateliers concernés.

Aubergine

➔ Les observations pour rédiger ce BSV ont été réalisées sur près de **20 ha** de cultures en Lot-et-Garonne.

Ravageurs

• Punaïses (*Halyomorpha halys*, *Nezara viridula*)

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : Toujours observées sur l'ensemble des parcelles du réseau. L'intensité des attaques est encore faible avec plus d'1/4 de plants atteints. Tous les stades sont observés et essentiellement en tête de plante. Le peu de dégâts reste néanmoins important et nécessite donc des interventions.

Situation similaire pour les **acariens**.

Evaluation du risque :

Risque **punaises** toujours estimé **faible** à **moyen**. La chaleur favorise leur activité et leur reproduction, et l'aubergine est une culture très attractive pour elles. Le risque est généralement plus marqué en plein champ en bordure de parcelles et peut devenir durable sous abri si les populations s'installent tôt.



Méthodes prophylactiques

- Limiter les zones refuges près des cultures (gestion adventices, bordures, abords de serres)
- Surveiller régulièrement les parcelles, en particulier en bordure
- Mettre en place des filets ou barrières physiques en cultures sous abri
- Favoriser la biodiversité fonctionnelle (auxiliaires prédateurs)
- En cultures sous abri, bien vérifier l'étanchéité des structures (entrées possibles)

• Aleurodes

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : Leur présence est signalée sur près de 3/4 des ateliers touchés du secteur avec cette semaine une intensité d'attaques plutôt faible.

Seuil indicatif de risque

On considère que le risque est **élevé** lorsque l'on observe plus de **10 individus/plant**.

Evaluation du risque :

Risque **modéré** cette semaine : les conditions douces actuelles peuvent favoriser les premières installations, notamment sous abri. En plein champ, les populations restent généralement limitées à ce stade de la saison. Les espèces telles que *Bemisia tabaci* et *Trialeurodes vaporariorum* peuvent commencer à apparaître en cultures protégées, avec un développement encore lent en début de campagne. Les alternances de températures douces et d'humidité ne sont pas encore pleinement optimales pour des explosions de populations, mais la vigilance est de mise.

Pour rappel, les **aleurodes** sont vecteurs de virus. *Bemisia tabaci* véhicule notamment le virus ToLCNDV (*Tomato Leaf Curl New Dehli Virus*) et le ToCV (*Tomato Chlorosis Virus*).

Méthodes prophylactiques

- Utiliser des plants sains et contrôler leur état sanitaire à la réception
- Installer des filets insect-proof sur les ouvertures des serres
- Éliminer les adventices hôtes à proximité des cultures et des abris
- Surveiller régulièrement le revers des feuilles pour détecter les premières colonies
- Favoriser une bonne aération des abris pour limiter les conditions favorables
- Éviter les excès d'azote, qui favorisent un feuillage tendre attractif
- Mettre en place des pièges englués jaunes pour le suivi des populations
- En cas de début d'infestation, éliminer rapidement les foyers localisés et renforcer la surveillance



Produits de biocontrôle : Faire des lâchers d'auxiliaires tels que *Encarsia formosa*, *Macrolophus pygmaeus* et *Eretmocerus eremicus*.
Renseignez-vous sur les conditions optimales de développement de chaque auxiliaire.

Poivron / piment

➔ Les observations pour rédiger ce BSV ont été réalisées sur plus de **15 ha** de cultures en Lot-et-Garonne.

Ravageurs

• Pucerons

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : La présence de ces individus est toujours signalée sur l'intégralité des exploitations surveillées du secteur. Les intensités d'attaques sont quant à elles encore assez faibles (plus d'1/4 de plantes touchées). Situation similaire pour les **punaïses** pentatomides type **Nezara viridula** ainsi que pour les **acariens** (dans une moindre mesure).

Evaluation du risque :

Le risque **pucerons** est **modéré**. Les pucerons (notamment *Myzus persicae* ou *Macrosiphum euphorbiae*) se développent surtout avec des températures plus élevées et la croissance active des plantes. Sous serre ou tunnel, les populations peuvent augmenter très rapidement si l'humidité et la présence d'auxiliaires ne sont pas bien maîtrisées. Une attention particulière doit être portée à l'évolution des foyers, car les pucerons peuvent coloniser rapidement les cultures et entraîner des dégâts directs, mais aussi favoriser la transmission de virus. Une surveillance régulière des parcelles est recommandée afin de détecter précocement toute montée en pression.



Méthodes prophylactiques

- Éliminer les adventices autour et dans les parcelles
- Supprimer les plants ou parties de plants infestés
- Maintenir une bonne aération, surtout sous abri, pour réduire les conditions favorables à la prolifération
- Observer régulièrement les jeunes organes des plants
- Installer éventuellement des pièges englués pour détecter précocement les populations
- Utiliser des auxiliaires parasitoïdes tels que *Aphelinus abdominalis*, *colemanni*, *ervi* ou encore des insectes prédateurs comme *Aphidoletes aphidimyza*, *Macrolophus pygmaeus*, chrysopes, syrphes ou coccinelles
- Utiliser les plantes de service : le thym et les œillets d'Inde éloignent les pucerons, la capucine les attire
- **Pour favoriser les ennemis naturels ciblés, des infrastructures agroécologiques (bandes enherbées/haies diversifiées) peuvent être mises en place. Le site <https://auxilhaie.chambres-agriculture.fr/> propose des espèces végétales (flore, arbres et arbustes) adaptées à votre région et votre sol.**

• Autres bioagresseurs

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : On note également une forte présence de **cicadelles** au sein des parcelles du réseau (sol et hors sol).



Cicadelles sur feuilles de poivron sol et hors sol (Crédit photo : J. RIVIERE – SCAAFEL)

Concombre

➔ Les observations pour rédiger ce BSV ont été réalisées sur près de **10 ha** en Lot-et-Garonne.

Ravageurs

• Thrips

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : Cette semaine on signale leur présence sur l'ensemble des exploitations surveillées du secteur avec une pression globalement moyenne. Situation similaire pour les **acarïens**.

Evaluation du risque :

Cette semaine, le risque **thrips** est estimé **moyen** à **fort**. Bien que les conditions chaudes et sèches soient favorables au développement des populations, les niveaux observés dans le réseau restent limités. Une surveillance régulière des cultures est néanmoins recommandée, les thrips pouvant provoquer des décolorations argentées sur les feuilles et les fruits, ainsi qu'un affaiblissement des plantes en cas de fortes infestations.



Méthodes prophylactiques

- Utiliser des plants sains et inspecter les jeunes plants avant implantation
- Éliminer les adventices et les résidus de culture pouvant servir de réservoirs
- Maintenir une bonne hygiène culturale dans et autour des parcelles ou des abris
- Mettre en place une surveillance régulière à l'aide d'observations et de panneaux englués
- Favoriser les auxiliaires naturels et préserver leur activité en limitant les traitements à large spectre
- Sous abri, protéger les ouvertures avec des filets adaptés lorsque cela est possible

• Autres bioagresseurs

Situation sur le terrain

- Lot-et-Garonne : On observe cette semaine une augmentation significative de la présence de **mineuses** et de **punaïses** sur les exploitations surveillées du secteur.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Maraîchage / Edition Sud Nouvelle-Aquitaine sont les suivantes :

Parcelles flottantes : Cadralbret, CDA 19, CDA 24, CDA 47, CDA 33, FREDON Nouvelle-Aquitaine, INVENIO, EPLEFPA de Ste Livrade, Midi Agro Consultant, Scaafel, Valprim, VDL, Vitivista, Terre du Sud, Koppert, Syndicat du Piment d'Espelette, Catros-Gérard / Les Doigts Verts + agriculteurs observateurs

Parcelles de références : CDA 47, FREDON Nouvelle-Aquitaine (toutes cultures)

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).